

ESTADÍSTICAS 2016

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT).

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Rosario SENDINO. Directora de la Unidad de Sistemas de Información y Documentación Adjunta al Delegado del Gobierno.

Elena ÁLVAREZ. Begoña BRIME. Noelia LLORENS. Aurora RUIZ. Eva SÁNCHEZ-FRANCO.

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Fernando ARENAS

Mercedes SUÁREZ

Rosario BALLESTA

Aragón

Carmen BARANGUAN

Laura JOSÉ

Asturias

José Ramón HEVIA

José Antonio GONZÁLEZ

Baleares

Rosa ARANGUREN

Francisca BIBILONI

Juana VANRELL

Canarias

Baltasar FERNÁNDEZ

Amelia M^a HERNÁNDEZ

Cantabria

Ángela HIGUERA

Antonia RUEDA

Carmen DIEGO

Castilla-La Mancha

Berta HERNÁNDEZ

Carmen DE PEDRO

Carlos ALONSO

Castilla y León

Ana SÁNCHEZ

Susana REDONDO

Alexander VELÁZQUEZ

Cataluña

Xavier ROCA

M. Teresa BRUGAL

Extremadura

Antonia María VAS

M^a Pilar MORCILLO

Galicia

Sergio VEIGA

Jaime FRAGA

Madrid

Ana RUIZ

M^a Angeles GUTIÉRREZ

Murcia

Andrés ALCARAZ

Pedro PARDO

Josefa DURÁN

Navarra

Miguel MARTÍNEZ

Raquel GONZÁLEZ

País Vasco

Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

La Rioja

Cristina NUEZ

Comunidad Valenciana

M^a Jesús MATEU

Francisco VERDÚ

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las Comunidades Autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Ministerio de Justicia.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.

INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS (OEDT)

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid

Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08

Correo electrónico: cendocupnd@msssi.es

Internet: <http://www.pnsd.msssi.gob.es/>

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 680-16-095-1

Es para mí un verdadero placer prologar, un año más, el Informe y las Estadísticas del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT), esta vez correspondientes al año 2016.

En este año llega a su fin el período de vigencia de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016, por lo que se debe de acometer la elaboración de una nueva estrategia que, como en ocasiones anteriores, goce de un elevado consenso y permita hacer frente a los retos que tenemos por delante.

Es fundamental que se disponga de datos fiables y actualizados sobre los aspectos fundamentales de este fenómeno dinámico y cambiante, por lo que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a través del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT), trabaja con ahínco en la recogida y análisis de datos y de difusión de la información que resultan imprescindibles para informar y orientar adecuadamente la toma de decisiones en este ámbito.

La información incluida en el Informe y las Estadísticas 2016 del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías nos permiten tener una imagen clara de cuál es la situación, tanto en el ámbito de la reducción de la demanda, como en el del control de la oferta, y nos ofrece información sobre el Sistema Español de Alerta Temprana, sistema que facilita dar respuestas a las circunstancias que acompañan a la aparición de nuevas sustancias psicoactivas o a eventos relacionados con el consumo de las mismas, ya que pueden generar un problema de salud pública.

Es por ello que la actualización de los datos resulta una pieza clave, para que todos los actores nos dotemos de la base para construir los cimientos de las nuevas actuaciones en política de adicciones.

Por último, un año más, quiero manifestar mi agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a la elaboración de esta publicación y especialmente a las personas integrantes del equipo del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías que, como es habitual, han desarrollado este trabajo de manera ejemplar y con gran profesionalidad.

Francisco de Asís Babín Vich
Delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías

ESTADÍSTICAS 2016

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

ÍNDICE

Presentación	3
Introducción	23

1. Consumo, percepciones y opiniones ante las drogas 24

1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2015	25
--	----

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2014 ..	26
---	----

Metodología

1.2.1. Distribución poblacional de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2014	26
1.2.2. Distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1996-2014	27
1.2.3. Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2014	28
1.2.4. Error muestral de la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de $p = q = 0,5$). España, 2014	29
1.2.5. Evolución del tamaño de muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	30
1.2.6. Evolución del tamaño de muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	30

Prevalencia de consumo de drogas 1994-2014: evolución temporal. Edad y sexo

1.2.7. Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	31
1.2.8. Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014	31
1.2.9. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	33
1.2.10. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	34
1.2.11. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	35

1.2.12.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	36
1.2.13.	Evolución de la edad media de inicio en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (años). España 1994-2014	36
1.2.14.	Edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (años). España, 2014	37
1.2.15.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	38
1.2.16.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	39
1.2.17.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	40
1.2.18.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	41
1.2.19.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	41
1.2.20.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	42
1.2.21.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	42
1.2.22.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España 1994-2014	43
1.2.23.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	43
1.2.24.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	44
1.2.25.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	44
1.2.26.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	45
1.2.27.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014	45
1.2.28.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014	46
1.2.29.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014	46
1.2.30.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014	47

Prevalencia de consumo de drogas 2014: Comunidad/Ciudad Autónoma

1.2.31.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	47
1.2.32.	Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	48
1.2.33.	Prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	49
1.2.34.	Prevalencia de hacer botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	50

1.2.35.	Prevalencia de hacer botellón y beber alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	51
1.2.36.	Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	52
1.2.37.	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	53
1.2.38.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	54
1.2.39.	Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014 ..	55
1.2.40.	Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	56
1.2.41.	Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	57
1.2.42.	Principales vías de información por las que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han recibido información sobre drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2014 ..	58
1.2.43.	Principales vías de información por las que a los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años les gustaría recibir información sobre drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2014	59
1.2.44.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014 ..	60
1.2.45.	Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	61
1.2.46.	Prevalencia de binge drinking o consumo en atracón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014 ..	62
1.2.47.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	63
1.2.48.	Prevalencia de consumo de tabaco a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	64
1.2.49.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	65
1.2.50.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014	66
1.2.51.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “muy importante o algo importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2014	67
1.2.52.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014 ..	68

Consumo por tipo de drogas: bebidas alcohólicas

1.2.53.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, de la prevalencia de borracheras (últimos 30 días), de la prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) (%), de la edad media de inicio del consumo y de la edad media de inicio del consumo semanal (años), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	69
1.2.54.	Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	69

1.2.55.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo y según edad. España, 1994-2014	70
1.2.56.	Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2014	71
1.2.57.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (%). España, 2014	71
1.2.58.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida y edad (%). España, 2014	72
1.2.59.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo y disponibilidad percibida de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014	73
1.2.60.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	73
1.2.61.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas algún fin de semana (1, 2 o 3), todos los fines de semana, algún día laborable (1, 2 o 3 por semana) y todos los días laborables en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	74
1.2.62.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables o en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2014	74
1.2.63.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables o en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2014	75
1.2.64.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables o en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	76
1.2.65.	Evolución de la prevalencia de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en días laborables o en fines de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1996-2014	77
1.2.66.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en este mismo periodo (%). España, 1994-2014	78
1.2.67.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2008-2014	78
1.2.68.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	79
1.2.69.	Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2014	79
1.2.70.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	80
1.2.71.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas tanto en días laborables como en fin de semana entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2014	80
1.2.72.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida en fin de semana entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y según sexo (%). España, 2014	81

1.2.73.	Evolución de la prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2008-2014	81
1.2.74.	Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	82
1.2.75.	Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el tipo de bebida consumida en fin de semana y según sexo (%). España, 2014	83
1.2.76.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2014	84
1.2.77.	Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2014	85
1.2.78.	Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2014	86
1.2.79.	Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2014	86
1.2.80.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2014	87
1.2.81.	Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2014	87
1.2.82.	Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2014	88
1.2.83.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2014	88
1.2.84.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	89
1.2.85.	Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses, de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2014	89
1.2.86.	Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2014	90
1.2.87.	Incidencia del consumo de alcohol en los últimos 12 meses y 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2014	90
1.2.88.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según sexo y edad (%). España, 2014	90
1.2.89.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2014	91

Consumo por tipo de drogas: tabaco

1.2.90.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	91
1.2.91.	Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	92
1.2.92.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	92

1.2.93. Evolución de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco, según sexo (%). España, 1994-2014	93
1.2.94. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de un paquete diario de tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que puede causar bastantes o muchos problemas) y prevalencia del consumo diario de tabaco (%). España, 1994-2014	93
1.2.95. Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	94
1.2.96. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2014	94
1.2.97. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2014	95
1.2.98. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2014	95
1.2.99. Evolución del porcentaje de hogares de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los que viven personas que fuman diariamente. España, 1994-2014	96
1.2.100. Media de cigarrillos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2014	96
1.2.101. Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	97
1.2.102. Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2014	97

Consumo por tipo de drogas: cigarrillos electrónicos

1.2.103. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	98
1.2.104. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no (%). España, 2014 ..	98
1.2.105. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no (%). España, 2104 ..	98
1.2.106. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco y de cannabis (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2014	99
1.2.107. Disponibilidad percibida del tabaco y del cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2014	99

Consumo por tipo de drogas: hipnosedantes

1.2.108. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta (%) y de la edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	100
1.2.109. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014 ..	100
1.2.110. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según sexo y edad (%). España, 2014 ...	101
1.2.111. Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	101

1.2.112. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta (%) y de la edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	102
1.2.113. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014 ..	102
1.2.114. Continuidad en el consumo de hipnosedantes sin receta en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014	103

Consumo por tipo de drogas: cannabis

1.2.115. Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	104
1.2.116. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	104
1.2.117. Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	105
1.2.118. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	105
1.2.119. Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días y de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2014	106
1.2.120. Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014	106
1.2.121. Características del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	107
1.2.122. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, sexo y edad (%). España, 2014	107
1.2.123. Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses y 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según sexo y edad (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2014	108
1.2.124. Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y según edad (%). España, 2014	108
1.2.125. Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y 30 días (%). España, 2014 ..	108
1.2.126. Continuidad en el consumo de cannabis en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014	109
1.2.127. Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2014	110
1.2.128. Porcentaje y estimación de consumidores problemáticos de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4). España, 2006-2014	110
1.2.129. Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST (puntuación CAST ≥ 4 consumo problemático) entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y entre todos los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014	111
1.2.130. Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST, sexo y edad (%). España, 2014	111

1.2.131. Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST (%). España, 2014	112
1.2.132. Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses y de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días entre el total de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y entre los que han consumido cannabis en el último año clasificados según la escala CAST (%). España, 2014 ...	112
1.2.133. Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su clasificación en la escala CAST (%). España, 2014	112

Consumo por tipo de drogas: cocaína

1.2.134. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	113
1.2.135. Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	113
1.2.136. Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (%). España, 2014	114
1.2.137. Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	114
1.2.138. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	115
1.2.139. Características del consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	115
1.2.140. Continuidad en el consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	116
1.2.141. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014	117

Consumo por tipo de drogas: éxtasis

1.2.142. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014 ...	117
1.2.143. Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	118
1.2.144. Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	118
1.2.145. Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	119
1.2.146. Características del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	119
1.2.147. Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	120

Consumo por tipo de drogas: anfetaminas

1.2.148. Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014 ..	120
1.2.149. Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	121
1.2.150. Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	121

1.2.151. Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	122
1.2.152. Características del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	122
1.2.153. Prevalencia alguna vez en la vida del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	123

Consumo por tipo de drogas: alucinógenos

1.2.154. Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	123
1.2.155. Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	124
1.2.156. Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	124
1.2.157. Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	125
1.2.158. Características del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	125
1.2.159. Prevalencia alguna vez en la vida del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	126

Consumo por tipo de drogas: heroína

1.2.160. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014 ...	126
1.2.161. Prevalencia de consumo de heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	127
1.2.162. Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	127
1.2.163. Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	128
1.2.164. Características del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	128
1.2.165. Evolución de la percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la percepción de disponibilidad de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014	129

Consumo por tipo de drogas: inhalables volátiles

1.2.166. Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles (%) y de la edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014	129
1.2.167. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014	130
1.2.168. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	130
1.2.169. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	131
1.2.170. Características del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	131

1.2.171. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2014	132
1.2.172. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	132
1.2.173. Evolución de la prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2014	132
1.2.174. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de estas sustancias porque no han oído nunca hablar de ellas. España, 2014	133
1.2.175. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años alguna vez en la vida, según sexo (%). España, 2014	133
1.2.176. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	134
1.2.177. Formas de conseguir nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que las han consumido en los últimos 12 meses (%). España, 2014	134
1.2.178. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de las siguientes nuevas sustancias alguna vez, según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2014	135
1.2.179. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y según edad (%). España, 2014	135
1.2.180. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2014	135
1.2.181. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) entre los que han contestado la pregunta (%). España, 2012-2014	136
1.2.182. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (%). España, 2010-2014	136
1.2.183. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014	137
1.2.184. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014	138
1.2.185. Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014	139
1.2.186. Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014	139
1.2.187. Prevalencia de consumo problemático de cannabis (puntuación CAST $\geq$ 4) o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014	140

1.2.188. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la hora de regreso a casa en la última salida (%). España, 2014	140
1.2.189. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	141

Patrones de consumo de drogas: policonsumo

1.2.190. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	141
1.2.191. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	142
1.2.192. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	142
1.2.193. Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2014	143
1.2.194. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014	143
1.2.195. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014	143
1.2.196. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	144
1.2.197. Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2014	144
1.2.198. Prevalencia de consumo de una, dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2014	145
1.2.199. Proporción de consumidores de otras drogas (12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes con o sin receta, cocaína (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2014 ..	145
1.2.200. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2014	146
1.2.201. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2014	146
1.2.202. Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2008-2014	147
1.2.203. Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2008-2014	147
1.2.204. Prevalencia de consumo conjunto de tabaco y cannabis en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2012-2014	148

1.2.205. Prevalencia de consumo conjunto de tabaco diario y cannabis en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2012-2014	148
1.2.206. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2014	149

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

1.2.207. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, al menos una vez por semana, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2014	149
1.2.208. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, al menos una vez por semana, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2014	150
1.2.209. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y según edad (%). España, 2014	150
1.2.210. Evolución del riesgo percibido del consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014	151
1.2.211. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan hecho binge drinking o se hayan emborrachado en los últimos 30 días y según puntuación en la escala CAST (%). España, 2014	152
1.2.212. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo diario de tabaco y ante el consumo de 5/6 cañas/copas en fin de semana (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado bebidas alcohólicas en los últimos 30 días (%). España, 2014	152
1.2.213. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan consumido alguna vez cada sustancia o no (%). España, 2014	153

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad

1.2.214. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2014	153
1.2.215. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2014	154
1.2.216. Percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas es relativamente fácil/muy fácil) y porcentaje de respuesta NS/NC entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2014	154
1.2.217. Formas de conseguir distintas drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que las han consumido alguna vez en la vida (%). España, 2014	155

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: vías de información sobre drogas

1.2.218. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal y según edad (%). España, 2014	155
1.2.219. Vías por las que han recibido información y vías por las que les gustaría recibir información sobre drogas a los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	156
1.2.220. Evolución sobre las principales vías de información sobre drogas por las que reciben información los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014	156

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas

1.2.221. Evolución de la valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2014	157
1.2.222. Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad (%). España, 2012-2014	158
1.2.223. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2014	158

Consumo de sustancias psicoactivas, contexto: relación con sus iguales

1.2.224. Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (%). España, 2006-2014	159
1.2.225. Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014	159
1.2.226. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014	160
1.2.227. Prevalencia de consumo de cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014	160
1.2.228. Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014	161
1.2.229. Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales se emborrachan (últimos 30 días) (%). España, 2014	161
1.2.230. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, borracheras, hacer botellón, tabaco, hipnose-dantes, cannabis y cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014	162

Consumo de sustancias psicoactivas, contexto: relaciones familiares y permisividad de los padres

1.2.231. Características de las relaciones familiares entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de los consumos en los últimos 30 días. España, 2014	163
1.2.232. Características de las relaciones familiares entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de los consumos en los últimos 30 días. España, 2014	164

1.2.233. Percepción de tolerancia parental para consumir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido alcohol, se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking en los últimos 30 días o botellón en los últimos 12 meses (%). España, 2014	165
1.2.234. Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	165
1.2.235. Percepción de tolerancia parental para consumir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis (%). España, 2014	166
1.2.236. Percepción del consumo de alcohol del padre y de la madre que tienen los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014	166
1.2.237. Percepción de tolerancia parental para consumir tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido tabaco en los últimos 30 días o hayan consumido tabaco a diario en los últimos 30 días (%). España, 2014	167
1.2.238. Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de tolerancia parental para consumir tabaco (%). España, 2014	167
1.2.239. Percepción de tolerancia parental para consumir tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis (%). España, 2014	168
1.2.240. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de tolerancia parental para consumir tabaco (%). España, 2014	168

Consumo de sustancias psicoactivas, contexto: entorno de ocio

1.2.241. Frecuencia de actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y según edad (%). España, 2014	169
1.2.242. Frecuencia de actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2014	170
1.2.243. Evolución de la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014	171
1.2.244. Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y según edad (%). España, 2014	171
1.2.245. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	172
1.2.246. Prevalencia de binge drinking, borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón y beber alcohol en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	173
1.2.247. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	174
1.2.248. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2014	174
1.2.249. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	175

1.2.250. Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	175
1.2.251. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	176
1.2.252. Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	176
1.2.253. Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	177
1.2.254. Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014	177
1.2.255. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según sexo y según edad (%). España, 2014	178
1.2.256. Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014	178
1.2.257. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2014	178
1.2.258. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2014	179
1.2.259. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según edad (%). España, 2014	179
1.2.260. Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana). Total y según edad (%). España, 2014	180
1.2.261. Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según edad (%). España, 2014	180
1.2.262. Prevalencia de binge drinking, borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón y beber alcohol en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2014	181
1.2.263. Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad. España, 2014	181
1.2.264. Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función del consumo de sustancias psicoactivas. España, 2014 ..	182

Consumo de sustancias psicoactivas, contexto: entorno escolar

1.2.265. Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2014	183
---	-----

1.2.266. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que en los últimos 12 meses ha conducido un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol o ha viajado como pasajero en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol (%). España, 2006-2014	184
1.2.267. Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que en los últimos 12 meses han conducido un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias psicoactivas o han viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de sustancias psicoactivas, según sexo y según edad (%). España, 2014	184
1.2.268. Situaciones que en los últimos 12 meses han experimentado los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2014	185

2. Problemas relacionados con las drogas 186

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2014 187

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo, hasta 2014

2.1.1. Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2014	187
2.1.2. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2014 . .	188
2.1.3. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. España, 1991-2014 . .	189
2.1.4. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2014 . .	190
2.1.5. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2014	191
2.1.6. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2014	192
2.1.7. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2014 . .	193
2.1.8. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2014 . .	194
2.1.9. Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total tratados). España, 1996-2014	195
2.1.10. Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (tratados por primera vez). España, 1996-2014	196
2.1.11. Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total tratados). España, 1987-2014	197
2.1.12. Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2014	198
2.1.13. Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (total tratados). España, 1987-2014	199
2.1.14. Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2014	200
2.1.15. Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014	201
2.1.16. Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014	202
2.1.17. Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014	203

2.1.18.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014	204
2.1.19.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2014	205
2.1.20.	Porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2014	206
2.1.21.	Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2014	207
2.1.22.	Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2014	208

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2014

2.1.23.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2014	209
2.1.24.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2014	210
2.1.25.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2014	211
2.1.26.	Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2014	212
2.1.27.	Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas, según existencia o no de tratamiento previo y según sexo. España, 2014	213
2.1.28.	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2014	215
2.1.29.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según existencia o no de tratamiento previo, y según sexo. España, 2014	215
2.1.30.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal que motiva el tratamiento. España, 2014	217
2.1.31.	Prevalencia de infección por VIH entre los inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas en %. España, 2014	220
2.1.32.	Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (%). España, 2005-2014	221
2.1.33.	Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (% y números absolutos). España, 2005-2014	221

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2014

2.2.1.	Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España, 1996-2014	222
2.2.2.	Número total de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje de urgencias en el que aparece cada sustancia. España, 1996-2014	223
2.2.3.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España, 1996-2014	224

2.2.4.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España, 2014	225
2.2.5.	Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España, 2014 ..	225
2.2.6.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según sexo. España, 2014	226
2.2.7.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según tipo de sustancia psicoactiva (total, hombres y mujeres). España, 2014	226
2.3.	Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1999-2014	227
Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas		
2.3.1.	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según diferentes fuentes de información. España, 1983-2014	227
Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a drogas		
2.3.2.	Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 2003-2014	228
2.3.3.	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1983-2014	229
2.3.4.	Número y proporción (%) de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 2003-2014	230
2.3.5.	Porcentaje de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España, 1983-2014	231
2.3.6.	Porcentajes de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (opioides y no cocaína, sólo opioides, opioides con benzodiacepinas (BZD) y/o alcohol). España, 1983-2014	232
2.3.7.	Porcentajes de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (metadona, sólo metadona, metadona y no otro opioide, sólo metadona y benzodiacepinas). España, 1996-2014	233
Registro General de Mortalidad		
2.3.8.	Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según sexo (Registro de Mortalidad del INE). España, 1999-2014	234
2.3.9.	Evolución del número de muertes por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según edad. España, 1999-2014	235
Información complementaria		236
Páginas web de interés		237

INTRODUCCIÓN

La función primordial del **Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT)** es ofrecer una visión global de la evolución y características del consumo de sustancias psicoactivas (incluyendo alcohol, tabaco, hipnosedantes, drogas ilegales y nuevas sustancias), y los problemas asociados en España. Para ello se emplea información procedente de diversas fuentes que, una vez analizada y contextualizada, debería ayudar a responsables políticos, asociaciones, profesionales y consumidores a la hora de tomar decisiones sobre estas cuestiones en sus respectivos ámbitos.

Este documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Estadísticas 2016*, se publica junto con otro documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Informe 2016*, al que complementa con una selección de tablas y gráficos.

El presente documento se estructura en dos capítulos que se detallan a continuación:

En el **capítulo 1**, se presenta información relativa al consumo, percepciones y opiniones de la población ante las drogas desde 1994 hasta 2014. La fuente de información es la Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), en sus sucesivas ediciones.

ESTUDES se realiza de forma bienal y se promueve y financia directamente desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas contando con la estrecha colaboración de las Comunidades y Ciudades Autónomas.

En el presente documento no se incluye información de EDADES, ya que los últimos datos disponibles, al cierre de este informe, se corresponden al año 2013 y ya han sido publicados en el *Informe y Estadísticas 2015. Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España*.

En el **capítulo 2**, se incluye información relativa a los problemas relacionados con las drogas desde 1987 hasta 2014. La información procede de tres indicadores clave: Indicador “Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas”, Indicador “Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas” e Indicador “Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas”.

Los indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad se gestionan desde 1987 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas, como una colaboración interinstitucional en el que tienen un papel muy activo las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como las instituciones de las que procede la información (centros de tratamiento de drogodependencias, hospitales, institutos de medicina legal, laboratorios toxicológicos, etc.). En algunos casos, los Ayuntamientos prestan también soporte a la recogida y depuración de la información.

En la página web del Plan Nacional sobre Drogas pueden consultarse los informes que se han ido publicando periódicamente desde 1998:

<http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/home.htm>

Consumo,
percepciones
y opiniones
ante las drogas



1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2015

En 2015, siguiendo con la serie de periodicidad bienal iniciada en 1995, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con la estrecha colaboración de las Comunidades y Ciudades Autónomas, ha llevado a cabo la undécima edición de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

Los objetivos concretos de la encuesta EDADES son los siguientes:

- a) Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas y otras conductas relacionadas.
- b) Conocer las características sociodemográficas de los consumidores.
- c) Conocer los patrones de consumo de sustancias psicoactivas.
- d) Conocer la disponibilidad de drogas percibida por la población y el riesgo percibido ante diversas conductas de consumo.
- e) Conocer la visibilidad de los problemas de drogas en el lugar donde viven los encuestados.
- f) Conocer la opinión de la población acerca de la importancia de los problemas de drogas y las medidas para reducirlos.
- g) Conocer la evolución temporal (desde 1995) de los aspectos ante expuestos.

El universo es la población general residente en hogares en España de 15 a 64 años. La muestra del año 2015 fue de 22.541 personas.

En el presente documento no se incluye información de EDADES debido a que los resultados detallados hasta el año 2013 están disponibles en el Informe y en Estadísticas 2015 y los de EDADES 2015 serán publicados en el próximo informe del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías. No obstante, puede consultarse un avance de resultados de EDADES 2015 en la página web del Plan Nacional sobre Drogas: <http://www.pnsd.msssi.gob.es/>

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2014

1.2.1.

Distribución poblacional de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2014.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
CCAA											
Andalucía	471.794	462.498	439.486	402.840	361.512	363.862	326.571	304.858	350.592	345.073	296.955
Aragón	69.699	64.548	58.208	49.597	45.599	44.849	40.860	38.581	44.414	45.224	39.471
Asturias	73.467	67.094	59.379	48.271	42.232	39.752	33.888	28.534	32.598	32.381	26.746
Baleares	39.271	37.441	36.613	34.923	34.408	34.804	31.333	30.164	33.985	35.788	31.203
Canarias	113.256	110.955	111.340	96.577	87.248	85.592	74.244	68.929	78.902	81.402	67.994
Cantabria	36.909	34.734	311.64	26.253	23.666	22.473	19.609	17.583	20.366	19.980	16.536
Castilla y León	160.256	151.635	137.270	117.058	105.092	102.177	89.776	78.471	88.990	87.789	73.070
Castilla-La Mancha	90.837	89.425	85.693	79.729	77.727	78.397	73.297	69.538	79.848	81.315	69.444
Cataluña	384.125	354.024	310.815	262.519	248.490	248.973	236.139	234.395	264.590	275.946	250.522
C. Valenciana	251.506	234.037	215.858	190.873	178.801	177.602	160.648	154.174	176.955	180.461	153.623
Extremadura	57.224	59.242	58.622	54.160	51.426	50.791	46.757	41.203	45.254	44.111	38.292
Galicia	182.834	176.703	163.396	134.929	113.916	112.125	94.564	82.464	95.485	87.948	73.481
Madrid	347.417	322.791	292.702	251.754	229.324	231.045	207.926	191.834	224.210	227.068	199.999
Murcia	73.929	71.706	66.423	60.005	55.246	56.305	51.755	49.721	57.769	59.440	51.322
Navarra	32.758	30.589	26.977	22.174	21.103	20.626	19.640	19.061	22.096	22.524	21.251
País Vasco	151.581	136.827	112.596	90.058	82.048	78.790	67.592	63.000	72.145	72.410	64.174
La Rioja	17.809	16.224	14.249	11.940	10.928	10.723	9.755	9.080	10.567	10.976	9.628
Ceuta	3.379	3.565	3.724	3.611	3.303	3.433	2.797	2.680	3.224	3.209	2.715
Melilla	2.961	3.136	3.455	3.197	3.244	2.970	2.791	2.890	6.099	3.776	3.105
Titularidad del centro educativo											
Pública	1.911.828	1.769.080	1.626.084	1.362.588	1.225.988	1.241.521	1.093.906	1.004.590	1.154.668	1.189.700	1.014.070
Privada	649.184	658.094	601.886	577.880	549.325	5.237.68	496.036	482.570	553.421	527.121	475.461
Tipo de estudios											
ESO	237.115	515.206	886.542	953.021	935.678	937.280	891.860	845.306	828.331	826.153	826.260
Bachillerato	1.510.024	1.261.877	927.249	724.972	614.796	600.389	576.960	520.541	608.428	594.090	550.619
F. Profesional	813.873	650.091	414.179	262.475	224.839	227.620	121.122	121.313	271.330	296.578	112.652
Total	2.561.012	2.427.174	2.227.970	1.940.468	1.775.313	1.765.289	1.589.942	1.487.160	1.708.089	1.716.821	1.489.531

FUENTE: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

1.2.2.

Distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1996-2014.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
CCAA										
Andalucía*	2.075	1.976	2.372	2.552	2.464	2.750	6.143	3.724	2.378	4.636
Aragón*	941	775	671	2.185	1.757	1.764	785	1.377	2.464	2.710
Asturias*	875	765	661	744	584	1.737	627	1.155	2.024	1.890
Baleares	661	679	602	1.762	1.795	622	599	1.203	806	859
Canarias*	859	966	739	960	835	2.079	1.398	1.815	1.155	3.592
Cantabria*	575	722	1.244	1.169	1.478	1.376	352	906	1.923	1.885
Castilla y León*	1.120	1.093	919	1.140	983	1.107	1.697	1.865	1.151	2.284
Castilla-La Mancha*	982	943	1.749	2.501	860	984	1.359	1.818	1.721	1.941
Cataluña	1.881	1.681	1.552	1.885	2.831	2.177	4.628	3.415	2.353	2.510
C. Valenciana*	1.466	1.395	2.287	1.685	1.362	1.657	3.119	2.727	1.696	3.260
Extremadura	659	718	443	796	1.693	777	807	1.370	860	905
Galicia*	1.436	1.333	1.170	2.108	1.245	2.244	1.799	1.945	2.022	2.102
Madrid*	1.979	1.853	2.929	3.308	3.033	3.055	3.904	3.056	3.250	4.404
Murcia	818	813	727	1.394	1.468	1.601	998	1.551	1.054	1.085
Navarra	659	553	627	530	600	570	361	960	605	662
País Vasco	1.104	1.021	852	806	990	884	1.316	1.726	1.096	1.164
La Rioja	651	570	462	457	975	525	190	647	477	507
Ceuta	128	30	323	130	140	289	46	325	232	224
Melilla*	97	199	121	464	428	256	57	382	236	866
Titularidad del centro educativo										
Pública	13.716	12.766	10.421	14.445	14.889	13.050	20.720	22.081	18.848	25.976
Privada	5.250	5.319	10.029	12.131	10.632	13.404	9.463	9.886	8.655	11.510
Tipo de estudios										
ESO	5.129	9.560	13.664	14.400	14.415	15.983	15.671	17.816	14.953	21.278
Bachillerato	10.495	7.312	5.869	10.733	9.468	8.468	10.348	11.683	10.384	14.624
Formación Profesional	3.342	1.213	917	1.443	1.638	2.003	4.164	2.468	2.166	1.584
Total	18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486

* Han ampliado muestra en el año 2014.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.3.

Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2014.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
CENTROS											
Andalucía*	45	45	45	54	60	64	70	77	62	63	110
Aragón*	19	18	18	17	35	32	33	49	63	68	69
Asturias*	19	18	18	17	18	16	29	48	63	59	55
Baleares	12	12	13	15	32	32	15	41	77	22	20
Canarias*	22	23	22	21	23	22	33	57	30	32	92
Cantabria*	13	12	13	28	29	28	28	39	58	58	50
Castilla y León*	18	19	27	25	30	27	32	35	29	33	61
Castilla-La Mancha*	25	24	17	44	58	22	25	31	29	43	52
Cataluña	44	38	39	37	43	70	53	56	53	55	58
C. Valenciana*	33	33	33	56	37	35	40	46	66	48	78
Extremadura	16	14	16	10	19	31	19	25	22	27	27
Galicia*	23	26	29	25	36	30	39	62	65	60	57
Madrid*	40	37	40	66	75	71	71	85	81	81	98
Murcia	16	16	16	17	38	25	25	48	25	27	25
Navarra	13	13	15	15	14	14	13	16	15	17	17
País Vasco	26	24	27	21	22	26	28	30	28	30	32
La Rioja	11	12	12	12	12	17	12	25	37	12	11
Ceuta	–	5	1	5	3	5	7	7	6	6	6
Melilla*	–	–	3	3	7	6	5	7	8	6	23
Total	395	389	404	488	591	573	577	784	817	747	941
AULAS											
Andalucía*	92	92	90	108	119	128	139	154	125	126	218
Aragón*	38	36	38	31	101	95	92	98	128	136	138
Asturias*	42	36	36	30	35	32	84	96	125	125	106
Baleares	29	28	27	24	84	93	30	82	153	43	40
Canarias	44	46	44	41	46	44	98	114	60	66	182
Cantabria*	28	28	28	48	58	84	81	78	116	117	98
Castilla y León*	38	40	40	47	58	54	64	70	60	71	121
Castilla la Mancha*	54	55	55	69	116	44	50	62	63	96	104
Cataluña	88	78	78	74	87	140	103	112	111	115	116
C. Valenciana*	68	65	69	90	72	70	80	92	136	92	154
Extremadura	34	32	53	19	37	92	38	50	45	57	50
Galicia*	56	55	33	43	102	60	116	124	129	120	114
Madrid*	85	80	58	119	144	142	142	170	160	166	196
Murcia	34	36	79	29	72	74	75	96	51	55	50
Navarra	30	28	26	22	26	28	26	32	32	30	32
País Vasco	52	52	33	40	44	51	56	60	56	60	60
Rioja	25	29	29	20	22	50	24	50	74	24	22
Ceuta	–	10	2	15	6	10	14	14	12	12	12
Melilla*	–	–	8	6	22	24	10	14	16	12	45
Total	837	826	826	875	1.251	1.315	1.322	1.568	1.652	1.523	1.858

* Han ampliado muestra en el año 2014.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.4.

Error muestral de la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de $p = q = 0,5$). España, 2014.

	Número de colegios			Número de alumnos			Error
	DGPNSD*	Ampliación**	Tamaño final	DGPNSD*	Ampliación**	Tamaño final	muestral ($\pm$)***
Andalucía	62	48	110	2.572	2.064	4.636	1,5%
Aragón	25	44	69	945	1.765	2.710	1,9%
Asturias	20	35	55	611	1.279	1.890	2,2%
Baleares	20	0	20	859	0	859	3,4%
Canarias	30	62	92	1.116	2.476	3.592	1,6%
Cantabria	15	35	50	511	1.374	1.885	2,2%
Castilla-La Mancha	29	23	52	1.079	862	1.941	2,2%
Castilla y León	31	30	61	1.183	1.101	2.284	2,1%
Cataluña	58	0	58	2.510	0	2.510	2,0%
C. Valenciana	44	34	78	1.811	1.449	3.260	1,7%
Extremadura	27	0	27	905	0	905	3,3%
Galicia	33	24	57	1.328	774	2.102	2,1%
Madrid	49	49	98	2.232	2.172	4.404	1,5%
Murcia	25	0	25	1.085	0	1.085	3,0%
Navarra	17	0	17	662	0	662	3,8%
País Vasco	32	0	32	1.164	0	1.164	2,9%
La Rioja	11	0	11	507	0	507	4,3%
Ceuta	6	0	6	224	0	224	6,4%
Melilla	6	17	23	254	612	866	2,9%
Total España	540	401	941	21.558	15.928	37.486	0,6%

* Muestra financiada por la DGPNSD.


** Muestra financiada por las CCAA.

*** Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y $p = q = 0,5$.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.5.


Evolución del tamaño de muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.6.

Evolución del tamaño de muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.7.

Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario en los últimos 30 días
Tabaco	38,4	31,4	25,9	8,9
Alcohol	78,9	76,8	68,2	1,7
Cannabis	29,1	25,4	18,6	1,8
Éxtasis	1,2	0,9	0,4	–
Alucinógenos	1,8	1,2	0,6	–
Anfetaminas/speed	1,4	0,9	0,5	–
Cocaína (polvo y/o base)	3,5	2,8	1,8	0,3
Heroína	0,6	0,5	0,3	–
Inhalables volátiles	0,9	0,7	0,4	–
Hipnosedantes* (con/sin receta)	16,1	10,8	6,2	0,8
Hipnosedantes* (sin receta)	7,8	5,3	3,0	0,2

* Tranquilizantes y/o somníferos

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.8.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014.

Prevalencia de consumo alguna vez en la vida											
	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Tabaco	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4
Alcohol	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9
Hipnosedantes* (con/sin receta)	6,9	7,7	7,7	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5	16,1
Hipnosedantes* (sin receta)	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8
Cannabis	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1
Éxtasis	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2
Alucinógenos	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8
Anfetaminas	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4
Cocaína (polvo y/o base)	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9
GHB	–	–	–	–	–	–	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0


Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses											
	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Tabaco	–	–	–	–	–	–	34,0	38,1	32,4	35,3	31,4
Alcohol	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8
Hipnosedantes* (con/sin receta)	–	–	–	–	–	–	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8
Hipnosedantes* (sin receta)	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3
Cannabis	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9
Cocaína (polvo y/o base)	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5
Inhalables volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7
GHB	–	–	–	–	–	–	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días											
	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Tabaco	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	37,4	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9
Alcohol	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2
Hipnosedantes* (con/sin receta)	–	–	–	–	–	–	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2
Hipnosedantes* (sin receta)	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0
Cannabis	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6
Éxtasis	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4
Alucinógenos	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6
Anfetaminas	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5
Cocaína (polvo y/o base)	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8
Heroína	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3
Inhalables volátiles	1,1	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4
GHB	–	–	–	–	–	–	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4
Prevalencia de consumo diario en los últimos 30 días											
	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Tabaco	21,6	23,7	23,1	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9
Alcohol	–	–	–	–	–	–	1,9	2,9	6,0	2,7	1,7
Hipnosedantes* (con/sin receta)	–	–	–	–	–	–	0,4	0,6	0,7	0,9	0,8
Hipnosedantes* (sin receta)	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2
Cannabis	1,0	1,4	1,8	3,7	3,8	5,0	3,1	3,1	3,0	2,7	1,8

* Tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.9.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



	2014
Alcohol	78,9
Tabaco	38,4
Hipnosedantes*	16,1
Hipnosedantes**	7,8
Cannabis	29,1
Cocaína (polvo y/o base)	3,5
Éxtasis	1,2
Anfetaminas/speed	1,4
Alucinógenos	1,8
Heroína	0,6
Inhalables volátiles	0,9
GHB	1,0
Nuevas sustancias	4,0
Ketamina	0,7
Spice	0,8
Mefedrona	0,5
Metanfetamina	0,8
Setas mágicas	1,3
Salvia	0,7
Esteroides anabolizantes	0,6


* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.10.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



	2014
Alcohol	76,8
Tabaco	31,4
Hipnosedantes*	10,8
Hipnosedantes**	5,3
Cannabis	25,4
Cocaína (polvo y/o base)	2,8
Éxtasis	0,9
Anfetaminas/speed	0,9
Alucinógenos	1,2
Heroína	0,5
Inhalables volátiles	0,7
GHB	0,7
Nuevas sustancias	2,8
Ketamina	0,5
Spice	0,6
Mefedrona	0,3
Metanfetamina	0,5
Setas mágicas	0,8
Salvia	0,4
Esteroides anabolizantes	0,4


* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.11.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



	2014
Alcohol	68,2
Tabaco	25,9
Hipnosedantes*	6,2
Hipnosedantes**	3,0
Cannabis	18,6
Cocaína (polvo y/o base)	1,8
Éxtasis	0,4
Anfetaminas/speed	0,5
Alucinógenos	0,6
Heroína	0,3
Inhalables volátiles	0,4
GHB	0,4
Nuevas sustancias	1,6
Ketamina	0,3
Spice	0,3
Mefedrona	0,3
Metanfetamina	0,3
Setas mágicas	0,4
Salvia	0,3
Esteroides anabolizantes	0,3


* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.12.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.13.

Evolución de la edad media de inicio en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (años). España 1994-2014.


	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Anfetaminas	15,5	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2
Éxtasis	15,6	15,7	15,5	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2
Cocaína polvo	–	–	–	–	–	–	15,4	15,4	15,4	15,6	15,1
Alcohol (consumo semanal)	–	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,0	15,6	14,8	15,1	15,0
Cocaína (polvo y/o base)	15,6	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,3	15,3	14,9	15,5	15,0
Cannabis	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8
Cocaína base	–	–	–	–	–	–	15,0	15,0	14,6	15,2	14,8
GHB	–	–	–	–	–	–	15,0	15,0	14,6	15,1	14,8
Tabaco (consumo diario)	–	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6
Hipnosedantes* (sin receta)	14,1	14,5	14,8	14,5	14,6	14,8	14,2	14,3	14,2	14,6	14,2
Heroína	14,3	14,7	14,4	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0
Alucinógenos	15,4	15,6	15,4	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0
Inhalables volátiles	13,3	13,6	13,4	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9
Hipnosedantes* (con/sin receta)	–	–	–	–	–	–	13,8	14,0	13,9	14,3	13,9
Tabaco	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9
Alcohol	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,9	13,8

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.14.

Edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (años). España, 2014.



	Edad media de inicio
Anfetaminas	15,2
Éxtasis	15,2
Cocaína polvo	15,1
Alcohol (consumo semanal)	15,0
Cocaína (polvo y/o base)	15,0
Cannabis	14,8
Cocaína base	14,8
GHB	14,8
Tabaco (consumo diario)	14,6
Hipnosedantes**	14,2
Heroína	14,0
Alucinógenos	14,0
Inhalables volátiles	13,9
Hipnosedantes*	13,9
Tabaco	13,9
Alcohol	13,8

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.15.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.

TOTAL				POR EDAD Y SEXO														
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna droga ilegal*	30,3	32,9	27,8	13,4	14,4	12,6	22,7	24,7	20,9	34,3	36,1	32,7	42,7	46,7	38,7	46,8	49,6	43,4
Alguna droga ilegal sin cannabis**	5,2	6,2	4,3	3,4	3,7	3,1	4,1	4,9	3,3	5,6	6,0	5,1	6,4	8,0	4,8	8,4	10,0	6,5
Tabaco	38,4	36,5	40,3	22,3	20,1	24,4	31,3	29,0	33,4	43,0	41,1	44,7	48,8	46,3	51,4	56,5	53,8	59,8
Cigarrillos electrónicos	17,0	18,8	15,2	12,6	13,3	12,0	15,7	16,9	14,6	19,4	22,3	16,6	18,7	21,2	16,2	19,5	20,5	18,3
Alcohol	78,9	77,8	80,1	60,1	58,7	61,3	73,7	70,7	76,5	84,1	83,4	84,8	90,6	89,4	91,7	92,4	92,1	92,8
Borracheras	50,1	48,7	51,4	23,2	20,5	25,7	39,8	36,9	42,4	56,5	54,8	58,1	69,1	67,8	70,4	74,1	74,3	73,9
Hipnosedantes (con o sin receta)	16,1	11,9	20,1	11,4	8,7	13,8	14,6	11,1	17,8	16,8	12,5	20,9	19,3	14,2	24,5	20,7	13,6	29,4
Hipnosedantes (sin receta)	7,8	5,8	9,6	5,3	3,8	6,6	7,0	5,2	8,6	8,2	6,5	9,9	9,3	7,1	11,5	10,5	6,9	14,8
Cannabis	29,1	31,5	26,8	12,3	13,2	11,4	21,7	23,3	20,1	33,1	34,8	31,5	41,6	45,3	38,0	45,5	47,9	42,5
Cocaína polvo y/o base	3,5	4,2	2,9	2,3	2,7	2,0	2,9	3,4	2,5	3,7	3,9	3,6	4,4	5,6	3,2	5,4	6,6	3,9
Éxtasis	1,2	1,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,8	1,0	0,6	1,2	1,7	0,7	1,5	2,0	1,0	2,9	3,6	2,1
Anfetaminas/speed	1,4	1,8	0,9	0,7	0,9	0,5	1,1	1,4	0,8	1,5	2,2	0,8	1,7	2,3	1,1	2,5	3,0	1,9
Alucinógenos	1,8	2,3	1,2	1,4	1,5	1,3	1,4	2,1	0,8	1,7	2,4	1,2	2,2	3,0	1,4	3,0	3,4	2,4
Heroína	0,6	0,9	0,4	0,6	0,7	0,5	0,6	0,9	0,4	0,6	0,8	0,3	0,7	1,0	0,3	0,5	0,8	0,2
Inhalables volátiles	0,9	1,3	0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,3	0,6	1,0	1,4	0,7	0,9	1,4	0,5	0,9	1,2	0,5
GHB	1,0	1,3	0,8	0,8	1,0	0,6	0,9	1,2	0,6	1,0	1,1	0,9	1,2	1,5	1,0	1,3	1,8	0,6
Nuevas sustancias	4,0	4,8	3,3	2,7	2,9	2,6	3,4	3,9	2,8	4,5	5,2	3,9	4,5	6,0	3,1	6,1	7,1	4,9
Ketamina	0,7	0,9	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	0,3	0,6	0,8	0,3	0,8	1,0	0,6	1,0	1,2	0,8
Spice	0,8	1,1	0,6	0,5	0,6	0,4	0,8	1,1	0,5	0,8	1,1	0,5	1,1	1,4	0,7	1,2	1,4	1,0
Mefedrona	0,5	0,7	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7	0,2	0,5	0,7	0,3	0,6	0,9	0,3	0,6	0,8	0,2
Metanfetamina	0,8	1,1	0,4	0,6	0,7	0,5	0,7	1,1	0,4	0,8	1,2	0,5	0,8	1,2	0,3	1,1	1,6	0,6
Setas mágicas	1,3	1,8	0,8	0,8	0,9	0,6	1,0	1,6	0,5	1,4	2,0	0,8	1,6	2,3	1,0	2,6	3,1	2,1
Salvia	0,7	1,0	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,3	0,8	1,2	0,4	0,7	1,2	0,2	1,1	1,4	0,6
Esteroides anabolizantes	0,6	1,0	0,3	0,5	0,8	0,3	0,4	0,7	0,1	0,8	1,3	0,4	0,7	1,1	0,3	0,8	1,1	0,4

T = Total; H = Hombre; M = Mujer.

* Alguna droga ilegal (definición del EMCDDA): cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB (no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles).

** Alguna droga ilegal sin cannabis (definición del EMCDDA): cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.16.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.

TOTAL				POR EDAD Y SEXO														
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
T	H	M		T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna droga ilegal*	26,5	29,3	23,8	12,0	12,7	11,3	20,5	22,2	19,0	30,6	32,7	28,5	36,9	41,7	32,0	38,2	41,8	33,9
Alguna droga ilegal sin cannabis**	3,8	4,7	2,9	2,5	3,1	1,9	3,2	3,8	2,6	4,0	4,6	3,5	4,6	5,8	3,3	5,9	7,5	3,8
Tabaco	31,4	29,6	33,2	18,6	16,2	20,7	25,5	23,4	27,6	35,3	33,0	37,4	39,7	38,2	41,3	45,3	42,9	48,2
Alcohol	76,8	75,3	78,2	57,4	55,5	59,2	71,2	67,6	74,7	82,2	81,3	83,1	88,7	87,3	90,1	90,7	90,4	91,1
Borracheras	42,6	41,5	43,7	19,0	16,1	21,6	33,6	31,1	35,9	48,8	47,1	50,4	59,0	58,5	59,5	63,4	64,7	61,7
Botellón	57,6	55,9	59,3	34,9	31,7	37,9	51,2	47,1	55,1	64,3	62,2	66,2	72,0	71,8	72,2	71,9	73,6	69,8
Botellón y beber alcohol	49,9	48,1	51,7	26,5	23,1	29,5	42,8	38,9	46,5	56,8	54,4	59,1	65,2	64,3	66,2	65,0	67,0	62,6
Bebidas alcohólicas y cannabis	17,3	19,5	15,2	6,3	6,5	6,0	12,5	13,7	11,4	20,7	22,2	19,3	25,5	29,4	21,5	25,8	29,5	21,4
Bebidas alcohólicas y cocaína en polvo y/o base	1,2	1,5	0,8	0,7	0,9	0,6	1,0	1,3	0,7	1,1	1,4	0,9	1,4	1,9	0,9	2,1	3,0	1,1
Hipnosedantes (con o sin receta)	10,8	7,7	13,8	7,3	5,3	9,1	9,8	7,4	12,1	11,5	8,3	14,5	13,4	9,6	17,2	12,4	6,7	19,2
Hipnosedantes (sin receta)	5,3	3,8	6,8	3,3	2,3	4,2	4,8	3,6	6,0	6,0	4,3	7,5	6,5	4,9	8,2	6,4	3,5	9,9
Cannabis	25,4	28,0	23,0	11,0	11,5	10,5	19,6	21,0	18,3	29,5	31,5	27,6	35,8	40,3	31,3	37,0	40,0	33,4
Cocaína (polvo y/o base)	2,8	3,3	2,2	1,9	2,3	1,4	2,4	2,7	2,1	3,0	3,2	2,8	3,3	4,2	2,4	3,9	5,1	2,4
Éxtasis	0,9	1,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,6	0,7	0,4	0,9	1,3	0,5	1,1	1,4	0,8	2,2	2,9	1,4
Anfetaminas/speed	0,9	1,3	0,6	0,5	0,6	0,3	0,8	1,2	0,5	1,0	1,5	0,4	1,1	1,5	0,7	1,7	2,0	1,2
Alucinógenos	1,2	1,6	0,7	0,9	1,1	0,7	1,0	1,5	0,5	1,1	1,6	0,6	1,4	2,0	0,9	1,8	2,0	1,6
Heroína	0,5	0,7	0,2	0,4	0,5	0,3	0,5	0,8	0,3	0,4	0,6	0,2	0,5	0,9	0,2	0,3	0,5	0,1
Inhalables volátiles	0,7	0,9	0,4	0,6	0,8	0,5	0,6	0,8	0,4	0,7	1,0	0,5	0,6	0,9	0,4	0,6	0,8	0,4
GHB	0,7	0,9	0,4	0,5	0,6	0,4	0,7	1,1	0,4	0,6	0,8	0,3	0,8	1,1	0,6	0,7	1,2	0,2
Conducir + alcohol	3,1	4,7	1,6	1,2	1,6	0,8	2,0	3,0	1,0	3,3	5,1	1,6	4,4	6,4	2,4	6,7	9,5	3,3
Conducir + hachís	2,0	3,0	1,0	0,7	0,8	0,5	1,2	2,0	0,5	2,3	3,7	0,9	2,8	4,1	1,4	4,3	6,0	2,2
Conducir + cocaína	0,4	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,1	0,4	0,7	0,2	0,4	0,5	0,2	0,5	0,7	0,2
Pasajero + alcohol	17,2	15,9	18,4	8,3	7,8	8,9	13,7	11,9	15,3	18,1	16,5	19,7	23,4	22,0	24,9	28,5	26,6	30,9
Pasajero + hachís	9,0	9,6	8,5	2,6	2,8	2,3	5,8	6,1	5,5	10,5	10,6	10,5	13,5	14,3	12,7	17,7	18,7	16,4
Pasajero + cocaína	1,7	1,9	1,5	0,8	1,0	0,7	1,3	1,3	1,3	1,7	2,1	1,4	2,3	2,5	2,0	3,1	3,3	2,9
Accidente + alcohol	1,0	1,3	0,7	0,8	0,9	0,7	1,0	1,2	0,8	1,0	1,4	0,6	1,0	1,3	0,7	1,5	1,8	1,0
Accidente + hachís	0,4	0,7	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,2	0,4	0,7	0,2	0,5	0,8	0,1	0,8	1,3	0,1
Accidente + cocaína	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,0
Pelea + alcohol	4,7	6,2	3,4	1,8	2,4	1,3	3,5	4,0	2,9	5,6	6,9	4,3	6,4	8,7	4,0	8,6	11,3	5,3
Pelea + hachís	2,0	2,9	1,1	0,8	1,4	0,3	1,7	2,5	1,0	2,5	3,3	1,7	2,5	3,9	1,2	2,7	3,7	1,5
Pelea + cocaína	0,4	0,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2	0,5	0,8	0,2	0,5	0,9	0,1
Nuevas sustancias	2,8	3,4	2,2	1,9	2,2	1,6	2,5	2,9	2,1	2,9	3,4	2,4	3,2	4,4	2,0	4,2	4,8	3,6
Ketamina	0,5	0,7	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7	0,2	0,6	0,8	0,4	0,7	0,7	0,7
Spice	0,6	0,9	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,9	0,3	0,6	0,9	0,3	0,9	1,2	0,5	0,9	1,0	0,9
Mefedrona	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7	0,2	0,3	0,4	0,2
Metanfetamina	0,5	0,8	0,3	0,4	0,5	0,2	0,6	0,9	0,2	0,6	0,9	0,3	0,6	0,9	0,2	0,7	0,8	0,5
Setas mágicas	0,8	1,2	0,5	0,5	0,7	0,4	0,7	1,2	0,3	0,8	1,3	0,4	0,9	1,3	0,5	1,5	1,5	1,4
Salvia	0,4	0,7	0,2	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,1	0,5	0,7	0,3	0,5	0,9	0,2	0,5	0,7	0,3
Esteroides anabolizantes	0,4	0,7	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,7	0,2	0,5	0,9	0,2	0,4	0,6	0,3

T = Total; H = Hombre; M = Mujer.

* Alguna droga ilegal (definición del EMCDDA): cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB (no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles).

** Alguna droga ilegal sin cannabis (definición del EMCDDA): cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.17.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.

TOTAL				POR EDAD Y SEXO														
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna droga ilegal*	19,5	22,6	16,5	8,6	9,4	7,8	15,2	17,2	13,3	22,6	25,4	19,9	27,1	32,1	22,1	28,4	32,7	23,2
Alguna droga ilegal sin cannabis**	2,4	3,1	1,7	1,8	2,4	1,2	2,2	2,7	1,6	2,5	2,9	2,1	2,7	3,6	1,9	2,9	4,3	1,3
Tabaco	25,9	24,5	27,2	15,0	12,8	17,0	20,5	19,1	21,8	29,4	27,9	30,9	32,7	31,7	33,8	39,1	36,7	41,9
Bebidas energéticas	40,4	49,7	31,4	36,9	46,8	27,8	38,5	48,8	28,9	41,9	51,3	33,0	42,8	51,2	34,3	43,8	50,8	35,4
Bebidas energéticas + alcohol	14,3	16,0	12,6	7,7	8,8	6,6	11,1	12,4	9,8	16,3	17,7	15,0	19,6	21,8	17,4	19,1	21,6	16,1
Alcohol	68,2	66,9	69,5	48,4	45,8	50,7	61,3	58,1	64,3	74,0	73,0	74,9	80,8	80,4	81,2	84,8	84,4	85,4
Borracheras	22,2	22,3	22,1	7,6	6,1	9,0	14,9	14,0	15,8	26,4	26,1	26,6	33,1	34,1	32,1	37,5	39,5	35,2
Binge drinking	32,2	33,4	31,0	14,2	13,5	14,7	24,6	24,0	25,2	37,1	37,8	36,4	44,2	47,1	41,4	50,6	54,1	46,4
Hipnosedantes (con o sin receta)	6,2	4,2	8,1	4,6	3,1	6,0	5,7	4,1	7,2	6,3	4,4	8,1	7,5	5,3	9,7	7,5	3,3	12,6
Hipnosedantes (sin receta)	3,0	2,0	3,9	2,1	1,4	2,7	2,7	1,8	3,5	3,2	2,3	4,1	3,6	2,7	4,5	3,6	1,5	6,2
Cannabis	18,6	21,4	15,8	7,7	8,3	7,2	14,4	16,2	12,7	21,6	24,4	19,0	26,1	30,7	21,5	27,5	31,5	22,8
Cannabis + tabaco	14,4	16,6	12,3	4,7	4,8	4,6	10,7	11,9	9,7	17,1	18,9	15,3	21,1	25,2	17,0	23,3	26,8	19,0
Cocaína (polvo y/o base)	1,8	2,3	1,4	1,4	1,8	1,0	1,6	1,9	1,4	2,0	2,3	1,8	2,1	2,8	1,5	2,2	3,4	0,8
Éxtasis	0,4	0,6	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2	0,4	0,7	0,2	0,6	0,8	0,4	0,8	1,1	0,3
Anfetaminas/speed	0,5	0,7	0,2	0,4	0,6	0,2	0,5	0,6	0,3	0,5	0,9	0,1	0,5	0,8	0,3	0,4	0,7	0,1
Alucinógenos	0,6	0,9	0,4	0,6	0,8	0,4	0,7	1,1	0,3	0,5	0,8	0,3	0,7	1,1	0,4	0,8	1,0	0,5
Heroína	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1
Inhalables volátiles	0,4	0,6	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,1
GHB	0,4	0,6	0,2	0,4	0,5	0,3	0,5	0,7	0,2	0,3	0,6	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,0
Nuevas sustancias	1,6	2,1	1,2	1,2	1,4	1,0	1,5	1,9	1,2	1,7	2,2	1,3	1,7	2,5	0,9	2,1	2,4	1,7
Ketamina	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,1	0,3	0,6	0,1	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2
Spice	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,6	0,1	0,4	0,7	0,2	0,4	0,5	0,2
Mefedrona	0,3	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4	0,2
Metanfetamina	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,5	0,1	0,4	0,7	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1
Setas mágicas	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2	0,5	0,8	0,2	0,3	0,6	0,1	0,4	0,6	0,2	0,6	0,8	0,5
Salvia	0,3	0,5	0,2	0,4	0,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	0,1
Esteroides anabolizantes	0,3	0,6	0,1	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4	0,1	0,3	0,6	0,1	0,4	0,7	0,1	0,4	0,6	0,3

T = Total; H = Hombre; M = Mujer.

* Alguna droga ilegal (definición del EMCDDA): cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB (no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles).

** Alguna droga ilegal sin cannabis (definición del EMCDDA): cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos, GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.18.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO														
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	8,9	8,7	9,1	2,2	1,7	2,6	5,4	5,1	5,6	10,8	10,4	11,1	12,9	12,6	13,2	19,1	18,1	20,2
Alcohol	1,7	2,2	1,3	0,9	1,0	0,8	1,3	1,6	1,0	1,8	2,2	1,3	2,4	2,8	2,0	2,9	4,1	1,5
Borracheras	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2	0,4	0,7	0,2
Binge drinking	0,7	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,9	0,4	0,7	1,0	0,5	0,8	0,9	0,8	1,2	1,4	0,8
Hipnosedantes*	0,8	0,8	0,9	0,5	0,5	0,6	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	1,0	0,9	1,2	1,3	0,8	1,9
Cannabis	1,8	2,6	1,0	0,5	0,7	0,3	1,2	1,7	0,7	1,9	2,7	1,2	2,6	3,9	1,4	3,9	5,3	2,3

T = Total; H = Hombre; M = Mujer.

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.19.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	56,6	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	64,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3
Alcohol	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1
Hipnosedantes*	5,8	8,1	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	12,0	18,8	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	11,9	20,1
Hipnosedantes**	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6
Cannabis	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	40,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8
Éxtasis	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	1,6	0,8
Alucinógenos	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	2,3	1,2
Anfetaminas	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,5	2,7	3,4	1,8	3,2	1,5	1,8	0,9
Cocaína																						
(polvo y/o base)	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9
Heroína	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	0,9	0,4
Inhalables volátiles	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,1	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	1,3	0,6
GHB	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,8	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,9	0,8	1,3	0,8

H = Hombre; M = Mujer.

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.20.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	37,5	36,0	40,1	28,1	36,4	33,1	37,5	29,6	33,2
Alcohol	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	11,1	8,1	12,1	7,7	12,5	8,4	14,9	7,7	13,8
Hipnosedantes**	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8
Cannabis	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	28,2	24,7	29,7	23,3	28,0	23,0
Éxtasis	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,3	1,6	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4	1,2	0,6
Alucinógenos	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1	1,6	0,7
Anfetaminas	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,2	1,8	2,2	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6
Cocaína (polvo y/o base)	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2
Heroína	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2
Inhalables volátiles	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,6	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8	0,9	0,4
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,4	1,2	0,4	1,0	0,5	1,5	0,5	0,9	0,4

H = Hombre; M = Mujer.

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.21.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2
Alcohol	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	5,5	4,0	6,1	4,0	6,6	4,7	8,5	4,2	8,1
Hipnosedantes**	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9
Cannabis	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	28,5	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	19,3	15,2	18,9	13,3	21,4	15,8
Éxtasis	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6	0,6	0,3
Alucinógenos	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4	0,9	0,4
Anfetaminas	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,6	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,5	0,8	1,3	0,5	1,4	0,6	0,7	0,2
Cocaína (polvo y/o base)	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4
Heroína	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3	0,5	0,2
Inhalables volátiles	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6	0,6	0,3
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,2	0,8	0,3	0,8	0,3	1,0	0,3	0,6	0,2

H = Hombre; M = Mujer.

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.22.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	17,8	25,4	19,0	28,1	17,9	27,5	19,3	27,0	17,2	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1	8,7	9,1
Alcohol	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,0	1,0	3,8	2,0	7,8	4,3	3,3	2,0	2,2	1,3
Hipnosedantes*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9
Hipnosedantes**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Cannabis	1,5	0,5	2,2	0,8	2,7	0,9	5,5	1,9	5,5	2,1	7,0	2,9	4,2	2,2	4,4	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0

H = Hombre; M = Mujer.


* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.23.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.



Hombres	77,8	36,5	11,9	5,8	31,5	4,2	1,6	1,8	2,3	0,9
Mujeres	80,1	40,3	20,1	9,6	26,8	2,9	0,8	0,9	1,2	0,4

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.


** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

*** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.24.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.




* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. *** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.25.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.




* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. *** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.26.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.



* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.27.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	22,3	31,3	43,0	48,8	56,5
Alcohol	60,1	73,7	84,1	90,6	92,4
Hipnosedantes*	11,4	14,6	16,8	19,3	20,7
Hipnosedantes**	5,3	7,0	8,2	9,3	10,5
Cannabis	12,3	21,7	33,1	41,6	45,5
Éxtasis	0,6	0,8	1,2	1,5	2,9
Alucinógenos	1,4	1,4	1,7	2,2	3,0
Anfetaminas/speed	0,7	1,1	1,5	1,7	2,5
Cocaína (polvo y/o base)	2,3	2,9	3,7	4,4	5,4
Heroína	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5
Inhalables volátiles	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9
GHB	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.28.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	18,6	25,5	35,3	39,7	45,3
Alcohol	57,4	71,2	82,2	88,7	90,7
Hipnosedantes*	7,3	9,8	11,5	13,4	12,4
Hipnosedantes**	3,3	4,8	6,0	6,5	6,4
Cannabis	11,0	19,6	29,5	35,8	37,0
Éxtasis	0,4	0,6	0,9	1,1	2,2
Alucinógenos	0,9	1,0	1,1	1,4	1,8
Anfetaminas/speed	0,5	0,8	1,0	1,1	1,7
Cocaína (polvo y/o base)	1,9	2,4	3,0	3,3	3,9
Heroína	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3
Inhalables volátiles	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6
GHB	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.29.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	15,0	20,5	29,4	32,7	39,1
Alcohol	48,4	61,3	74,0	80,8	84,8
Hipnosedantes*	4,6	5,7	6,3	7,5	7,5
Hipnosedantes**	2,1	2,7	3,2	3,6	3,6
Cannabis	7,7	14,4	21,6	26,1	27,5
Éxtasis	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8
Alucinógenos	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8
Anfetaminas/speed	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4
Cocaína (polvo y/o base)	1,4	1,6	2,0	2,1	2,2
Heroína	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3
Inhalables volátiles	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
GHB	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.30.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2014.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	2,2	5,4	10,8	12,9	19,1
Alcohol	0,9	1,3	1,8	2,4	2,9
Hipnosedantes*	0,5	0,9	0,7	1,0	1,3
Hipnosedantes**	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4
Cannabis	0,5	1,2	1,9	2,6	3,9

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.31.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

		Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Muestra	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.636	78,9	77,7	80,0	76,7	75,5	78,0	69,0	67,7	70,4
Aragón	2.710	83,3	81,9	84,7	81,5	80,1	83,1	69,7	67,9	71,4
Asturias	1.890	79,3	77,5	81,1	76,7	74,8	78,7	71,0	68,9	73,0
Baleares	859	75,8	72,9	78,7	74,2	71,3	77,2	61,8	58,6	65,1
Canarias	3.592	74,1	72,6	75,5	71,0	69,5	72,5	61,4	59,8	63,0
Cantabria	1.885	79,2	77,4	81,0	77,0	75,1	79,0	68,9	66,8	71,0
Castilla y León	2.284	84,3	82,8	85,8	82,4	80,9	84,0	74,4	72,6	76,2
Castilla-La Mancha	1.941	80,4	78,6	82,2	77,8	76,0	79,7	72,3	70,3	74,2
Cataluña	2.510	78,9	77,3	80,5	77,0	75,4	78,7	68,1	66,3	69,9
C. Valenciana	3.260	84,7	83,5	86,0	82,6	81,3	83,9	75,2	73,7	76,7
Extremadura	905	74,0	71,1	76,9	72,7	69,8	75,6	65,2	62,1	68,3
Galicia	2.102	76,5	74,7	78,4	74,5	72,6	76,4	65,4	63,3	67,4
Madrid	4.404	74,1	72,8	75,4	71,5	70,2	72,8	61,5	60,1	62,9
Murcia	1.085	79,9	77,5	82,3	77,5	75,0	80,1	69,8	67,1	72,5
Navarra	662	84,2	81,4	87,0	81,9	79,0	85,0	72,7	69,3	76,1
País Vasco	1.164	82,9	80,7	85,1	81,2	79,0	83,6	71,5	68,9	74,1
Rioja	507	78,4	74,8	81,9	76,0	72,3	79,9	65,6	61,5	69,8
Ceuta	224	34,8	28,5	41,0	32,5	26,4	38,3	27,7	21,8	33,6
Melilla	866	46,8	43,5	50,2	43,6	40,3	46,9	38,5	35,3	41,8
Total	37.486	78,9	78,5	79,3	76,8	76,3	77,2	68,2	67,8	68,7

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.32.

Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

		Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
Muestra		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.636	48,0	46,6	49,5	40,1	38,7	41,5	20,2	19,0	21,3
Aragón	2.710	57,7	55,9	59,6	50,3	48,4	52,2	23,2	21,6	24,8
Asturias	1.890	50,4	48,2	52,7	43,3	41,1	45,5	24,6	22,6	26,5
Baleares	859	45,9	42,6	49,3	38,4	35,1	41,6	17,1	14,6	19,7
Canarias	3.592	40,1	38,5	41,7	32,5	31,0	34,0	15,4	14,2	16,6
Cantabria	1.885	52,7	50,4	54,9	44,9	42,7	47,2	25,9	24,0	27,9
Castilla y León	2.284	58,2	56,2	60,2	51,3	49,3	53,4	27,7	25,9	29,5
Castilla-La Mancha	1.941	52,3	50,0	54,5	43,9	41,7	46,1	23,3	21,5	25,2
Cataluña	2.510	50,8	48,8	52,7	44,6	42,7	46,6	23,7	22,0	25,3
C. Valenciana	3.260	57,4	55,7	59,1	48,4	46,6	50,1	26,5	25,0	28,1
Extremadura	905	42,0	38,8	45,3	34,2	31,1	37,3	16,6	14,2	19,0
Galicia	2.102	44,4	42,3	46,5	37,4	35,4	39,5	20,9	19,1	22,6
Madrid	4.404	46,6	45,1	48,0	39,4	37,9	40,8	20,6	19,4	21,8
Murcia	1.085	47,5	44,5	50,4	37,5	34,6	40,4	18,9	16,5	21,2
Navarra	662	60,4	56,7	64,1	53,2	49,4	57,0	25,8	22,5	29,2
País Vasco	1.164	58,0	55,2	60,9	52,1	49,3	55,0	28,1	25,5	30,7
Rioja	507	50,3	46,0	54,7	43,7	39,4	48,0	20,2	16,7	23,6
Ceuta	224	14,8	10,2	19,5	11,4	7,2	15,5	5,0	2,1	7,8
Melilla	866	23,4	20,6	26,3	18,9	16,3	21,5	7,9	6,1	9,7
Total	37.486	50,1	49,6	50,6	42,6	42,1	43,1	22,2	21,8	22,6

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.33.

Prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

Muestra		Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.636	32,5	31,2	33,9
Aragón	2.710	34,7	32,9	36,5
Asturias	1.890	37,0	34,8	39,2
Baleares	859	26,3	23,4	29,2
Canarias	3.592	24,7	23,3	26,1
Cantabria	1.885	34,3	32,1	36,4
Castilla y León	2.284	39,0	37,0	41,0
Castilla-La Mancha	1.941	40,7	38,5	42,9
Cataluña	2.510	28,2	26,5	30,0
C. Valenciana	3.260	40,1	38,4	41,8
Extremadura	905	29,2	26,3	32,2
Galicia	2.102	29,6	27,7	31,6
Madrid	4.404	26,7	25,4	28,0
Murcia	1.085	31,8	29,0	34,5
Navarra	662	40,6	36,8	44,3
País Vasco	1.164	38,9	36,1	41,7
Rioja	507	26,9	23,0	30,7
Ceuta	224	8,1	4,5	11,7
Melilla	866	12,9	10,7	15,2
Total	37.486	32,2	31,7	32,7

Binge drinking o consumo en atracón: tomar cinco o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas seguidas en un intervalo aproximado de dos horas.

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.34.

Prevalencia de hacer botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

Muestra		Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.636	59,9	58,5	61,4	31,6	30,2	32,9
Aragón	2.710	65,0	63,2	66,7	27,1	25,4	28,8
Asturias	1.890	57,0	54,8	59,3	22,8	20,9	24,7
Baleares	859	49,3	45,9	52,6	18,9	16,3	21,6
Canarias	3.592	35,8	34,2	37,3	11,9	10,9	13,0
Cantabria	1.885	60,1	57,9	62,4	32,9	30,8	35,0
Castilla y León	2.284	63,0	61,0	65,0	29,7	27,8	31,6
Castilla-La Mancha	1.941	71,3	69,3	73,3	40,7	38,6	42,9
Cataluña	2.510	56,7	54,8	58,7	21,8	20,2	23,4
C. Valenciana	3.260	61,5	59,8	63,2	25,8	24,3	27,3
Extremadura	905	72,8	69,9	75,7	33,7	30,7	36,8
Galicia	2.102	46,8	44,7	48,9	19,5	17,8	21,2
Madrid	4.404	52,0	50,5	53,5	19,7	18,6	20,9
Murcia	1.085	61,0	58,1	63,9	25,2	22,6	27,7
Navarra	662	52,6	48,8	56,4	18,4	15,5	21,4
País Vasco	1.164	64,4	61,6	67,1	29,4	26,7	32,0
Rioja	507	58,3	54,0	62,6	22,3	18,6	25,9
Ceuta	224	23,6	18,0	29,1	12,2	7,9	16,5
Melilla	866	38,7	35,5	41,9	20,7	18,0	23,4
Total	37.486	57,6	57,1	58,1	25,5	25,1	25,9

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.35.

Prevalencia de hacer botellón y beber alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

Muestra		Últimos 12 meses		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.636	51,2	49,7	52,6
Aragón	2.710	58,5	56,7	60,4
Asturias	1.890	49,5	47,2	51,7
Baleares	859	42,5	39,2	45,8
Canarias	3.592	30,4	28,9	31,9
Cantabria	1.885	52,8	50,6	55,1
Castilla y León	2.284	55,9	53,8	57,9
Castilla-La Mancha	1.941	59,1	56,9	61,3
Cataluña	2.510	49,6	47,6	51,5
C. Valenciana	3.260	56,2	54,5	57,9
Extremadura	905	55,1	51,8	58,3
Galicia	2.102	42,4	40,2	44,5
Madrid	4.404	43,4	42,0	44,9
Murcia	1.085	51,2	48,2	54,2
Navarra	662	47,6	43,8	51,4
País Vasco	1.164	60,1	57,3	62,9
Rioja	507	53,2	48,8	57,5
Ceuta	224	15,4	10,7	20,1
Melilla	866	26,6	23,7	29,6
Total	37.486	49,9	49,4	50,4

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.36.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

		Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			A diario en los últimos 30 días		
Muestra		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.636	35,3	33,9	36,6	29,1	27,8	30,4	24,3	23,1	25,5	8,3	7,5	9,1
Aragón	2.710	41,8	39,9	43,6	35,2	33,4	37,0	28,7	27,0	30,4	11,8	10,6	13,0
Asturias	1.890	35,7	33,6	37,9	30,4	28,4	32,5	25,3	23,4	27,3	8,7	7,4	10,0
Baleares	859	38,1	34,9	41,4	30,6	27,5	33,7	24,6	21,7	27,4	7,9	6,1	9,7
Canarias	3.592	29,8	28,3	31,3	21,8	20,4	23,1	18,1	16,8	19,3	3,8	3,2	4,5
Cantabria	1.885	36,3	34,1	38,4	30,2	28,1	32,3	24,7	22,7	26,6	8,3	7,1	9,6
Castilla y León	2.284	42,2	40,2	44,2	34,0	32,1	36,0	27,7	25,8	29,5	10,3	9,1	11,6
Castilla-La Mancha	1.941	36,9	34,7	39,0	29,7	27,7	31,7	25,2	23,3	27,1	7,8	6,6	9,0
Cataluña	2.510	45,5	43,5	47,4	37,7	35,8	39,6	30,8	29,0	32,6	11,0	9,8	12,2
C. Valenciana	3.260	42,5	40,8	44,2	33,9	32,3	35,6	27,8	26,3	29,3	9,6	8,6	10,6
Extremadura	905	31,5	28,5	34,5	24,8	22,0	27,6	21,2	18,5	23,8	8,5	6,7	10,3
Galicia	2.102	35,3	33,3	37,3	29,6	27,6	31,5	23,9	22,1	25,7	8,0	6,9	9,2
Madrid	4.404	35,7	34,3	37,1	29,1	27,7	30,4	24,3	23,0	25,5	8,9	8,1	9,7
Murcia	1.085	35,8	32,9	38,6	29,4	26,7	32,1	24,3	21,7	26,9	8,0	6,4	9,7
Navarra	662	38,9	35,1	42,6	32,8	29,2	36,3	26,6	23,2	29,9	7,9	5,8	10,0
País Vasco	1.164	42,3	39,4	45,1	34,7	32,0	37,5	27,8	25,2	30,3	8,6	7,0	10,3
Rioja	507	34,2	30,1	38,3	30,2	26,2	34,1	24,6	20,8	28,3	7,6	5,3	9,9
Ceuta	224	18,1	13,0	23,1	13,9	9,4	18,4	11,0	6,9	15,1	1,6	0,0	3,2
Melilla	866	22,6	19,8	25,4	18,5	16,0	21,1	15,9	13,5	18,3	4,0	2,7	5,3
Total	37.486	38,4	37,9	38,9	31,4	30,9	31,9	25,9	25,4	26,3	8,9	8,6	9,2

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.37.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

		Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
Muestra		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.636	23,7	22,5	24,9	20,9	19,8	22,1	15,5	14,5	16,6
Aragón	2.710	31,1	29,4	32,9	26,2	24,5	27,9	18,9	17,5	20,4
Asturias	1.890	27,0	25,0	29,0	23,7	21,7	25,6	17,1	15,4	18,8
Baleares	859	33,3	30,2	36,5	29,7	26,6	32,7	21,2	18,5	23,9
Canarias	3.592	25,0	23,5	26,4	20,9	19,6	22,2	15,7	14,6	16,9
Cantabria	1.885	28,1	26,0	30,1	25,0	23,0	26,9	18,6	16,9	20,4
Castilla y León	2.284	28,3	26,5	30,2	23,6	21,8	25,3	16,9	15,4	18,5
Castilla-La Mancha	1.941	23,7	21,8	25,6	20,7	18,9	22,5	14,8	13,2	16,4
Cataluña	2.510	37,1	35,2	39,0	33,7	31,8	35,5	23,4	21,8	25,1
C. Valenciana	3.260	35,6	34,0	37,3	31,0	29,5	32,6	23,3	21,8	24,7
Extremadura	905	18,3	15,8	20,8	15,5	13,1	17,8	12,1	10,0	14,2
Galicia	2.102	24,9	23,0	26,7	21,5	19,8	23,3	16,4	14,8	18,0
Madrid	4.404	27,9	26,6	29,3	23,9	22,6	25,2	17,5	16,4	18,6
Murcia	1.085	24,6	22,0	27,1	20,1	17,8	22,5	15,5	13,3	17,6
Navarra	662	32,5	29,0	36,1	28,1	24,7	31,5	22,5	19,3	25,7
País Vasco	1.164	36,1	33,3	38,8	31,8	29,1	34,4	23,2	20,8	25,7
Rioja	507	21,8	18,2	25,4	19,6	16,2	23,1	13,5	10,5	16,4
Ceuta	224	14,4	9,8	18,9	11,5	7,4	15,7	9,3	5,5	13,1
Melilla	866	14,4	12,1	16,7	12,5	10,3	14,7	10,2	8,2	12,2
Total	37.486	29,1	28,7	29,6	25,4	25,0	25,9	18,6	18,2	19,0

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.38.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

		Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
Muestra		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	4.636	15,8	14,8	16,9	10,6	9,7	11,5	5,8	5,2	6,5
Aragón	2.710	14,4	13,1	15,7	9,7	8,6	10,9	5,5	4,6	6,3
Asturias	1.890	15,4	13,8	17,1	10,9	9,5	12,3	6,4	5,3	7,5
Baleares	859	16,0	13,5	18,4	10,4	8,4	12,4	4,9	3,4	6,3
Canarias	3.592	15,0	13,8	16,1	9,4	8,4	10,4	5,3	4,6	6,1
Cantabria	1.885	13,9	12,4	15,5	9,7	8,3	11,0	6,1	5,0	7,2
Castilla y León	2.284	13,4	12,0	14,8	9,6	8,4	10,8	4,9	4,0	5,8
Castilla-La Mancha	1.941	13,9	12,3	15,4	9,5	8,2	10,8	5,8	4,8	6,9
Cataluña	2.510	18,6	17,1	20,1	12,5	11,2	13,8	7,1	6,1	8,1
C. Valenciana	3.260	17,6	16,3	18,9	12,2	11,1	13,3	7,6	6,7	8,5
Extremadura	905	14,5	12,2	16,8	8,7	6,9	10,6	5,1	3,7	6,6
Galicia	2.102	16,5	14,9	18,1	10,4	9,1	11,7	6,4	5,3	7,4
Madrid	4.404	15,3	14,2	16,4	10,2	9,3	11,1	6,0	5,3	6,7
Murcia	1.085	16,5	14,3	18,7	10,8	9,0	12,7	5,9	4,5	7,3
Navarra	662	18,5	15,5	21,4	11,8	9,3	14,2	6,3	4,5	8,2
País Vasco	1.164	14,9	12,9	17,0	9,8	8,1	11,5	6,2	4,8	7,6
Rioja	507	11,5	8,7	14,3	8,9	6,4	11,4	6,1	4,0	8,1
Ceuta	224	11,2	7,1	15,4	6,8	3,5	10,1	3,5	1,1	5,9
Melilla	866	12,8	10,6	15,0	9,4	7,5	11,4	6,3	4,7	7,9
Total	37.486	16,1	15,7	16,4	10,8	10,4	11,1	6,2	5,9	6,4

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.39.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

Muestra		Edad media inicio en el consumo de			
		Tabaco	Tabaco diario	Alcohol	Cannabis
Andalucía	4.636	13,9	14,5	14,0	15,1
Aragón	2.710	13,5	14,3	13,4	14,7
Asturias	1.890	14,0	14,5	13,8	14,8
Baleares	859	13,8	14,8	13,8	14,6
Canarias	3.592	13,9	14,3	14,0	14,8
Cantabria	1.885	13,9	14,4	13,9	15,0
Castilla y León	2.284	13,7	14,4	13,6	15,1
Castilla-La Mancha	1.941	14,0	14,4	13,8	15,0
Cataluña	2.510	13,9	14,7	13,8	14,6
C. Valenciana	3.260	13,8	14,4	13,6	14,7
Extremadura	905	13,7	14,5	14,0	15,0
Galicia	2.102	14,0	14,8	14,2	14,9
Madrid	4.404	13,9	14,7	13,9	14,9
Murcia	1.085	13,8	14,4	13,7	14,9
Navarra	662	13,9	14,4	13,6	14,9
País Vasco	1.164	13,9	14,4	13,6	14,6
Rioja	507	13,9	14,3	13,8	14,9
Ceuta	224	14,0	14,0	14,1	14,6
Melilla	866	13,9	14,5	14,2	15,1
Total	37.486	13,9	14,5	13,8	14,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.40.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.

	Muestra	Cannabis	Éxtasis	Cocaína en polvo	Heroína	Alucinógenos	GHB o éxtasis líquido	Bebidas alcohólicas	Tabaco	Hipnosedantes
Andalucía	4.636	60,2	19,3	25,3	19,5	23,8	15,9	89,7	88,9	44,0
Aragón	2.710	69,8	23,0	29,6	21,0	27,6	19,1	94,9	93,6	52,5
Asturias	1.890	69,3	26,8	35,5	26,4	31,2	23,5	93,2	90,8	54,8
Baleares	859	66,8	16,5	22,0	15,2	21,7	13,4	89,6	88,3	45,6
Canarias	3.592	61,9	21,9	28,9	23,7	23,4	18,7	86,8	84,2	46,7
Cantabria	1.885	68,7	26,9	33,1	24,1	29,7	22,2	93,2	90,4	50,6
Castilla y León	2.284	64,4	22,0	29,0	19,1	24,3	19,4	92,5	91,2	45,1
Castill-La Mancha	1.941	63,4	23,4	30,7	23,9	27,5	19,5	91,0	90,0	49,4
Cataluña	2.510	70,4	22,4	29,4	22,1	27,9	20,2	91,7	92,3	50,3
C. Valenciana	3.260	71,2	22,0	30,7	21,1	28,4	20,7	92,9	91,6	50,4
Extremadura	905	61,5	24,5	31,8	27,3	27,4	21,7	90,1	90,9	50,4
Galicia	2.102	67,1	25,8	34,6	25,3	31,1	20,8	92,6	91,5	54,5
Madrid	4.404	64,9	21,4	27,1	20,7	26,3	17,9	92,0	92,4	50,0
Murcia	1.085	58,3	16,4	21,8	17,2	20,5	13,6	90,3	89,6	47,1
Navarra	662	74,4	23,3	35,1	22,9	27,1	19,0	94,0	92,7	54,9
País Vasco	1.164	79,9	25,9	36,3	23,0	25,2	21,9	93,5	93,1	59,4
Rioja	507	69,6	21,5	32,4	20,8	21,8	17,5	94,9	90,1	48,3
Ceuta	224	52,4	22,9	33,0	23,3	20,2	19,8	75,4	80,6	45,8
Melilla	866	53,7	23,5	27,7	26,5	26,5	21,6	82,3	82,8	43,6
Total	37.486	66,3	21,8	28,9	21,4	26,2	18,7	91,4	90,8	49,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.41.

Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%)*. España, 2014.

	Campanías publicitarias	Educación en escuelas	Tratamiento voluntario	Tratamiento obligatorio	Administración metadona	Administración heroína	Control policial y aduanero	Leyes estrictas	Legalización cannabis	Legalización todas drogas
Andalucía	93,3	97,3	96,2	93,5	90,0	83,5	94,9	90,9	58,3	41,6
Aragón	92,7	96,9	96,2	92,0	91,4	82,4	92,7	87,2	57,6	35,1
Asturias	93,1	96,7	96,5	92,7	90,3	80,3	94,6	88,5	58,7	36,6
Baleares	94,2	97,5	96,1	93,3	91,5	85,4	95,0	87,8	59,8	37,7
Canarias	92,6	97,6	96,3	93,5	91,6	83,5	94,3	89,6	60,9	40,5
Cantabria	92,0	96,2	96,1	91,8	90,9	81,6	93,5	87,9	59,7	38,1
Castilla y León	92,8	97,3	96,6	92,6	91,4	81,9	93,0	88,9	57,3	36,8
Castilla-La Mancha	91,9	95,8	95,7	93,5	90,6	84,2	94,0	89,1	55,1	40,3
Cataluña	94,6	97,6	96,8	95,6	94,2	89,1	93,6	90,0	66,7	46,6
C. Valenciana	92,0	95,9	95,2	92,5	91,2	84,5	91,9	87,8	63,2	43,2
Extremadura	93,3	97,7	96,3	93,6	91,0	83,4	95,5	90,9	49,1	36,4
Galicia	91,0	97,0	96,3	90,8	90,9	80,8	92,2	85,0	56,2	32,7
Madrid	91,1	96,7	96,1	91,8	90,8	81,3	91,7	86,5	56,2	36,1
Murcia	90,9	96,9	96,4	92,6	91,2	85,5	93,4	87,9	59,0	43,2
Navarra	90,1	95,6	95,2	90,1	89,0	80,2	89,7	80,9	62,8	40,3
País Vasco	88,1	92,7	92,6	88,9	89,6	85,3	86,3	81,9	66,5	42,3
Rioja	92,6	97,4	95,9	92,7	91,4	83,5	94,6	87,7	54,1	38,3
Ceuta	92,3	95,4	96,0	93,3	87,0	86,0	93,6	93,1	54,8	48,2
Melilla	92,4	95,6	93,9	93,1	87,2	82,9	95,3	93,2	56,8	46,8
Total	92,5	96,8	96,0	93,0	91,2	84,1	93,1	88,4	59,9	40,6

Acciones propuestas en la encuesta, literalmente: Campanías publicitarias; Educación en las escuelas; Tratamiento voluntario a consumidores; Tratamiento obligatorio a consumidores; Administración médica de metadona; Administración médica de heroína; Control policial y aduanero; Leyes estrictas contra las drogas; Legalización de cannabis; Legalización de todas las drogas.

* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.42.

Principales vías de información por las que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han recibido información sobre drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2014.

	Padres/madres u otros familiares	Amigos	Profesores/Programa de prevención	Profesionales sanitarios	Organismos oficiales (Gobierno, Consejerías...)	Medios de comunicación	Internet	Ninguna
Andalucía	61,3	41,9	68,6	26,1	18,9	51,7	35,1	4,1
Aragón	67,9	48,0	68,5	24,5	22,3	51,9	35,4	3,3
Asturias	69,7	44,3	64,9	24,7	23,4	56,0	36,0	3,6
Baleares	68,0	49,2	71,7	26,5	22,1	54,4	44,4	3,4
Canarias	70,0	41,0	67,8	31,5	31,3	49,9	37,8	3,2
Cantabria	65,4	43,4	66,3	28,8	29,8	52,7	34,6	4,0
Castilla y León	66,0	44,9	69,5	26,4	21,3	53,5	35,1	2,9
Castilla-La Mancha	61,8	42,3	68,8	28,5	23,0	54,0	34,2	4,7
Cataluña	65,8	52,9	68,5	31,9	18,8	48,9	39,8	3,0
C. Valenciana	63,5	47,8	67,5	29,7	24,5	49,8	35,5	3,3
Extremadura	66,6	42,3	71,0	32,1	25,9	56,9	35,2	3,9
Galicia	65,2	41,1	69,7	22,2	19,7	52,6	36,4	2,4
Madrid	66,8	46,5	68,5	28,8	18,7	51,9	34,9	3,1
Murcia	63,5	41,0	65,1	21,8	20,6	45,7	32,0	6,1
Navarra	61,1	46,9	63,7	24,3	19,5	43,7	31,8	4,5
País Vasco	61,4	53,2	67,7	21,2	16,3	34,4	33,8	3,6
Rioja	65,8	39,0	78,5	27,6	35,4	48,8	30,0	2,1
Ceuta	62,6	45,2	61,9	33,2	24,0	57,9	37,5	8,6
Melilla	59,2	38,7	62,9	19,2	18,0	47,8	33,7	10,3
Total	64,6	45,9	68,4	27,7	21,0	50,4	36,0	3,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.43.



Principales vías de información por las que a los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años les gustaría recibir información sobre drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2014.

	Padres/madres u otros familiares	Amigos	Profesores/Programa de prevención	Profesionales sanitarios	Organismos oficiales (Gobierno, Consejerías...)	Medios de comunicación	Internet
Andalucía	35,6	14,1	46,1	56,5	30,8	28,2	25,8
Aragón	34,6	16,0	42,2	54,3	38,1	28,8	25,0
Asturias	39,1	16,1	43,3	53,2	35,0	27,6	28,2
Baleares	36,9	11,3	44,0	58,9	34,6	29,1	28,5
Canarias	38,5	14,6	43,8	55,8	42,6	29,6	27,1
Cantabria	38,3	17,8	43,4	55,9	40,2	30,6	25,1
Castilla y León	34,9	14,6	44,7	55,7	34,2	27,3	24,3
Castilla-La Mancha	36,8	14,6	43,1	58,0	34,9	30,0	24,7
Cataluña	34,1	16,6	42,0	58,8	33,2	26,8	26,0
C. Valenciana	38,2	15,7	45,7	58,6	36,3	26,8	24,8
Extremadura	38,4	13,1	47,2	61,1	38,9	31,8	27,0
Galicia	31,0	13,9	48,6	53,4	32,7	27,2	25,0
Madrid	36,2	15,6	44,7	57,4	32,8	28,1	25,0
Murcia	34,6	15,2	41,9	53,5	29,6	26,7	24,0
Navarra	31,6	14,3	47,1	51,4	33,4	23,9	25,0
País Vasco	35,4	19,7	53,3	51,7	31,9	21,1	26,7
Rioja	35,6	15,3	49,3	54,8	41,8	27,1	20,4
Ceuta	41,6	16,0	42,1	57,4	31,6	33,1	29,8
Melilla	41,4	17,4	42,5	46,5	28,0	29,3	29,5
Total	35,7	15,3	45,0	56,7	33,8	27,6	25,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.44.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.





69,0 69,7 71,0 61,8 61,4 68,9 74,4 72,3 68,1 75,2 65,2 65,4 61,5 69,8 72,7 71,5 65,6 27,7 38,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.45.

Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.





20,2 23,2 24,6 17,1 15,4 25,9 27,7 23,3 23,7 26,5 16,6 20,9 20,6 18,9 25,8 28,1 20,2 5,0 7,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.46.

Prevalencia de binge drinking o consumo en atracón en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.





32,5 34,7 37,0 26,3 24,7 34,3 39,0 40,7 28,2 40,1 29,2 29,6 26,7 31,8 40,6 38,9 26,9 8,1 12,9

Binge drinking o consumo en atracón: tomar cinco o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas seguidas en un intervalo aproximado de dos horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.47.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.





59,9 65,0 57,0 49,3 35,8 60,1 63,0 71,3 56,7 61,5 72,8 46,8 52,0 61,0 52,6 64,4 58,3 23,6 38,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.48.

Prevalencia de consumo de tabaco a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.





8,3 11,8 8,7 7,9 3,8 8,3 10,3 7,8 11,0 9,6 8,5 8,0 8,9 8,0 7,9 8,6 7,6 1,6 4,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.49.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.





15,5 18,9 17,1 21,2 15,7 18,6 16,9 14,8 23,4 23,3 12,1 16,4 17,5 15,5 22,5 23,2 13,5 9,3 10,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.50.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.





10,6 9,7 10,9 10,4 9,4 9,7 9,6 9,5 12,5 12,2 8,7 10,4 10,2 10,8 11,8 9,8 8,9 6,8 9,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.51.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “muy importante o algo importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, por Comunidad/Ciudad Autónoma*. España, 2014.




* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.52.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2014.




20,4 17,3 10,6 15,2 8,7 13,2 14,6 12,9 22,2 20,1 16,1 10,0 15,3 14,0 15,3 11,2 9,3 22,3 19,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.53.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, de la prevalencia de borracheras (últimos 30 días), de la prevalencia de binge drinking (últimos 30 días) (%), de la edad media de inicio del consumo y de la edad media de inicio del consumo semanal (años), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9
Últimos 12 meses	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8
Últimos 30 días	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2
Borracheras últimos 30 días	16,1	15,3	16,5	21,7	20,2	28,0	25,6	29,1	35,6	30,8	22,2
Binge drinking últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	-	41,4	36,7	41,8	32,2
Edad media de inicio consumo	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,9	13,8
Edad media de consumo alcohol semanal	-	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,0	14,8	14,8	15,1	15,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.54.

Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.55.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo y según edad. España, 1994-2014.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida											
Total	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9
Sexo											
Hombre	84,3	84,3	85,5	78,2	75,9	81,5	78,4	80,8	74,9	82,9	77,8
Mujer	84,0	84,1	86,4	77,9	77,2	82,5	80,7	81,7	75,2	84,9	80,1
Edad											
14 años	69,6	67,6	71,5	52,4	52,7	59,2	57,1	62,6	49,7	65,9	60,1
15 años	81,8	81,7	82,5	73,4	70,4	76,6	76,1	78,7	71,5	77,7	73,7
16 años	88,0	88,7	89,7	83,1	81,7	86,9	86,0	86,2	81,6	86,2	84,1
17 años	91,9	91,3	92,8	89,6	89,0	91,9	91,2	90,5	87,8	90,8	90,6
18 años	92,5	93,4	96,2	93,8	92,2	93,8	92,3	92,3	88,6	92,6	92,4
Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses											
Total	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8
Sexo											
Hombre	82,8	82,3	83,0	77,3	74,9	80,6	73,4	71,5	73,3	80,9	75,3
Mujer	82,7	82,5	84,5	77,3	76,3	81,5	76,3	74,2	73,8	82,9	78,2
Edad											
14 años	67,7	64,3	67,9	51,5	52,0	57,9	50,9	53,1	48,0	63,1	57,4
15 años	80,4	79,7	80,5	72,7	69,7	75,6	70,9	69,6	70,0	75,3	71,2
16 años	86,7	87,4	88,0	82,4	80,9	85,9	82,1	77,6	80,3	84,2	82,2
17 años	90,7	89,9	90,9	88,7	87,6	91,1	87,4	84,1	86,1	89,2	88,7
18 años	91,1	92,4	94,1	93,3	91,2	93,0	88,2	84,2	86,4	91,3	90,7
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días											
Total	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2
Sexo											
Hombre	75,3	66,8	67,5	60,4	56,7	65,5	58,1	57,7	62,7	72,9	66,9
Mujer	74,9	66,7	68,5	59,9	55,4	65,7	58,0	59,4	63,2	75,2	69,5
Edad											
14 años	56,7	40,1	43,2	32,1	27,7	38,0	31,7	36,2	38,1	53,2	48,4
15 años	71,8	60,1	62,2	51,8	47,7	57,7	50,7	52,9	58,9	66,0	61,3
16 años	80,0	74,1	73,4	65,7	61,6	71,9	65,3	63,8	70,0	75,6	74,0
17 años	85,1	79,4	81,1	73,7	71,5	78,2	74,2	71,9	74,8	82,4	80,8
18 años	86,2	84,1	85,0	82,7	76,8	81,5	76,5	75,1	77,1	86,4	84,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.56.

Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2014.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio del consumo (años)	13,1	13,8	13,5	14,0	13,5	14,0	13,4	13,8	13,4	13,8	13,6	13,9	13,7	13,8	13,6	13,8	13,7	13,7	13,8	13,9	13,8	13,9
Edad media de inicio del consumo de alcohol semanal (años)	-	-	15,0	15,0	15,0	15,1	14,8	14,9	15,0	14,9	15,2	15,1	15,0	14,9	14,9	14,8	14,8	14,7	15,1	15,0	15,1	14,9
Prevalencia de consumo alguna vez en la vida	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1
Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5
Prevalencia de consumo en fin de semana en los últimos 30 días	-	-	66,0	66,4	67,0	68,1	60,1	59,8	56,3	55,2	65,1	65,5	57,7	57,7	61,2	61,3	71,3	71,5	70,1	72,8	63,0	66,5
Prevalencia de consumo en días laborables los últimos 30 días	-	-	26,8	14,9	26,0	16,1	30,0	16,8	20,8	10,6	26,5	14,1	24,2	13,9	28,4	17,8	33,1	21,4	35,3	25,6	28,8	22,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.57.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.58.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Vino	24,8	32,4	38,7	42,8	43,0
Cerveza	20,9	31,0	44,4	54,4	58,8
Licores fuertes	17,2	25,5	34,6	35,5	37,9
Combinados/cubatas	31,6	47,3	61,3	68,9	74,3
Aperitivos/vermut	9,6	13,2	15,7	17,3	20,2
Licores de frutas	23,5	29,8	32,0	31,4	30,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.59.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo y disponibilidad percibida de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.60.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.

	14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Alguna vez en la vida	58,7	61,3	70,7	76,0	83,4	85,0	89,4	91,7	92,1	92,8
Últimos 12 meses	55,5	59,2	67,6	74,7	81,3	83,1	87,3	90,1	90,4	91,1
Últimos 30 días	45,8	50,7	58,1	64,3	73,0	74,9	80,4	81,0	84,4	85,4
Diario en los últimos 30 días	1,0	0,8	1,6	1,0	2,2	1,3	2,8	2,0	4,1	1,5
Nunca	41,3	38,7	29,3	23,5	16,6	15,2	10,6	8,3	7,9	7,2

H = Hombre; M = Mujer.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.61.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas algún fin de semana (1, 2 o 3), todos los fines de semana, algún día laborable (1, 2 o 3 por semana) y todos los días laborables en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.

	Algún fin de semana (1, 2 o 3)	Todos los fines de semana	Algún día laborable (1, 2 o 3 por semana)	Todos los días laborables
Total	50,1	13,7	21,5	1,8
Sexo				
Hombres	46,7	15,3	24,2	2,4
Mujeres	53,4	12,1	18,9	1,3
Edad				
14 años	36,8	4,8	12,8	1,2
15 años	47,2	9,0	16,7	1,7
16 años	54,8	15,2	23,0	1,8
17 años	56,9	20,7	28,6	2,4
18 años	57,5	25,0	33,0	2,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.62.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables o en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2014.

Total		14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
	Días laborables Fin de semana	Días laborables Fin de semana	Días laborables Fin de semana	Días laborables Fin de semana	Días laborables Fin de semana	Días laborables Fin de semana	Días laborables Fin de semana	Días laborables Fin de semana	Días laborables Fin de semana	Días laborables Fin de semana	Días laborables Fin de semana
Vino/champán	9,1 33,5	7,0 22,8	7,9 30,4	9,6 36,4	10,8 40,6	11,6 40,7					
Cerveza/sidra	16,3 38,4	7,5 19,3	11,1 29,5	18,0 42,9	23,9 52,9	27,1 57,4					
Aperitivos/vermut	5,8 13,2	4,0 8,7	5,2 11,8	5,9 14,3	7,2 15,6	7,9 18,2					
Combinados/cubatas	10,3 54,0	6,7 30,6	9,8 46,5	11,0 60,8	11,9 68,3	14,7 73,7					
Licores de frutas	7,6 27,7	6,9 21,8	7,9 28,0	8,0 30,3	7,4 29,6	7,6 28,2					
Licores fuertes	6,1 28,0	4,5 15,9	5,7 24,1	6,8 33,3	6,8 34,3	6,9 36,4					
Calimocho	2,5 16,6	1,9 10,9	2,7 15,8	2,7 19,0	2,6 18,8	2,9 19,3					
Sangría	2,5 12,2	1,7 7,2	2,4 10,5	2,8 14,2	2,8 15,3	3,3 15,1					
Cualquier bebida alcohólica	25,6 64,8	15,8 43,2	20,4 57,6	27,4 70,8	33,2 78,3	37,9 83,0					

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.63.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables o en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2014.


Total				14 años				15 años				16 años				17 años				18 años			
Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Vino/champán																							
10,1	8,1	32,7	34,3	7,3	6,6	21,9	23,7	8,9	7,0	28,6	32,2	11,3	8,0	35,7	37,0	12,2	9,4	40,4	40,8	10,8	12,5	39,0	42,8
Cerveza/sidra																							
19,8	12,9	41,8	35,0	8,2	6,9	21,1	17,8	13,2	9,1	31,2	27,8	22,1	14,0	47,4	38,6	28,5	19,3	56,8	49,0	33,4	19,5	61,2	52,7
Aperitivos/vermut																							
6,9	4,7	14,2	12,1	4,5	3,5	9,6	7,9	5,8	4,6	12,3	11,3	7,4	4,6	15,8	12,9	8,4	5,9	16,8	14,4	9,8	5,6	19,0	17,2
Combinados/cubatas																							
12,2	8,5	51,7	56,3	7,3	6,1	27,4	33,4	11,7	8,1	43,0	49,7	13,3	8,8	58,2	63,1	14,3	9,4	66,3	70,3	15,8	13,2	71,1	76,9
Licores de frutas																							
8,3	6,8	25,8	29,6	7,0	6,8	20,1	23,4	8,6	7,3	24,8	31,1	8,7	7,3	28,2	32,3	8,8	6,1	28,4	30,8	8,2	6,8	27,7	28,8
Licores fuertes																							
7,6	4,6	29,3	26,8	4,8	4,2	15,4	16,5	7,0	4,6	24,1	24,0	8,7	5,0	34,6	32,1	9,0	4,6	36,9	31,6	8,3	5,1	39,2	33,0
Calimocho																							
2,8	2,3	15,9	17,3	2,1	1,7	10,2	11,6	3,0	2,3	14,9	16,7	3,0	2,5	17,8	20,2	3,1	2,2	18,9	18,8	2,7	3,2	18,1	20,8
Sangría																							
2,6	2,5	10,9	13,5	1,5	1,9	6,6	7,9	2,3	2,4	8,9	11,9	3,3	2,3	12,3	16,1	3,1	2,6	14,0	16,6	2,6	4,1	13,9	16,4
Cualquier bebida alcohólica																							
28,8	22,4	63,0	66,5	16,4	15,2	40,3	45,8	22,4	18,6	53,8	61,1	31,5	23,5	69,4	72,1	37,7	28,6	77,4	79,2	42,5	32,4	81,6	84,6

H = Hombre; M = Mujer.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.64.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables o en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.



	Días laborables	Fin de semana
Total	25,6	64,8
14 años	15,8	43,2
15 años	20,4	57,6
16 años	27,4	70,8
17 años	33,2	78,3
18 años	37,9	83,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.65.


Evolución de la prevalencia de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en días laborables o en fines de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1996-2014.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
CONSUMO EN DIAS LABORABLES										
Algún día de lunes a jueves durante los últimos 30 días										
Vino	8,1	8,9	8,2	4,9	6,6	5,3	5,8	5,2	6,3	9,1
Cerveza	15,3	14,0	16,2	10,5	14,1	12,8	15,0	13,7	17,5	16,3
Aperitivos	3,0	3,2	2,6	1,7	2,4	3,0	4,1	3,6	5,6	5,8
Combinados	5,4	6,4	6,8	5,0	6,8	7,4	10,6	10,2	10,8	10,3
Licores fuertes	3,2	3,6	3,5	2,3	3,2	3,5	5,5	5,3	5,7	6,1
Licores frutas	6,6	7,5	6,2	3,8	4,2	4,6	6,6	5,3	6,5	7,6
Todos los días de lunes a jueves durante los últimos 30 días										
Vino	0,8	1,0	0,9	0,3	0,7	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Cerveza	1,7	1,5	2,2	0,9	1,7	0,8	1,1	0,7	1,2	0,8
Aperitivos	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,5
Combinados	0,2	0,3	0,6	0,2	0,6	0,4	0,7	0,6	0,7	0,6
Licores fuertes	0,1	0,4	0,4	0,1	0,4	0,2	0,5	0,3	0,5	0,4
Licores frutas	0,3	0,8	0,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4
CONSUMO EN FIN DE SEMANA										
Algún fin de semana durante los últimos 30 días										
Vino	32,8	32,8	23,7	21,0	27,7	18,8	17,0	17,3	21,1	33,5
Cerveza	46,9	40,7	30,8	27,1	34,1	27,9	28,6	30,0	37,5	38,4
Aperitivos	12,0	13,6	9,6	8,0	11,0	8,3	8,4	9,4	11,8	13,2
Combinados	48,8	53,7	49,2	48,2	58,4	51,6	54,0	50,3	58,0	54,0
Licores fuertes	24,5	26,7	22,4	22,3	27,8	23,0	25,0	23,7	25,8	28,0
Licores frutas	36,2	37,1	25,6	22,6	26,0	20,6	20,8	18,3	23,6	27,7
Todos los fines de semana durante los últimos 30 días										
Vino	9,6	10,6	8,6	5,9	7,5	3,5	2,9	3,3	1,7	1,5
Cerveza	19,9	17,6	14,4	10,7	13,8	8,6	8,5	8,2	8,9	8,2
Aperitivos	2,9	4,2	3,3	2,1	2,7	1,5	1,9	2,2	1,8	1,7
Combinados	19,6	23,5	22,2	18,9	22,5	16,8	17,9	13,8	10,9	7,2
Licores fuertes	8,2	10,8	10,1	7,7	9,4	5,5	5,9	4,1	3,6	2,9
Licores frutas	10,2	12,0	9,0	6,0	6,8	3,8	3,5	2,5	2,2	1,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.66.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en este mismo periodo (%). España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Consumidores de alcohol en los últimos 30 días que se han emborrachado en ese período	21,4	23,0	24,2	36,1	36,1	42,7	44,1	49,6	50,3	40,2	33,1
Prevalencia de borracheras en últimos 30 días	16,1	15,3	16,5	21,7	20,2	28,0	25,6	29,1	35,6	30,8	22,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.67.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2008-2014.

	ALGUNA VEZ				ÚLTIMOS 12 MESES				ÚLTIMOS 30 DÍAS			
	2008	2010	2012	2014	2008	2010	2012	2014	2008	2010	2012	2014
Total	56,2	58,8	60,7	50,1	47,1	52,9	52,0	42,6	29,1	35,6	30,8	22,2
Sexo												
Hombres	54,8	58,0	59,9	48,7	46,5	52,2	51,7	41,5	29,4	36,4	31,3	22,3
Mujeres	57,5	59,5	61,5	51,4	47,7	53,5	52,3	43,7	28,7	34,8	30,3	22,1
Edad												
14 años	30,4	27,8	31,5	23,2	24,5	24,6	26,1	19,0	13,4	16,0	12,7	7,6
15 años	48,5	52,2	47,4	39,8	41,0	47,3	40,2	33,6	24,2	32,0	21,3	14,9
16 años	62,2	66,2	62,3	56,5	53,0	59,8	53,4	48,8	31,7	38,8	30,9	26,4
17 años	72,6	76,8	73,1	69,1	59,7	69,1	62,6	59,0	39,0	46,6	38,8	33,1
18 años	76,9	77,8	80,4	74,1	65,8	69,8	70,5	63,4	45,2	52,8	46,5	37,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.68.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Borracheras alguna vez	20,5	36,9	54,8	67,8	74,3	25,7	42,4	58,1	70,4	73,9
Borracheras últimos 12 meses	16,1	31,1	47,1	58,5	64,7	21,6	35,9	50,4	59,5	61,7
Borracheras últimos 30 días	6,1	14,0	26,1	34,1	39,5	9,0	15,8	26,6	32,1	35,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.69.


Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2014.

	Más de una vez al mes	Menos frecuentemente
Total	8,4	91,6
Sexo		
Hombres	9,3	90,7
Mujeres	7,6	92,4
Edad		
14 años	1,8	98,2
15 años	4,3	95,7
16 años	9,5	90,5
17 años	14,4	85,6
18 años	17,0	83,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.70.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombre	6,1	14,0	26,1	34,1	39,5
Mujer	9,0	15,8	26,6	32,1	35,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.71.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas tanto en días laborables como en fin de semana entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2014.




	Vino	Cerveza	Licores fuertes	Combinados/cubatas	Aperitivos/vermut	Licores de frutas
14 años	66,2	55,6	70,5	92,9	26,8	62,8
15 años	66,2	65,8	67,4	94,9	29,4	59,0
16 años	62,8	71,6	64,3	96,0	27,1	49,0
17 años	61,5	78,7	60,2	96,1	25,8	42,4
18 años	59,1	80,0	58,4	97,0	28,7	41,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.72.

Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida en fin de semana entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y según sexo (%). España, 2014.



	Hombres	Mujeres
Vino	40,5	39,4
Cerveza	42,4	41,6
Aperitivos	43,0	39,9
Combinados	41,9	38,3
Licores de frutas	38,1	35,9
Licores fuertes	48,6	49,4
Calimocho	47,8	46,6
Sangría	48,2	47,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.73.

Evolución de la prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2008-2014.

	2008	2010	2012	2014
Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14-18 años que han consumido en el mismo periodo	64,4	66,5	56,8	47,3
Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre todos los estudiantes de 14-18 años	41,4	36,7	41,8	32,2

Binge drinking o consumo en atracón: tomar cinco o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas seguidas en un intervalo aproximado de dos horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.74.

Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	Hombres	Mujeres
14 años	13,5	14,7
15 años	24,0	25,2
16 años	37,8	36,4
17 años	47,1	41,4
18 años	54,1	46,4

Binge drinking o consumo en atracón: tomar cinco o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas seguidas en un intervalo aproximado de dos horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.75.

Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el tipo de bebida consumida en fin de semana y según sexo (%). España, 2014.




	No binge drinking		Sí binge drinking	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Vino	39,8	45,2	60,2	54,8
Cerveza	38,9	43,0	61,1	57,0
Aperitivos	36,4	43,2	63,6	56,8
Combinados	39,9	48,0	60,1	52,0
Licores de frutas	40,7	49,3	59,3	50,7
Licores fuertes	30,8	34,4	69,2	65,6
Calimocho	28,2	34,1	71,8	65,9
Sangría	27,6	35,4	72,4	64,6

Binge drinking o consumo en atracón: tomar cinco o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas seguidas en un intervalo aproximado de dos horas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.76.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2014.




	Total	Hombre	Mujer
Supermercados	37,8	36,9	38,6
Bares o pubs	36,9	36,0	37,7
Discotecas	27,1	26,5	27,7
Tiendas de barrio*	25,4	26,7	24,1
Hipercarros	14,3	16,5	12,3
Casa de otras personas	14,3	14,4	14,3
Casa donde vives	10,7	11,9	9,5
Venta ambulante	2,7	3,5	2,0
Internet o venta telefónica	0,4	0,7	0,2

* Tiendas de barrio, quioscos, bodegas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.77.

Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2014.




	Total	Hombre	Mujer
Tú directamente	39,9	42,5	37,4
A través de otras personas de 18 años o mayores	29,5	25,9	32,9
A través de familiares de 18 años o mayores	13,6	12,0	15,0
A través de otras personas menores de 18 años	10,3	9,4	11,2
De otra forma	5,0	6,1	4,0
A través de familiares menores de 18 años	1,2	1,3	1,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.78.

Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2014.



	Total	Hombre	Mujer
Bares o pubs	37,1	35,9	38,2
Espacios públicos abiertos*	33,9	33,8	34,0
Discotecas	29,5	28,7	30,3
Casa de otras personas	24,4	24,2	24,6
Casa donde vives	14,2	16,2	12,3
Restaurantes	10,6	11,3	9,9
Otros sitios	9,7	11,1	8,2

* Espacios públicos abiertos (calles, plazas, parques, playas...)

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.79.

Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2014.

	Comprado o conseguido			Consumido		
	Total	14-17	18	Total	14-17	18
Supermercados	37,8	35,6	59,9	–	–	–
Bares o pubs	36,9	34,7	58,9	37,1	34,5	64,1
Discotecas	27,1	25,0	48,7	29,5	27,2	54,0
Tiendas de barrio, quioscos, bodegas	25,4	25,2	26,8	–	–	–
Hipermercados	14,3	13,2	25,4	–	–	–
Casa de otras personas	14,3	14,2	15,1	24,4	23,7	32,1
Casa donde vives	10,7	10,0	17,2	14,2	13,2	25,0
En calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos	–	–	–	33,9	33,4	38,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.80.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2014.

TOTAL				POR EDAD Y SEXO														
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Bares o pubs	36,9	36,0	37,7	11,7	10,6	12,7	24,6	22,2	27,0	40,6	39,4	41,8	54,7	53,8	55,7	58,9	57,5	60,6
Discotecas	27,1	26,5	27,7	6,9	6,7	7,2	16,8	15,4	18,2	29,4	27,9	30,8	41,2	40,6	41,9	48,7	46,6	51,2
Hipermercados	14,3	16,5	12,3	5,4	5,7	5,2	10,0	10,4	9,5	14,7	16,3	13,2	20,5	24,5	16,6	25,4	29,2	20,7
Supermercados	37,8	36,9	38,6	15,7	13,3	17,8	28,2	25,4	30,8	41,3	40,1	42,5	51,1	50,8	51,4	59,9	60,6	59,1
Tiendas de barrio, quioscos, bodegas	25,4	26,7	24,1	14,7	13,3	15,8	23,1	22,5	23,6	29,7	30,4	29,0	30,5	34,1	26,8	26,8	31,1	21,7
Casa donde vives	10,7	11,9	9,5	6,1	6,6	5,7	8,4	9,0	7,9	10,2	11,5	9,0	14,2	15,8	12,7	17,2	18,9	15,1
Casa de otras personas	14,3	14,4	14,3	10,0	8,8	11,1	13,4	12,6	14,1	15,4	15,0	15,8	16,9	18,0	15,8	15,1	17,0	12,8
Venta ambulante	2,7	3,5	2,0	2,2	2,8	1,7	2,6	3,3	1,9	3,1	3,6	2,6	3,1	4,0	2,2	2,5	3,5	1,3
Internet o venta telefónica	0,4	0,7	0,2	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4	0,7	0,1	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8	0,2

T = Total; H = Hombre; M = Mujer.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.81.

Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2014.

TOTAL				POR EDAD Y SEXO														
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Bares o pubs	37,1	35,9	38,2	10,8	9,4	12,0	24,1	21,0	27,0	41,2	39,1	43,2	56,5	55,7	57,4	64,1	64,0	64,2
Discotecas	29,5	28,7	30,3	8,8	7,9	9,7	18,6	16,9	20,3	33,2	31,9	34,4	43,8	43,1	44,5	54,0	51,9	56,7
Restaurantes	10,6	11,3	9,9	3,2	3,3	3,0	5,7	5,3	6,1	10,0	11,4	8,7	17,8	18,5	17,1	21,7	22,8	20,4
Casa donde vives	14,2	16,2	12,3	6,9	7,1	6,7	10,8	11,7	9,9	14,5	16,6	12,5	19,2	22,3	16,1	25,0	27,6	21,9
Casa de otras personas	24,4	24,2	24,6	13,2	11,0	15,2	20,5	19,0	21,9	27,8	27,2	28,3	30,7	31,5	30,0	32,1	35,2	28,2
En calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos	33,9	33,8	34,0	20,1	16,8	23,0	29,3	27,9	30,6	39,1	39,3	39,0	42,1	44,0	40,2	38,8	40,6	36,7
Otros sitios	9,7	11,1	8,2	6,8	7,5	6,2	9,6	10,0	9,2	10,3	12,0	8,6	11,1	13,8	8,5	10,2	12,0	8,1

T = Total; H = Hombre; M = Mujer.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.82.

Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo y edad (%). España, 2014.

TOTAL				POR EDAD Y SEXO														
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tú directamente	39,9	42,5	37,4	14,1	13,3	14,8	26,6	27,8	25,5	42,9	45,2	40,7	55,3	59,1	51,5	75,9	77,3	74,1
A través de familiares de 18 años o mayores	13,6	12,0	15,0	8,0	7,1	8,7	12,7	11,0	14,3	16,0	14,5	17,5	17,3	15,1	19,5	9,8	8,7	11,0
A través de otras personas de 18 años o mayores	29,5	25,9	32,9	15,5	13,4	17,4	25,7	21,4	29,7	35,3	31,1	39,2	41,1	36,7	45,4	18,8	17,5	20,4
A través de familiares menores de 18 años	1,2	1,3	1,2	1,0	0,7	1,1	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,3	1,3	1,4	1,2	0,9	1,2	0,4
A través de otras personas menores de 18 años	10,3	9,4	11,2	9,0	7,4	10,4	11,8	10,0	13,4	12,9	12,8	13,0	9,6	9,2	10,0	3,9	3,7	4,2
De otra forma	5,0	6,1	4,0	4,5	5,3	3,8	5,0	5,9	4,2	5,7	6,9	4,5	5,4	6,8	3,9	3,0	3,7	2,1

T = Total; H = Hombre; M = Mujer.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.83.


Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2014.

	Botellón en los últimos 12 meses	Botellón en los últimos 30 días
Total	57,6	25,5
Sexo		
Hombre	55,9	24,6
Mujer	59,3	26,4
Edad		
14 años	34,9	11,3
15 años	51,2	19,5
16 años	64,3	30,0
17 años	72,0	35,0
18 años	71,9	37,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.84.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.



	Total	14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Ha hecho botellón al menos una vez	57,6	31,7	37,9	47,1	55,1	62,2	66,2	71,8	72,2	73,6	69,8
Ha hecho botellón al menos una vez y ha consumido alcohol	49,9	23,1	29,5	38,9	46,5	54,4	59,1	64,3	66,2	67,0	62,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.85.

Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses, de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2014.

	14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
	¿HA HECHO BOTELLÓN?									
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	46,2	4,7	57,9	8,9	68,5	14,2	74,2	20,5	76,4	29,8
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	20,2	1,1	27,3	2,4	38,5	5,3	43,2	7,6	47,2	13,1
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	34,1	3,6	41,9	6,2	51,8	10,6	56,1	13,6	62,3	20,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.86.

Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes*, cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2014.

	14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
	¿HA HECHO BOTELLÓN?									
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido tabaco	40,1	6,9	40,8	9,5	47,7	12,7	48,3	17,5	53,8	23,7
Ha consumido hipnosedantes*	11,0	5,2	12,1	7,4	13,2	8,4	14,7	9,8	12,9	11,0
Ha consumido cannabis	25,4	3,2	31,4	7,1	40,8	9,0	44,2	14,1	45,1	16,3
Ha consumido cocaína**	3,8	0,8	3,6	1,1	3,9	1,3	4,0	1,5	5,0	0,8
Ha consumido éxtasis	0,9	0,2	1,0	0,1	1,1	0,4	1,4	0,2	2,7	0,9
Ha consumido anfetaminas	1,0	0,2	1,5	0,2	1,3	0,3	1,4	0,3	2,2	0,4
Ha consumido alucinógenos	1,7	0,5	1,7	0,2	1,3	0,7	1,8	0,5	2,4	0,2

* Con o sin receta.

** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.87.

Incidencia del consumo de alcohol en los últimos 12 meses y 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2014.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Últimos 12 meses	286,0	131,1	154,6	88,8	38,8	49,9	88,5	38,5	49,9	61,6	29,7	31,9	36,7	18,6	18,0	10,3	5,5	4,9	275,7	125,6	149,7
Últimos 30 días	70,2	34,3	35,9	20,7	9,0	11,7	18,7	8,5	10,1	16,1	8,5	7,6	11,7	6,5	5,1	3,1	1,7	1,4	67,1	32,6	34,5

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.88.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según sexo y edad (%). España, 2014.

	Total			14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
	T	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Bebidas energéticas	40,4	49,7	31,4	46,8	27,8	48,8	28,9	51,3	33,0	51,2	34,3	50,8	35,4
Bebidas energéticas mezcladas con alcohol	14,3	16,0	12,6	8,8	6,6	12,4	9,8	17,7	15,0	21,8	17,4	21,6	16,1

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.89.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2014.


Total	Ha consumido alcohol	Se ha emborrachado	Ha hecho binge drinking	Ha consumido tabaco	Ha consumido hipnosedantes*	Ha consumido cannabis	Ha consumido cocaína
Ha consumido bebidas energéticas							
40,4	47,5	56,4	55,7	58,2	54,5	63,0	65,0
Ha consumido bebidas energéticas mezcladas con alcohol							
14,3	21,1	35,4	32,4	30,8	27,1	35,1	41,6

* Con o sin receta

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.90.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4
Últimos 12 meses	–	–	–	–	–	–	34,0	38,1	32,4	35,3	31,4
Últimos 30 días	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9
Diariamente en últimos 30 días	21,6	23,7	23,1	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9
Edad media de inicio consumo	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9
Edad media de inicio consumo diario	–	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.91.

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.




Total	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
25,9	15,0	20,5	29,4	32,7	39,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.92.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Hombres	17,8	19,0	17,9	19,3	17,7	18,9	12,5	13,3	11,0	12,0	8,7
Mujeres	25,4	28,1	27,5	27,0	24,2	24,1	16,9	16,4	13,6	13,1	9,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.93.

Evolución de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco, según sexo (%). España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Hombres	17,8	19,0	17,9	19,3	17,7	18,9	12,5	13,3	11,0	12,0	8,7
Mujeres	25,4	28,1	27,5	27,0	24,2	24,1	16,9	16,4	13,6	13,1	9,1
Percepción del riesgo de fumar un paquete diario de tabaco	76,9	75,2	78,0	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.94.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de un paquete diario de tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que puede causar bastantes o muchos problemas) y prevalencia del consumo diario de tabaco (%). España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Riesgo percibido	76,9	75,2	78,0	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7
Prevalencia consumo diario	21,6	23,7	23,1	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.95.

Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	1,7	5,1	10,4	12,6	18,1
Mujeres	2,6	5,6	11,1	13,2	20,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.96.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
14 años	44,5	49,8	51,3	45,8	43,8	42,1	28,4	28,4	22,7	27,1	22,3
15 años	58,3	60,1	58,6	58,5	55,5	54,7	41,5	40,6	34,4	35,4	31,3
16 años	63,9	69,1	65,7	62,7	63,0	62,3	50,7	47,5	44,8	43,0	43,0
17 años	68,5	69,9	69,5	68,6	67,2	70,0	55,1	54,2	51,1	50,9	48,8
18 años	72,7	76,7	76,9	78,6	73,2	77,3	61,8	60,4	52,9	59,1	56,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.97.


Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.98.


Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.99.

Evolución del porcentaje de hogares de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los que viven personas que fuman diariamente. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
% alumnos	68,2	62,4	63,8	63,0	58,0	55,9	47,7	52,9	50,0	50,0	49,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.100.

Media de cigarrillos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Hombres	9,1	8,3	7,9	7,6	7,8	8,1	5,8	5,1	5,7	6,4	5,8
Mujeres	7,2	6,9	7,0	6,8	7,3	7,5	5,3	5,0	4,8	6,0	5,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.101.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)*	13,7	14,1	13,1	13,5	13,0	13,4	12,9	13,2	13,0	13,1	13,2	13,0	13,1	13,2	13,4	13,5	13,5	13,5	13,7	13,8	14,0	
Edad media de inicio de consumo diario (años)*	–	–	14,5	14,6	14,6	14,5	14,4	14,3	14,4	14,3	14,5	14,4	14,3	14,2	14,3	14,4	14,3	14,6	14,5	14,6	14,5	
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	56,0	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	54,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3
Prevalencia (%) últimos 30 días	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2
Prevalencia (%) de consumo diario	17,8	25,4	19,0	28,1	17,9	27,5	19,3	27,0	17,7	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1	8,7	9,1
Cigarrillos diarios consumidos diariamente (nº)																						
1-5	37,7	47,3	41,8	50,3	43,8	49,5	44,4	49,0	44,7	46,5	41,6	44,5	61,9	63,0	56,1	58,3	65,0	68,5	54,7	57,0	60,6	66,1
6-10	33,8	36,8	33,9	34,8	35,2	34,9	34,8	35,2	33,5	36,0	35,7	35,5	22,7	27,2	28,0	30,1	23,3	23,9	32,4	32,9	30,7	26,5
>10	28,5	15,9	24,3	14,8	20,9	15,6	20,8	15,8	21,8	17,5	22,7	20,0	15,3	9,8	15,9	11,6	11,7	7,6	12,9	10,1	8,7	7,4
Media de cigarrillos al día	9,1	7,2	8,3	6,9	7,9	7,0	7,6	6,8	7,8	7,3	8,1	7,5	5,8	5,3	5,1	5,0	5,7	4,8	6,4	6,0	5,8	5,4

H = Hombres; M = Mujeres.

* En fumadores actuales y exfumadores (años).

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.102.

Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2014.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Últimos 12 meses	137,2	60,5	76,5	29,6	11,8	17,7	35,2	14,5	20,6	34,8	16,1	18,6	28,6	13,9	14,7	9,1	4,2	4,8
Últimos 30 días	45,7	21,1	24,6	9,6	4,2	5,4	12,5	5,8	6,7	11,1	5,2	6,0	9,2	4,7	4,5	3,3	1,3	2,0


T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.103.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.



	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Total	12,6	15,7	19,4	18,7	19,5
Hombres	13,3	16,9	22,3	21,2	20,5
Mujeres	12,0	14,6	16,6	16,2	18,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.104.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no (%). España, 2014.

	Consumo de tabaco alguna vez en la vida		Consumo de tabaco en los últimos 12 meses		Consumo de tabaco en los últimos 30 días		Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	35,1	5,7	38,3	7,2	40,9	8,6	55,9	12,8
Nunca ha consumido	64,9	94,3	61,7	92,8	59,1	91,4	44,1	87,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.105.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no (%). España, 2014.

	Consumo de cannabis alguna vez en la vida		Consumo de cannabis en los últimos 12 meses		Consumo de cannabis en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	37,0	8,7	38,2	9,7	42,0	11,2
Nunca ha consumido	63,0	91,3	61,8	90,3	58,0	88,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.106.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco y de cannabis (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2014.

Problemas de salud o de otro tipo que puede significar...	Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	
	Sí	No
Fumar un paquete de tabaco diario		
Muchos/bastantes problemas	84,7	90,7
Pocos/ningún problema	15,3	9,3
Fumar hachís/marihuana (cannabis) alguna vez		
Muchos/bastantes problemas	42,3	57,6
Pocos/ningún problema	57,7	42,4
Fumar hachís/marihuana (cannabis) habitualmente		
Muchos/bastantes problemas	78,2	91,0
Pocos/ningún problema	21,8	9,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.107.


Disponibilidad percibida del tabaco y del cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2014.

	Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	
	Sí	No
Disponibilidad percibida del tabaco		
Fácilmente disponible (fácil + muy fácil)	95,6	89,7
Difícilmente disponible (difícil + imposible)	4,4	10,3
Disponibilidad percibida del cannabis		
Fácilmente disponible (fácil + muy fácil)	82,5	62,3
Difícilmente disponible (difícil + imposible)	17,5	37,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.108.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta (%) y de la edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	6,9	7,9	8,0	8,7	8,4	10,2	12,6	17,3	18,0	18,5	16,1
Últimos 12 meses	-	-	-	-	-	-	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8
Últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2
Edad media inicio consumo	-	-	-	-	-	-	13,8	14,0	13,8	14,3	13,9

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.109.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.



	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	5,3	7,4	8,3	9,6	6,7
Mujeres	9,1	12,1	14,5	17,2	19,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.110.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según sexo y edad (%). España, 2014.

Total				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
T	H	M		T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Hipnosedantes con o sin receta																		
Alguna vez	16,1	11,9	20,1	11,4	8,7	13,8	14,6	11,1	17,8	16,8	12,5	20,9	19,3	14,2	24,5	20,7	13,6	29,4
Último año	10,8	7,7	13,8	7,3	5,3	9,1	9,8	7,4	12,1	11,5	8,3	14,5	13,4	9,6	17,2	12,4	6,7	19,2
Último mes	6,2	4,2	8,1	4,6	3,1	6,0	5,7	4,1	7,2	6,3	4,4	8,1	7,5	5,3	9,7	7,5	3,3	12,6
Hipnosedantes sin receta																		
Alguna vez	7,8	5,8	9,6	5,3	3,8	6,6	7,0	5,2	8,6	8,2	6,5	9,9	9,3	7,1	11,5	10,5	6,9	14,8
Último año	5,3	3,8	6,8	3,3	2,3	4,2	4,8	3,6	6,0	6,0	4,3	7,5	6,5	4,9	8,2	6,4	3,5	9,9
Último mes	3,0	2,0	3,9	2,1	1,4	2,7	2,7	1,8	3,5	3,2	2,3	4,1	3,6	2,7	4,5	3,6	1,5	6,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.111.

Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años)	13,6	14,4	13,9	14,8	14,4	15,0	14,3	14,7	14,4	14,8	14,7	14,9	13,8	14,4	13,9	14,5	13,7	14,4	14,3	14,8	13,8	14,5
Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida	5,8	8,1	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	9,3	13,6	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	11,9	20,1
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9
Frecuencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días																						
Nunca	98,1	96,7	98,5	97,1	98,5	97,0	98,3	96,6	98,3	96,9	98,2	97,0	98,0	97,1	97,6	96,6	97,7	96,3	97,4	95,7	98,0	96,1
1 a 2 días	1,3	2,1	1,1	1,9	1,0	2,1	1,0	2,2	1,1	2,0	1,0	2,0	1,2	2,0	1,4	2,2	1,2	2,2	1,5	2,3	1,1	2,3
3 a 5 días	0,3	0,7	0,2	0,7	0,3	0,5	0,4	0,7	0,3	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,6	0,8	0,4	1,4	0,5	1,0
6 a 9 días	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
10 a 19 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2


Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.112.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta (%) y de la edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8
Últimos 12 meses	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3
Últimos 30 días	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0
Edad media inicio consumo	14,1	14,5	14,8	14,5	14,6	14,8	14,4	14,3	14,2	14,6	14,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.113.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	2,3	3,6	4,3	4,9	3,5
Mujeres	4,2	6,0	7,5	8,2	9,9

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.114.

Continuidad en el consumo de hipnosedantes sin receta en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida (A)	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8
Últimos 12 meses (B)	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3
Últimos 30 días (C)	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0
B/A*100	72,1	73,8	73,4	72,5	69,2	67,1	63,2	60,6	53,8	65,0	68,6
C/B*100	59,1	48,9	48,9	50,0	53,3	51,1	50,0	50,9	53,6	59,3	56,1
C/A*100	42,6	36,1	35,9	36,2	36,9	34,3	31,6	30,9	28,8	38,6	38,5

B/A*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado los hipnosedantes alguna vez en la vida y los habían consumido también en los últimos 12 meses

C/B*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado los hipnosedantes en los últimos 12 meses y los habían consumido también en los últimos 30 días


C/A*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado los hipnosedantes alguna vez en la vida, y los habían consumido también en los últimos 30 días

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.115.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1
Últimos 12 meses	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4
Últimos 30 días	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6
Edad media inicio consumo	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.116.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	11,5	21,0	31,5	40,3	40,0
Mujeres	10,5	18,3	27,6	31,3	33,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.117.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




		14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	Hombre	13,2	23,3	34,8	45,3	47,9
	Mujer	11,4	20,1	31,5	38,0	42,5
Últimos 12 meses	Hombre	11,5	21,0	31,5	40,3	40,0
	Mujer	10,5	18,3	27,6	31,3	33,4
Últimos 30 días	Hombre	8,3	16,2	24,4	30,7	31,5
	Mujer	7,2	12,7	19,0	21,5	22,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.118.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	8,3	16,2	24,4	30,7	31,5
Mujeres	7,2	12,7	19,0	21,5	22,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.119.


Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días y de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.120.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.121.

Características del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)	15,1	15,2	15,1	15,2	14,9	15,1	14,8	15,0	14,6	14,8	14,6	14,8	14,5	14,6	14,6	14,7	14,6	14,8	14,8	15,0	14,8	14,9
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	46,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8
Prevalencia (%) últimos 12 meses	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	26,8	23,3	29,7	23,3	28,0	23,0
Prevalencia (%) últimos 30 días	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	25,8	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	18,6	14,6	18,9	13,3	21,4	15,8
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																						
Nunca	84,9	90,2	81,6	86,8	79,7	85,5	75,5	83,1	74,2	80,4	71,7	78,0	77,7	82,0	74,7	82,5	80,3	84,7	81,1	86,7	83,1	87,9
1 a 2 días	6,9	5,1	7,3	7,2	8,4	7,4	8,6	8,8	8,6	9,1	9,4	9,8	7,4	7,4	7,9	7,1	6,9	6,8	7,1	6,2	6,5	6,0
3 a 5 días	3,0	2,1	4,1	2,7	3,8	3,0	4,7	3,5	4,8	3,8	4,4	4,5	5,3	4,8	5,0	4,6	3,9	3,7	3,9	3,0	3,9	2,8
6 a 9 días	2,1	1,4	2,9	1,3	3,2	1,9	3,1	1,9	3,9	2,8	3,5	2,6	2,5	1,8	2,6	1,8	2,2	1,4	2,1	1,3	2,0	1,1
10 a 19 días	1,5	0,6	2,0	1,0	2,1	1,3	3,5	1,3	3,0	1,8	3,5	2,3	2,9	1,8	3,6	2,0	2,5	1,6	2,0	1,3	1,9	1,2
20 a 29 días	1,5	0,6	2,2	0,9	2,8	1,0	4,7	1,4	5,5	2,1	7,4	2,8	4,2	2,2	4,5	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.122.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, sexo y edad (%). España, 2014.

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	85,6	4,0	2,2	1,6	1,7	1,5	1,6	1,8
Sexo								
Hombres	83,1	4,0	2,4	1,8	2,2	2,0	1,9	2,6
Mujeres	87,9	3,9	2,1	1,4	1,3	1,1	1,2	1,0
Edad								
14 años	94,8	1,8	0,9	0,5	0,5	0,6	0,3	0,5
15 años	89,2	3,0	1,7	1,3	1,4	1,2	0,9	1,2
16 años	82,3	5,0	2,8	2,1	2,0	1,7	2,1	1,9
17 años	79,5	5,5	3,4	2,2	2,3	2,0	2,3	2,6
18 años	77,4	5,2	2,7	2,2	3,2	2,4	3,0	3,9

* Casos con información en el número de días.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.123.

Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses y 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según sexo y edad (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2014.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Últimos 12 meses	146,3	72,4	73,8	21,3	10,2	11,0	35,3	17,5	17,9	41,4	19,6	21,8	38,0	19,8	18,1	10,3	5,2	5,1
Últimos 30 días	25,5	12,6	12,9	4,3	2,1	2,3	5,8	3,2	2,7	7,8	3,8	4,0	5,4	2,8	2,6	2,1	0,7	1,3

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.124.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo y según edad (%). España, 2014.

TOTAL		SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tipo de consumo de cannabis								
Principalmente marihuana (hierba)	65,6	62,9	69,2	73,1	69,1	63,0	65,2	62,2
Principalmente hachís (resina, chocolate)	9,0	9,1	8,8	7,9	6,5	9,2	10,5	8,7
De los 2 tipos	25,4	28,0	22,0	18,9	24,3	27,8	24,2	29,0
Mezcla del cannabis con tabaco								
Sí	86,5	85,5	87,8	77,2	83,2	85,6	89,0	92,6
No	13,5	14,5	12,2	22,8	16,8	14,4	11,0	7,4
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis								
	3,2	3,6	2,7	3,5	3,0	3,2	3,1	3,6

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.125.


Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y 30 días (%). España, 2014.

	Nunca ha consumido cannabis	Ha consumido cannabis alguna vez en la vida	Ha consumido cannabis en los últimos 12 meses	Ha consumido cannabis en los últimos 30 días
Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días				
Sí	1,4	27,6	28,8	33,0
No	98,6	72,4	71,2	67,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.126.

Continuidad en el consumo de cannabis en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida (A)	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33	33,6	29,1
Últimos 12 meses (B)	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4
Últimos 30 días (C)	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6
B/A*100	87,1	88,6	87,1	86,7	87,5	85,7	82,3	86,6	80,0	79,1	87,4
C/A*100	59,3	59,5	58,3	62,7	60,0	58,8	55,5	57,1	52,1	48,0	63,9
C/B*100	68,1	67,1	66,9	72,2	68,6	68,6	67,4	65,9	65,2	60,7	73,1

B/A*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado cannabis alguna vez en la vida y la había consumido también en los últimos 12 meses.


C/B*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado cannabis en los últimos 12 meses y la había consumido también en los últimos 30 días.

C/A*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado cannabis alguna vez en la vida, y la había consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.127.

Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2014.



	Puntuación CAST 0-1	Puntuación CAST 2-3	Puntuación CAST ≥4 (consumo problemático)
2006	66,0	20,7	13,3
2008	66,2	19,0	14,7
2010	66,3	19,6	14,1
2012	63,7	19,5	16,9
2014	69,5	16,7	13,8

Puntuación CAST 0-1: % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación 0-1 / los que han contestado el cuestionario CAST).

Puntuación CAST 2-3: % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación 2-3 / los que han contestado el cuestionario CAST).

Puntuación CAST ≥4 (consumo problemático): % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación ≥4 / los que han contestado el cuestionario CAST).

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.128.

Porcentaje y estimación de consumidores problemáticos de cannabis (puntuación escala CAST ≥4). España, 2006-2014.


	2006	2008	2010	2012	2014
Población de 14-18 años (en miles)	73,5	81,1	100,3	83,2	53,7
Porcentaje entre el total de alumnos de 14-18 años	3,3	3,7	4,6	3,8	2,5
Porcentaje entre los consumidores de cannabis de 14-18 años en los últimos 12 meses	13,3	14,7	14,1	16,9	13,8

CAST = Cannabis Abuse Screening Test

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.129.

Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST (puntuación CAST ≥ 4 consumo problemático) entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y entre todos los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014.




	2006	2008	2010	2012	2014
% entre los estudiantes 14-18 años que han consumido cannabis en el último año	13,3	14,7	14,1	16,9	13,8
% entre todos los estudiantes 14-18 años	3,3	3,7	4,6	3,8	2,5

CAST = Cannabis Abuse Screening Test

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.130.

Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST, sexo y edad (%). España, 2014.



	Total	Hombre	Mujer	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Puntuación CAST 0-1	69,5	65,5	74,2	76,4	70,6	68,0	71,3	61,6
Puntuación CAST 2-3	16,7	19,2	13,8	15,7	16,3	17,8	15,1	20,1
Puntuación CAST ≥ 4 (consumo problemático)	13,8	15,3	12	7,9	13,1	14,3	13,6	18,2

CAST = Cannabis Abuse Screening Test

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.131.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses según su clasificación en la escala CAST (%). España, 2014.

	Puntuación CAST ≥ 4 (consumo problemático)	Puntuación CAST 2-3	Puntuación CAST 0-1
Tipo de consumo de cannabis			
Principalmente marihuana (hierba)	47,7	57,7	74,4
Principalmente hachís (resina, chocolate)	9,5	8,6	7,9
De los 2 tipos	42,8	33,6	17,7
Mezcla del cannabis con tabaco			
Sí	93,4	90,8	86,0
No	6,6	9,2	14,0
Media de porros consumidos al día	5,2	3,8	2,2

CAST = Cannabis Abuse Screening Test

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.132.

Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses y de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días entre el total de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y entre los que han consumido cannabis en el último año clasificados según la escala CAST (%). España, 2014.

	Entre el total de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años	Entre los que han consumido cannabis en el último año		
		Puntuación CAST ≥ 4 (consumo problemático)	Puntuación CAST 2-3	Puntuación CAST 0-1
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	42,6	89,8	88,4	81,8
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	22,2	68,2	62,6	47,8
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	32,2	77,3	71,1	59,8

CAST = Cannabis Abuse Screening Test

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.133.

Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su clasificación en la escala CAST (%). España, 2014.


	Puntuación CAST 0-1	Puntuación CAST 2-3	Puntuación CAST ≥ 4 (consumo problemático)	No han consumido cannabis en últimos 12 meses	Total alumnos
Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días					
Sí	20,0	46,8	62,3	2,3	8,9
No	80,0	53,2	37,7	97,7	91,1

CAST = Cannabis Abuse Screening Test

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.134.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) (%) y edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5
Últimos 12 meses	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8
Últimos 30 días	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8
Edad media de inicio del consumo	15,6	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,4	15,3	14,9	15,5	15,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.135.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1
Mujeres	1,4	2,1	2,8	2,4	2,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.136.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y edad (%). España, 2014.




		14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	Hombre	2,7	3,4	3,9	5,6	6,6
	Mujer	2,0	2,5	3,6	3,2	3,9
Últimos 12 meses	Hombre	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1
	Mujer	1,4	2,1	2,8	2,4	2,4
Últimos 30 días	Hombre	1,8	1,9	2,3	2,8	3,4
	Mujer	1,0	1,4	1,8	1,5	0,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.137.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	2,3	2,9	3,7	4,4	5,4
Últimos 12 meses	1,9	2,4	3,0	3,3	3,9
Últimos 30 días	1,4	1,6	2,0	2,1	2,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.138.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.139.

Características del consumo de cocaína (polvo y/o base) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)	15,7	15,5	15,9	15,9	15,9	15,7	16,0	15,6	15,8	15,6	15,9	15,7	15,4	15,4	15,3	15,2	14,7	15,0	15,5	15,5	14,9	15,1
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9
Prevalencia (%), últimos 12 meses	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																						
Nunca	98,6	99,3	97,9	98,8	96,8	98,2	96,6	98,5	96,3	97,2	94,9	97,4	96,9	98,4	97,2	98,3	98,2	99,3	97,8	99,2	98,4	99,3
1 a 2 días	0,9	0,4	1,5	0,8	1,8	1,0	2,5	1,1	2,3	2,1	3,1	1,7	1,6	1,0	1,3	0,6	0,8	0,4	1,0	0,4	0,6	0,4
3 a 5 días	0,2	0,2	0,3	0,2	0,6	0,5	0,5	0,2	0,9	0,5	1,0	0,5	0,7	0,3	0,7	0,3	0,3	0,0	0,4	0,1	0,3	0,1
6 a 9 días	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,6	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0
10 a 19 días	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1	0,4	0,1

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.140.

Continuidad en el consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida (A)	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5
Últimos 12 meses (B)	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8
Últimos 30 días (C)	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8
B/A*100	72,0	79,0	83,0	74,0	81,0	80,0	72,0	71,0	67,0	68,5	80,5
C/B*100	61,0	59,0	56,0	52,0	52,0	53,0	56,0	56,0	58,0	60,0	68,5
C/A*100	44,0	47,0	46,0	38,0	42,0	42,0	40,0	39,0	38,0	41,1	54,8

B/A*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado cocaína alguna vez en la vida y la había consumido también en los últimos 12 meses.


C/B*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado cocaína en los últimos 12 meses y la había consumido también en los últimos 30 días.

C/A*100 = El % de los estudiantes de 14-18 años que había probado cocaína alguna vez en la vida y la había consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.141.


Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.142.


Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.143.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,4	0,7	1,3	1,4	2,9
Mujeres	0,4	0,4	0,5	0,8	1,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.144.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,6	0,8	1,2	1,5	2,9
Últimos 12 meses	0,4	0,6	0,9	1,1	2,2
Últimos 30 días	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.145.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.



	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombre	1,6	1,2	0,6
Mujer	0,8	0,6	0,3
Total	1,2	0,9	0,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.146.

Características del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)	15,7	15,5	15,6	15,7	15,5	15,5	15,9	15,4	15,4	15,3	15,7	15,4	15,4	15,5	15,2	15,2	15,2	15,4	15,9	15,6	15,3	15,0
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	1,6	0,8
Prevalencia (%), últimos 12 meses	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,2	1,7	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4	1,2	0,6
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6	0,6	0,3
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																						
Nunca	97,1	98,6	97,2	98,1	98,1	98,7	96,2	98,3	97,9	98,4	98,1	99,0	97,8	99,3	98,4	99,4	98,6	99,4	98,2	99,4	-	-
1 a 2 días	1,6	1,0	1,3	1,2	1,0	0,6	2,2	1,3	1,6	1,1	1,0	0,7	1,4	0,4	0,8	0,4	0,8	0,3	1,1	0,3	-	-
3 a 5 días	0,6	0,2	0,7	0,4	0,3	0,3	1,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-
6 a 9 días	0,4	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-
10 a 19 días	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.147.


Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.148.


Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.149.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,6	1,2	1,5	1,5	2,0
Mujeres	0,3	0,5	0,4	0,7	1,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.150.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,7	1,1	1,5	1,7	2,5
Últimos 12 meses	0,5	0,8	1,0	1,1	1,7
Últimos 30 días	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.151.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.



	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombre	1,8	1,3	0,7
Mujer	0,9	0,6	0,2
Total	1,4	0,9	0,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.152.

Características del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)	15,5	15,4	15,7	15,7	15,7	15,5	15,7	15,3	15,6	15,5	15,8	15,6	15,6	15,5	15,4	15,4	15,5	15,6	15,6	15,2	15,1	15,4
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,6	2,8	3,4	1,8	3,2	1,5	1,8	0,9
Prevalencia (%), últimos 12 meses	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,0	1,9	2,2	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,5	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,7	0,7	1,3	0,5	1,4	0,6	0,7	0,2
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																						
Nunca	44,8	49,8	51,8	52,0	51,1	53,1	55,1	59,1	57,9	66,8	97,3	99,0	98,0	99,0	97,4	99,2	98,6	99,5	98,6	99,4	-	-
1 a 2 días	32,7	33,6	31,5	29,0	29,5	29,9	31,6	27,4	30,1	23,6	1,3	0,6	1,0	0,6	0,8	0,4	0,6	0,3	0,7	0,4	-	-
3 a 5 días	10,6	8,9	8,8	12,5	8,4	8,9	7,0	9,7	5,9	6,1	0,6	0,2	0,4	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-
6 a 9 días	7,0	3,7	5,5	4,5	5,3	3,9	0,9	1,9	3,7	2,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-
10 a 19 días	3,1	2,3	0,7	0,7	2,8	1,8	4,3	0,5	1,3	1,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-
20 a 29 días	1,8	1,6	1,8	1,3	2,9	2,4	1,1	1,3	1,0	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.153.

Prevalencia alguna vez en la vida del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Hombres	5,3	6,6	5,5	5,7	6,2	6,0	4,2	4,6	3,4	3,2	1,8
Mujeres	3,1	4,1	3,2	3,3	4,9	3,6	2,7	2,8	1,8	1,5	0,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.154.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Alguna vez en la vida	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8
Últimos 12 meses	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2
Últimos 30 días	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6
Edad media de inicio del consumo	15,4	15,6	15,4	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.155.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	1,1	1,5	1,6	2,0	2,0
Mujeres	0,7	0,5	0,6	0,9	1,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.156.

Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	1,4	1,4	1,7	2,2	3,0
Últimos 12 meses	0,9	1,0	1,1	1,4	1,8
Últimos 30 días	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.157.

Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.



	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombre	2,3	1,6	0,9
Mujer	1,2	0,7	0,4
Total	1,8	1,2	0,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.158.

Características del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)	15,4	15,4	15,6	15,6	15,5	15,4	15,6	15,3	15,6	15,4	15,8	15,7	15,5	15,5	15,4	15,2	15,3	15,4	15,5	15,2	14,1	13,8
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	2,3	1,2
Prevalencia (%) últimos 12 meses	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1	1,6	0,7
Prevalencia (%) últimos 30 días	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4	0,9	0,4
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																						
Nunca	96,4	98,3	96,2	98,1	97,4	98,5	97,4	98,7	98,2	99,3	97,7	99,3	97,9	99,2	97,4	98,9	98,5	99,4	98,4	99,6	-	-
1 a 2 días	2,4	1,2	2,3	1,4	1,7	1,1	1,7	1,1	1,3	0,6	1,5	0,5	1,2	0,5	1,0	0,4	0,8	0,4	0,9	0,2	-	-
3 a 5 días	0,7	0,3	0,9	0,2	0,5	0,2	0,6	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0	0,3	0,1	-	-
6 a 9 días	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-
10 a 19 días	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.159.

Prevalencia alguna vez en la vida del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.160.


Evolución de la prevalencia de consumo de heroína (%) y de la edad media de inicio del consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.161.

Prevalencia de consumo de heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,5	0,8	0,6	0,9	0,5
Mujeres	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.162.

Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5
Últimos 12 meses	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3
Últimos 30 días	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.163.

Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.



	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombre	0,9	0,7	0,5
Mujer	0,4	0,2	0,2
Total	0,6	0,5	0,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.164.

Características del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.667	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)	14,4	14,1	14,6	15,1	14,0	15,1	15,5	15,1	14,9	14,8	14,2	15,0	14,5	14,7	14,3	14,2	14,2	14,7	14,7	13,8	14,1	13,8
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	0,9	0,4
Prevalencia (%) últimos 12 meses	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2
Prevalencia (%) últimos 30 días	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,9	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3	0,5	0,2
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																						
Nunca	99,6	99,9	99,6	99,9	99,4	99,8	99,5	99,9	99,7	99,8	99,3	99,9	99,0	99,8	98,4	99,5	99,3	99,7	99,2	99,7	-	-
1 a 2 días	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,5	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-
3 a 5 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	-	-
6 a 9 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-	-
10 a 19 días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-	-
20 a 29 días	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.165.


Evolución de la percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la percepción de disponibilidad de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.166.


Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles (%) y de la edad media de inicio en el consumo (años) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.167.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,8	0,8	1,0	0,9	0,8
Mujeres	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.168.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9
Últimos 12 meses	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6
Últimos 30 días	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.169.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.



	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombre	1,3	0,9	0,6
Mujer	0,6	0,4	0,3
Total	0,9	0,7	0,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.170.

Características del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.667	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Edad media de inicio de consumo (años)	13,8	12,4	13,9	13,3	13,7	13,0	14,0	13,7	14,3	14,2	13,9	14,1	13,8	13,4	13,6	14,2	13,1	13,2	13,8	12,6	13,9	14,0
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,2	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	1,3	0,6
Prevalencia (%) últimos 12 meses	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,7	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8	0,9	0,4
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6	0,6	0,3
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																						
Nunca	98,5	99,2	98,5	99,0	97,8	98,5	98,2	98,9	98,5	99,2	98,4	99,3	98,2	99,4	97,7	99,1	98,8	99,5	99,0	99,4	-	-
1 a 2 días	0,8	0,5	0,9	0,8	1,1	1,0	1,3	0,7	1,0	0,5	0,8	0,4	0,8	0,3	0,8	0,3	0,6	0,2	0,4	0,4	-	-
3 a 5 días	0,2	0,1	0,3	0,1	0,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	-	-
6 a 9 días	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-
10 a 19 días	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.171.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2014.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	2010	2012	2014	2010	2012	2014	2010	2012	2014
Alguna nueva sustancia	3,5	3,9	2,3	2,5	2,7	1,6	1,3	1,4	0,8
Alguna nueva sustancia*	–	–	4,0	–	–	2,8	–	–	1,6

2010: ketamina, spice, piperazina, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals y/o legal highs.

2012: ketamina, spice, piperazina, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals, legal highs, salvia y/o esteroides anabolizantes.

2014: ketamina, spice, mefedrona, metanfetamina, setas mágicas, salvia y/o esteroides anabolizantes.

* Pregunta directa y general, sin especificar sustancias.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.172.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ketamina	0,7	0,5	0,3
Spice	0,8	0,6	0,3
Mefedrona	0,5	0,3	0,3
Metanfetamina	0,8	0,5	0,3
Setas mágicas	1,3	0,8	0,4
Salvia	0,7	0,4	0,3
Esteroides anabolizantes	0,6	0,4	0,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.173.

Evolución de la prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2014.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	2010	2012	2014	2010	2012	2014	2010	2012	2014
Ketamina	1,1	1,1	0,7	0,8	0,7	0,5	0,4	0,4	0,3
Spice	1,1	1,4	0,8	0,8	1,0	0,6	0,5	0,6	0,3
Piperazinas	0,4	0,4	–	0,3	0,3	–	0,2	0,2	–
Mefedrona	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
Nexus	0,5	0,5	–	0,3	0,4	–	0,2	0,3	–
Metanfetamina	0,8	0,9	0,8	0,6	0,7	0,5	0,4	0,4	0,3
Setas mágicas	2,1	2,2	1,3	1,6	1,4	0,8	0,7	0,6	0,4
Research chemicals	0,4	0,4	–	0,3	0,3	–	0,2	0,2	–
Legal highs	0,7	0,4	–	0,6	0,3	–	0,5	0,2	–
Salvia	–	0,8	0,7	–	0,5	0,4	–	0,3	0,3
Esteroides anabolizantes	–	0,7	0,6	–	0,5	0,4	–	0,3	0,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.174.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de estas sustancias porque no han oído nunca hablar de ellas. España, 2014.


Nunca he oído hablar de esta droga	
Ketamina	56,4
Spice	56,0
Mefedrona	60,2
Metanfetamina	37,0
Setas mágicas	40,5
Salvia	60,6
Esteroides anabolizantes	40,0

Se excluyen de la base los NS/NC.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.175.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años alguna vez en la vida, según sexo (%). España, 2014.




	Setas mágicas	Spice	Ketamina	Metanfetaminas	Salvia	E. anabolizantes	Mefedrona
Hombres	1,8	1,1	0,9	1,1	1,0	1,0	0,7
Mujeres	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.176.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.



	Setas mágicas	Spice	Ketamina	Metanfetaminas	Salvia	E. anabolizantes	Mefedrona
14 años	0,8	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4
15 años	1,0	0,8	0,6	0,7	0,5	0,4	0,4
16 años	1,4	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,5
17 años	1,6	1,1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6
18 años	2,6	1,2	1,0	1,1	1,1	0,8	0,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.177.

Formas de conseguir nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que las han consumido en los últimos 12 meses (%). España, 2014.

Formas de obtener nuevas sustancias	
Me la ofreció un amigo	55,0
A través de un vendedor (camello)	45,0
Me la ofrecieron en una fiesta, en un pub, en un bar	23,1
Otros sitios	15,9
Las compré en una tienda especializada (smart shop o head shop)	8,0
A través de internet	6,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.178.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de las siguientes nuevas sustancias alguna vez*, según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2014.

	Todos	Sí consumen esa sustancia	NO consumen esa sustancia
Consumir ketamina alguna vez	32,7	13,0	33,0
Consumir spice alguna vez	32,7	15,1	33,0
Consumir mefedrona alguna vez	38,6	20,3	38,7
Consumir metanfetamina alguna vez	32,8	18,7	32,9
Consumir setas mágicas alguna vez	27,3	13,1	27,6
Consumir salvia alguna vez	40,7	17,0	41,0
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	32,5	21,8	32,5

*Alguna vez: Una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los NS/NC o los que nunca han oído hablar de la sustancia.

Considerados como consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.179.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez* de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y según edad (%). España, 2014.

TOTAL		POR SEXO Y EDAD						
		H	M	14	15	16	17	18
Consumir ketamina alguna vez	82,2	78,6	86,0	75,2	80,3	83,2	85,3	86,5
Consumir spice alguna vez	82,7	78,8	86,8	75,7	80,8	84,1	85,3	86,8
Consumir mefedrona alguna vez	83,0	78,8	87,5	76,7	81,4	83,8	85,9	87,0
Consumir metanfetamina alguna vez	87,4	84,5	90,4	83,1	86,8	87,3	89,7	89,4
Consumir setas mágicas alguna vez	77,6	73,6	81,9	76,7	78,7	77,6	77,3	77,9
Consumir salvia alguna vez	78,8	74,6	83,5	73,5	77,9	80,0	80,8	80,8
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	81,1	77,5	85,6	77,2	80,4	81,7	82,5	83,8

*Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los NS/NC o los que nunca han oído hablar de la sustancia.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.180.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez* de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2014.

	Sí consumen esa sustancia	NO consumen esa sustancia
Consumir ketamina alguna vez	39,3	82,8
Consumir spice alguna vez	38,9	83,6
Consumir mefedrona alguna vez	44,4	83,5
Consumir metanfetamina alguna vez	47,4	87,9
Consumir setas mágicas alguna vez	35,4	78,7
Consumir salvia alguna vez	33,8	79,7
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	37,9	81,6

*Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los NS/NC o los que nunca han oído hablar de la sustancia.

Considerados como consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.181.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez* de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) entre los que han contestado la pregunta (%). España, 2012-2014.

	2012	2014
Consumir ketamina alguna vez	68,2	82,2
Consumir spice alguna vez	72,4	82,7
Consumir mefedrona alguna vez	74,8	83,0
Consumir metanfetamina alguna vez	75,4	87,4
Consumir setas mágicas alguna vez	65,3	77,6
Consumir salvia alguna vez	71,2	78,8
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	65,3	81,1

* Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los NS/NC o los que nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.182.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (%). España, 2010-2014.


	Todos			Sí consumen esa sustancia			NO consumen esa sustancia		
	2010	2012	2014	2010	2012	2014	2010	2012	2014
Ketamina	40,2	41,8	38,8	83,6	74,4	76,8	39,4	41,0	38,2
Spice	39,8	42,5	41,4	79,1	73,4	78,9	39,0	41,4	40,6
Piperazinas	31,5	34,2	–	75,6	66,2	–	31,2	33,8	–
Mefedrona	30,9	34,2	35,4	78,2	66,2	69,7	30,5	33,8	35,0
Nexus	30,5	34,6	–	73,4	66,2	–	30,1	34,1	–
Metanfetamina	39,8	43,6	42,9	80,5	74,7	78,7	39,2	43,0	42,2
Setas mágicas	50,3	52,0	49,0	84,7	84,2	84,3	48,9	50,4	48,0
Research chemicals	30,6	34,2	–	67,0	75,6	–	30,3	33,8	–
Legal highs	32,8	35,1	–	79,3	73,9	–	32,2	34,7	–
Salvia	–	37,3	37,7	–	75,4	78,4	–	36,4	36,9
Esteroides anabolizantes	–	53,9	51,6	–	72,7	81,4	–	53,7	51,3

Se excluyen de la base los NS/NC o los que nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.183.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014.




	Sí consumidor de nuevas sustancias	No consumidor de nuevas sustancias
Alcohol	93,9	76,3
Borracheras últimos 12 meses	77,7	41,7
Botellón	83,7	56,9
Tabaco	73,0	30,1
Hipnosedantes con o sin receta	31,7	10,2
Cannabis	79,4	23,9
Cocaína polvo y/o base	35,2	1,9
Éxtasis	26,0	0,3
Anfetaminas	32,9	0,2
Alucinógenos	48,8	0,1
Heroína	14,4	0,1
Inhalables volátiles	14,4	0,3
GHB	19,2	0,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.184.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014.




	Sí consumidor de nuevas sustancias	No consumidor de nuevas sustancias
Alcohol	91,0	67,5
Binge drinking	70,3	31,1
Borracheras últimos 30 días	58,7	21,3
Tabaco	69,1	24,6
Hipnosedantes con o sin receta	21,7	5,8
Cannabis	73,5	17,1
Cocaína polvo y/o base	25,7	1,2
Éxtasis	15,4	0,1
Anfetaminas	16,7	0,1
Alucinógenos	26,6	0,1
Heroína	11,0	0,1
Inhalables volátiles	10,2	0,2
GHB	12,0	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.185.

Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014.




	Sí consumidor de nuevas sustancias	No consumidor de nuevas sustancias
Sustancias legales (alcohol y/o tabaco)	94,2	77,1
Sustancias ilegales	88,6	24,7
Ninguna sustancia legal e ilegal	2,3	21,0

* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.
FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.186.

Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales)* en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014.




	Sí consumidor de nuevas sustancias	No consumidor de nuevas sustancias
Sustancias legales (alcohol y/o tabaco)	92,3	69,2
Sustancias ilegales	82,0	17,8
Ninguna sustancia legal e ilegal	4,0	28,6

* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.
FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.187.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis (puntuación CAST $\geq$ 4) o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2014.




	Sí consumidor de nuevas sustancias	No consumidor de nuevas sustancias
CAST $\geq$ 4 (consumo problemático de cannabis)	44,3	11,1
CAST <4	55,7	88,9

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.
FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.188.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la hora de regreso a casa en la última salida (%). España, 2014.




Antes de las 12	Entre las 12 y la 1	Entre la 1 y las 2	Entre las 2 y las 3	Entre las 3 y las 4	Entre las 4 y las 8	Después de las 8
0,5	0,6	1,0	0,8	1,8	2,8	7,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.189.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



Nunca	Menos de 1 noche al mes	1-3 noches al mes	1 noche a la semana	2 noches a la semana	3-4 noches a la semana	Más de 4 noches a la semana
0,5	0,7	1,3	1,5	2,2	3,8	6,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.190.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.


	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	18,1	21,0	28,7
Una sola sustancia	34,9	39,1	40,3
Dos sustancias	18,8	17,8	16,2
Tres sustancias	19,3	16,6	12,3
Cuatro sustancias	6,2	3,8	1,8
Cinco o más sustancias	2,7	1,7	0,8

* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.191.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.




* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.192.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.193.

Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2014.

	2012	2014
Ninguna sustancia	16,8	21,0
Una sola sustancia	38,9	39,1
Dos sustancias	20,1	17,8
Tres sustancias	17,5	16,6
Cuatro sustancias	3,9	3,8
Cinco o más sustancias	2,8	1,7

* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.194.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2014.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Ninguna sustancia	39,3	25,9	16,0	9,7	7,9
Una sola sustancia	38,3	41,5	39,3	38,2	36,0
Dos sustancias	12,4	15,7	19,0	21,7	22,6
Tres sustancias	7,5	12,5	19,6	22,9	25,0
Cuatro sustancias	1,6	2,9	4,3	5,3	5,5
Cinco o más sustancias	0,9	1,5	1,8	2,2	3,0

* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.195.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2014.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M
Ninguna sustancia	19,5	16,8	22,6	19,4	30,3	27,2
Una sola sustancia	35,4	34,4	39,2	39,1	39,6	41,0
Dos sustancias	16,9	20,6	15,7	19,8	14,4	17,9
Tres sustancias	20,2	18,5	17,3	16,0	13,2	11,3
Cuatro sustancias	4,9	7,4	3,1	4,4	1,5	2,1
Cinco o más sustancias	3,2	2,2	2,2	1,3	1,0	0,5

* Drogas legales e ilegales: Tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.196.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	70,2	74,1	81,2
Una sola sustancia	25,5	22,9	17,2
Dos sustancias	2,1	1,5	0,9
Tres sustancias	1,0	0,7	0,3
Cuatro sustancias	0,3	0,2	0,1
Cinco o más sustancias	0,8	0,6	0,3

* Drogas ilegales: Cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.197.

Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2014.

	2012	2014
Ninguna sustancia	73,2	74,1
Una sola sustancia	22,7	22,9
Dos sustancias	1,6	1,5
Tres sustancias	0,8	0,7
Cuatro sustancias	0,6	0,2
Cinco o más sustancias	1,1	0,6

* Drogas ilegales: Cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.198.

Prevalencia de consumo de una, dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2014.

	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro sustancias	Cinco o más sustancias
Alcohol	48,4	22,8	21,7	4,9	2,3
Tabaco	1,7	30,6	50,9	11,7	5,1
Cannabis	1,1	18,1	59,3	14,7	6,8
Hipnosedantes (sin receta)	8,4	31,6	19,1	27,3	13,6
Hipnosedantes (con o sin receta)	10,4	34,0	19,8	26,8	9,1
Cocaína polvo y/o base	2,7	10,1	10,2	24,1	52,8
Éxtasis	0,4	0,5	0,8	12,2	86,1
Anfetaminas/speed	0,0	1,2	2,4	7,5	89,0
Alucinógenos	2,3	4,1	6,8	12,3	74,4
Heroína	0,0	1,9	1,9	4,0	92,2
Inhalables volátiles	5,0	11,0	6,6	7,7	69,7
GHB	0,5	1,4	4,2	8,3	85,6

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.199.

Proporción de consumidores de otras drogas (12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes con o sin receta, cocaína (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila)*. España, 2014.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Hipnosedantes**	Hipnosedantes***	Cocaína****	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Éxtasis	Heroína	Inhalables volátiles	GHB
Alcohol	100,0	39,9	32,4	6,3	12,4	3,4	1,2	1,4	1,1	0,5	0,8	0,9
Tabaco	97,4	100,0	63,2	9,0	17,2	6,1	2,4	2,8	2,3	1,0	1,3	1,7
Cannabis	97,6	77,9	100,0	10,0	17,7	8,8	3,4	3,9	3,2	1,5	1,9	2,4
Hipnosedantes (sin receta)	90,9	53,2	47,5	100,0	100,0	13,2	5,8	7,0	6,1	4,2	4,3	5,2
Hipnosedantes (con o sin receta)	88,7	50,0	41,8	50,3	100,0	8,5	3,7	4,4	3,7	2,4	2,6	3,2
Cocaína polvo y/o base	92,9	69,4	81,5	25,8	33,5	100,0	20,7	22,3	23,7	12,8	12,5	18,4
Anfetaminas/speed	96,1	80,8	92,9	33,7	42,9	60,5	100,0	72,7	53,9	35,5	35,9	42,5
Alucinógenos	94,1	75,5	84,6	32,7	41,0	52,3	59,2	100,0	42,1	38,0	29,7	38,3
Éxtasis	96,8	84,2	93,1	38,4	47,2	74,9	56,7	55,5	100,0	35,1	34,3	47,2
Heroína	92,5	70,7	85,2	51,1	59,2	79,8	73,6	95,2	68,3	100,0	64,5	72,1
Inhalables volátiles	91,5	64,6	74,6	36,2	43,8	53,1	52,3	53,0	45,6	45,6	100,0	46,7
GHB	97,4	78,6	89,2	42,6	52,1	74,6	59,5	66,0	60,5	47,6	44,5	100,0


* Porcentaje de consumidores de la sustancia (fila) que también consumen la sustancia (columna).

** Hipnosedantes (sin receta). *** Hipnosedantes (con o sin receta). **** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.200.


Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.201.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.202.

Prevalencia de consumo conjunto* de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2008-2014.

	2008	2010	2012	2014
Total	24,9	22,9	19,6	17,3
Sexo				
Hombres	28,0	24,8	22,7	19,5
Mujeres	21,8	21,0	16,5	15,2
Edad				
14 años	11,4	9,1	6,8	6,3
15 años	21,0	17,3	12,9	12,5
16 años	27,3	26,2	19,6	20,7
17 años	33,2	33,4	25,8	25,5
18 años	38,1	35,9	29,7	25,8

* Consumo de alcohol y cannabis sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.203.

Prevalencia de consumo conjunto* de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2008-2014.

	2008	2010	2012	2014
Total	4,1	3,0	1,6	1,2
Sexo				
Hombres	5,1	3,7	2,2	1,5
Mujeres	3,1	2,3	1,0	0,8
Edad				
14 años	2,6	1,8	0,5	0,7
15 años	3,4	2,0	0,8	1,0
16 años	4,0	2,7	1,4	1,1
17 años	4,9	4,4	1,9	1,4
18 años	8,1	6,1	3,5	2,1

*Consumo de alcohol y cocaína sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.204.

Prevalencia de consumo conjunto de tabaco y cannabis en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2012-2014.

	2012	2014
Total	20,9	19,7
Sexo		
Hombres	22,2	20,7
Mujeres	19,5	18,7
Edad		
14 años	8,1	8,5
15 años	15,4	14,9
16 años	20,6	23,1
17 años	26,5	27,4
18 años	30,7	29,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.205.

Prevalencia de consumo conjunto de tabaco diario y cannabis en los últimos 12 meses, según sexo y según edad (%). España, 2012-2014.

	2012	2014
Total	6,8	5,9
Sexo		
Hombres	7,1	6,3
Mujeres	6,4	5,4
Edad		
14 años	1,5	1,5
15 años	4,0	3,7
16 años	6,2	7,2
17 años	9,1	8,6
18 años	12,0	11,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.206.


Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2014.

	CAST ≥4 (consumo problemático)	CAST <4
Una sola sustancia	0,0	0,5
Dos sustancias	4,3	18,2
Tres sustancias	51,8	63,1
Cuatro sustancias	20,4	14,3
Cinco o más sustancias	23,5	3,8

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.
CAST= Cannabis Abuse Screening Test.
FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.207.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, al menos una vez por semana, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Heroína	98,9	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5
Cocaína en polvo	98,5	97,6	97,4	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	96,6	96,9
Éxtasis	97,2	97,1	97,0	95,5	96,7	97,2	97,0	96,1	95,9	96,5	96,9
Tranquilizantes	90,6	88,6	88,5	87,4	88,7	89,7	87,5	86,6	85,5	89,5	88,6
Cannabis	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8
Tabaco (un paquete diario)	76,9	75,2	78,0	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7
Tomar 5 ó 6 cañas/copas en fin de semana	43,8	45,2	44,8	44,9	44,8	41,2	51,3	47,2	47,0	47,5	55,3
Tomar 1 ó 2 cañas/copas diariamente	50,2	48,5	45,9	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7	57,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.208.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, al menos una vez por semana, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2014.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Heroína	98,9	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5
Cocaína en polvo	98,5	97,6	97,4	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	96,6	96,9
Éxtasis	97,2	97,1	97,0	95,5	96,7	97,2	97,0	96,1	95,9	96,5	96,9
Hipnosedantes	90,6	88,6	88,5	87,4	88,7	89,7	87,5	86,6	85,5	89,5	88,6
Cannabis	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8
Tabaco (un paquete diario)	76,9	75,2	78,0	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7
Tomar 5 ó 6 cañas/copas en fin de semana	43,8	45,2	44,8	44,9	44,8	41,2	51,3	47,2	47,0	47,5	55,3
Tomar 1 ó 2 cañas/copas diariamente	50,2	48,5	45,9	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7	57,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.209.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual* de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y según edad (%). España, 2014.

TOTAL		POR SEXO Y EDAD						
		H	M	14	15	16	17	18
Fumar un paquete de tabaco diario	89,7	88,1	91,1	88,8	89,1	90,0	90,8	89,0
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	55,3	52,6	57,7	66,1	58,9	53,4	47,6	47,1
Tomarse una o dos cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	57,8	53,3	62,0	60,4	57,1	59,0	55,5	56,8
Fumar cannabis habitualmente	88,8	85,4	91,9	92,4	90,1	88,1	86,7	84,7
Tomar hipnosedantes habitualmente	88,6	88,3	89,0	87,7	88,1	89,8	88,3	89,9
Consumir éxtasis habitualmente	96,9	95,9	97,8	95,5	96,5	97,5	97,9	96,5
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,9	96,0	97,7	95,5	96,6	97,4	97,8	96,6
Consumir heroína habitualmente	97,5	96,4	98,4	96,2	97,1	98,0	98,2	98,0

* Habitual: una vez por semana o más frecuentemente.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.210.

Evolución del riesgo percibido del consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2014.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081
Fumar un paquete de tabaco diario	74,7	79,1	72,8	77,4	75,7	79,9	75,1	79,5	76,7	80,8	78,2	82,3	84,9	89,3	86,5	91,0	88,9	91,7	89,6	93,1	88,1	91,1
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	39,8	47,7	40,6	49,4	40,3	48,7	41,5	48,3	41,1	48,1	36,8	45,7	48,7	53,6	45,1	49,2	44,2	49,5	44,7	50,3	52,6	57,7
Tomarse una o dos cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	46,3	54,6	43,7	52,9	41,7	49,4	39,4	48,4	38,7	47,9	36,8	45,7	52,3	61,9	52,7	62,9	56,7	62,6	55,1	64,1	53,3	62,0
Fumar cannabis habitualmente	89,8	93,9	84,9	90,2	82,4	88,8	79,4	86,1	77,5	85,4	81,1	86,2	85,7	91,7	84,5	91,8	85,5	91,6	84,3	91,7	85,4	91,9
Tomar hipnosedantes habitualmente	89,9	91,3	87,8	89,4	87,5	89,2	86,9	87,9	88,3	89,1	89,8	89,6	86,1	88,6	84,6	88,4	83,8	87,0	88,7	90,3	88,3	89,0
Consumir éxtasis habitualmente	96,6	97,9	96,2	97,9	96,3	97,5	95,0	95,9	96,4	97,1	97,1	97,3	95,8	98,0	94,1	97,8	94,6	97,1	95,2	97,8	95,9	97,8
Consumir cocaína en polvo habitualmente	98,1	99,0	96,9	98,3	96,7	98,0	96,3	97,5	96,9	97,8	97,5	98,1	95,6	97,9	94,0	97,8	95,0	97,3	95,4	97,9	96,0	97,7
Consumir heroína habitualmente	98,4	99,3	97,4	98,8	97,5	98,7	97,6	98,8	98,4	98,8	98,5	99,1	95,8	98,1	94,3	98,0	95,0	97,5	95,7	98,0	96,4	98,4

H = Hombres; M = Mujeres.

Habitualmente: Una vez por semana o más frecuentemente.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.211.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan hecho binge drinking o se hayan emborrachado en los últimos 30 días y según puntuación en la escala CAST (%). España, 2014.

	Total estudiantes E. Secundarias de 14-18 años	Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	Se ha emborrachado en los últimos 30 días	CAST ≥4 (consumo problemático de cannabis)
Fumar un paquete de tabaco diario	89,7	86,9	87,0	78,2
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas el fin de semana	55,3	36,5	35,7	37,3
Tomar 1 ó 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	57,8	50,2	51,3	47,3
Fumar hachís/marihuana (cannabis) alguna vez	54,9	44,3	37,6	16,4
Fumar hachís/marihuana (cannabis) habitualmente	88,8	81,8	79,6	49,5
Consumir hipnosedantes habitualmente	88,6	88,3	88,0	78,9
Consumir éxtasis alguna vez	87,1	87,4	86,5	79,6
Consumir éxtasis habitualmente	96,9	96,3	96,5	91,4
Consumir cocaína en polvo alguna vez	86,1	86,6	85,5	76,9
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,9	96,2	96,6	91,2
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	87,3	87,3	86,6	78,8
Consumir anfetaminas o speed habitualmente	96,8	96,3	96,5	91,1
Consumir alucinógenos* alguna vez	86,5	85,4	83,9	72,5
Consumir alucinógenos* habitualmente	96,5	95,7	96,1	88,8
Consumir heroína alguna vez	88,7	89,3	89,5	83,7
Consumir heroína habitualmente	97,5	97,0	97,3	91,9

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

Alguna vez: Una vez al mes o menos frecuentemente. Habitualmente: Una vez por semana o más frecuentemente.

* Alucinógenos: LSD, tripis o setas mágicas.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.212.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo diario de tabaco y ante el consumo de 5/6 cañas/copas en fin de semana (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado bebidas alcohólicas en los últimos 30 días (%). España, 2014.

	Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días		Consumo de alcohol en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No
Fumar un paquete de tabaco diario	82,1	90,4	88,8	91,5
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas el fin de semana	35,9	57,3	48,4	70,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.213.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan consumido alguna vez* cada sustancia o no (%). España, 2014.


	Ha consumido la sustancia alguna vez en la vida	
	Sí	No
Fumar hachís/marihuana (cannabis) alguna vez	29,0	66,6
Fumar base (cocaína base, crack) alguna vez	68,8	86,1
Consumir cocaína en polvo alguna vez	60,1	86,8
Consumir éxtasis alguna vez	57,1	87,5
Consumir alucinógenos (LSD, tripis o setas mágicas) alguna vez	52,1	87,2
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	59,5	87,7

* Alguna vez: Una vez al mes o menos frecuentemente.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.214.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2014.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Tabaco	—	—	—	—	—	—	91,7	90,9	93,6	92,8	90,8
Alcohol	93,8	89,0	90,5	91,2	92,0	93,8	91,2	90,8	93,3	92,9	91,4
Hipnosedantes	55,9	65,9	65,9	67,2	67,6	67,3	58,9	55,6	64,0	53,3	49,1
Cannabis	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4	66,3
Cocaína en polvo	26,7	30,4	37,9	38,0	43,5	46,7	37,4	32,7	37,2	33,8	28,9
Heroína	48,0	25,6	29,1	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4
Anfetaminas	43,9	40,1	39,7	40,2	45,4	41,7	32,1	28,1	32,5	28,7	24,2
Éxtasis	46,3	42,6	39,8	43,8	50,0	45,1	31,2	26,6	29,9	26,2	21,8
Alucinógenos	26,2	40,1	39,2	41,4	45,3	41,9	33,7	28,6	35,8	30,9	26,2
Inhalables volátiles	61,4	54,8	54,2	51,6	54,1	51,1	—	—	—	—	—

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.215.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2014.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
Tabaco	–	–	–	–	–	–	91,7	90,9	93,6	92,8	90,8
Alcohol	93,8	89,0	90,5	91,2	92,0	93,8	91,2	90,8	93,3	92,9	91,4
Hipnosedantes	55,9	65,9	65,9	67,2	67,6	67,3	58,9	55,6	64,0	53,3	49,1
Cannabis	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4	66,3
Cocaína polvo	26,7	30,4	37,9	38,0	43,5	46,7	37,4	32,7	37,2	33,8	28,9
Heroína	48,0	25,6	29,1	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4
Anfetaminas	43,9	40,1	39,7	40,2	45,4	41,7	32,1	28,1	32,5	28,7	24,2
Éxtasis	46,3	42,6	39,8	43,8	50,0	45,1	31,2	26,6	29,9	26,2	21,8
Alucinógenos	26,2	40,1	39,2	41,4	45,3	41,9	33,7	28,6	35,8	30,9	26,2
Inhalables volátiles	61,4	54,8	54,2	51,6	54,1	51,1	–	–	–	–	–

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.216.

Percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas es relativamente fácil/muy fácil) y porcentaje de respuesta NS/NC entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2014.

	TOTAL	TOTAL	SEXO		EDAD				
	% fácil/muy fácil	% NS/NC	% fácil/muy fácil		% fácil/muy fácil				
			H	M	14	15	16	17	18
Tabaco	78,3	13,7	76,12	80,46	63,3	74,3	81,9	87,9	89,2
Bebidas alcohólicas	79,3	13,3	77,63	80,84	64,3	75,4	82,7	89,0	89,8
Hipnosedantes	27,7	43,5	27,02	28,45	18,1	22,6	29,0	36,0	39,5
Cannabis	46,0	30,6	48,93	43,12	26,3	38,3	51,5	60,5	60,0
Cocaína en polvo	15,8	45,2	17,39	14,30	8,2	11,8	17,4	22,0	24,6
Heroína	11,2	47,8	12,42	9,96	7,6	9,3	11,9	14,0	15,6
Anfetaminas	12,5	48,1	14,58	10,52	6,6	9,4	13,5	17,1	20,4
Éxtasis	11,3	48,2	12,80	9,80	6,0	8,4	12,3	15,5	17,8
Alucinógenos	13,7	47,6	15,95	11,59	7,4	10,0	15,2	18,6	22,2
GHB	9,6	49,0	10,93	8,23	5,3	7,0	10,6	13,0	14,8

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.217.

Formas de conseguir distintas drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que las han consumido alguna vez en la vida (%). España, 2014.

	Anfetaminas	Éxtasis	Ketamina	Spice	Setas mágicas
A través de un familiar/amigo/conocido	17,8	15,1	17,7	20,1	29,7
A través de un vendedor (camello)	18,6	29,2	23,6	29,0	32,5
A través de internet	5,0	5,2	12,3	6,6	7,3
A través de una tienda especializada (smart shop, herbolario...)	3,2	5,0	4,7	12,7	7,4
En una zona de ocio (festival, concierto...)	11,0	12,7	11,7	10,8	16,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.218.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal* y según edad (%). España, 2014.


	Han consumido alguna sustancia ilegal en los últimos 12 meses	No han consumido ninguna sustancia ilegal en los últimos 12 meses
Perfectamente informado		
14 años	33,8	27,6
15 años	33,8	27,7
16 años	36,0	27,7
17 años	34,3	27,4
18 años	38,0	28,6
Mal informado		
14 años	5,5	8,6
15 años	4,0	6,6
16 años	3,2	7,1
17 años	2,1	5,9
18 años	2,4	5,5

* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.219.

Vías por las que han recibido información y vías por las que les gustaría recibir información sobre drogas a los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



	Vías por las que han recibido información	Vías por las que les gustaría recibir información
Profesores	68,4	45,0
Padre/madre/otros familiares	64,6	35,7
Medios de comunicación	50,4	27,6
Amigos/as	45,9	15,3
Internet	36,0	25,6
Profesionales sanitarios	27,7	56,7
Organismos oficiales	21,0	33,8
Otras	10,4	10,4
Ninguna	3,6	–

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.220.


Evolución sobre las principales vías de información sobre drogas por las que reciben información los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014.

	2006	2008	2010	2012	2014
Internet	–	35,1	38,9	41,7	36,0
Amigos	48,3	49,1	44,8	43,5	45,9
Profesores	63,8	64,7	61,4	55,2	68,4
Profesionales sanitarios	–	41,6	40,6	39,0	27,7
Organismos oficiales	29,7	30,2	30,7	28,8	21,0
Medios de comunicación	69,3	62,4	61,0	55,1	50,4
Padre/madre/otros familiares	–	–	–	–	64,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.221.

Evolución de la valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%)*. España, 2012-2014.



	2012	2014
Educación en las escuelas	95,7	96,8
Tratamiento voluntario a consumidores	94,2	96,0
Control policial y aduanero	91,2	93,1
Tratamiento obligatorio a consumidores	90,3	93,0
Campañas publicitarias	90,9	92,5
Administración médica de metadona	88,0	91,2
Leyes estrictas contra las drogas	86,2	88,4
Administración médica de heroína	79,3	84,1
Legalización del cannabis	58,3	59,9
Legalización de todas las drogas	39,6	40,6

* Algo importante o muy importante.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.222.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad (%). España, 2012-2014.

	2012	2014
Legalización del cannabis		
14 años	35,8	40,2
15 años	36,3	39,2
16 años	36,9	41,4
17 años	38,4	39,7
18 años	41,1	42,7
Legalización de todas las drogas		
14 años	32,7	36,8
15 años	28,9	31,5
16 años	26,0	28,8
17 años	24,4	24,1
18 años	25,7	27,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.223.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2014.


	Nada importante	Algo importante	Muy importante	NS/NC
No han consumido cannabis en los últimos 12 meses	31,3	11,9	22,6	34,3
Han consumido cannabis en los últimos 12 meses (CAST <4)	16,7	19,6	45,4	18,3
Han consumido cannabis en los últimos 12 meses (CAST ≥4 Consumo problemático)	12,8	15,1	58,2	14,0

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.224.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (%). España, 2006-2014.




	2006	2008	2010	2012	2014
Alcohol	54,9	58,8	58,5	58,0	48,8
Tabaco	33,2	35,5	34,6	30,6	24,8
Cannabis	14,7	14,4	12,2	11,9	9,4
Cocaína en polvo	1,6	1,6	1,6	1,8	0,9
Hipnosedantes	0,7	1,0	1,5	1,7	1,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.225.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014.




	Todos/mayoría de mis amigos consumen cannabis	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen cannabis
Sí consumen cannabis	68,7	13,4
No consumen cannabis	31,3	86,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.226.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014.




	Todos/mayoría de mis amigos consumen alcohol	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen alcohol
Sí consumen alcohol	87,4	49,9
No consumen alcohol	12,6	50,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.227.

Prevalencia de consumo de cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014.




	Todos/mayoría de mis amigos consumen cocaína	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen cocaína
Sí consumen cocaína	39,2	1,4
No consumen cocaína	60,8	98,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.228.


Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.229.

Prevalencia de borracheras entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales se emborrachan (últimos 30 días) (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.230.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, borracheras, hacer botellón, tabaco, hipnosedantes, cannabis y cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2014.

	Consumo de alcohol		Se ha emborrachado		Ha hecho botellón		Consumo de tabaco		Consumo de hipnosedantes		Consumo de cannabis		Consumo de cocaína*	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Amigos consumen														
Tomar bebidas alcohólicas														
Algunos/pocos/ninguno	49,9	50,1	6,9	93,1	9,7	90,3	13,9	86,1	4,5	95,5	9,0	91,0	1,1	98,9
Todos/la mayoría	87,4	12,6	38,6	61,4	41,9	58,1	38,3	61,7	7,8	92,2	28,6	71,4	2,5	97,5
Emborracharse														
Algunos/pocos/ninguno	62,2	37,8	12,7	87,3	18,2	81,8	19,6	80,4	5,2	94,8	12,9	87,1	1,1	98,9
Todos/la mayoría	88,6	11,4	55,6	44,4	50,1	49,9	47,1	52,9	9,6	90,4	38,0	62,0	4,2	95,8
Hacer botellón														
Algunos/pocos/ninguno	57,8	42,2	12,1	87,9	10,5	89,5	17,6	82,4	5,1	94,9	11,8	88,2	1,1	98,9
Todos/la mayoría	87,9	12,1	41,9	58,1	53,5	46,5	41,4	58,6	8,1	91,9	31,4	68,6	3,1	96,9
Fumar tabaco														
Algunos/pocos/ninguno	61,1	38,9	14,7	85,3	17,9	82,1	14,7	85,3	4,9	95,1	10,4	89,6	1,0	99,0
Todos/la mayoría	90,0	10,0	45,9	54,1	48,5	51,5	59,8	40,2	9,9	90,1	43,6	56,4	4,1	95,9
Tomar hipnosedantes														
Algunos/pocos/ninguno	68,0	32,0	22,0	78,0	25,3	74,7	25,5	74,5	5,9	94,1	18,2	81,8	1,5	98,5
Todos/la mayoría	88,2	11,8	46,8	53,2	54,5	45,5	58,7	41,3	31,9	68,1	56,9	43,1	29,7	70,3
Consumir cannabis														
Algunos/pocos/ninguno	66,0	34,0	19,3	80,7	22,8	77,2	21,6	78,4	5,5	94,5	13,4	86,6	1,2	98,8
Todos/la mayoría	90,3	9,7	52,4	47,6	51,9	48,1	67,3	32,7	11,9	88,1	68,7	31,3	8,0	92,0
Consumir cocaína														
Algunos/pocos/ninguno	68,0	32,0	22,0	78,0	25,3	74,7	25,5	74,5	5,9	94,1	18,1	81,9	1,4	98,6
Todos/la mayoría	90,1	9,9	52,7	47,3	57,6	42,4	58,0	42,0	27,8	72,2	62,2	37,8	39,2	60,8

* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.231.

Características de las relaciones familiares entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de los consumos en los últimos 30 días. España, 2014.

	Total alumnado	Consumo de alcohol		Se ha emborrachado		Ha hecho botellón		Consumo de tabaco		Consumo de hipnosedantes	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Relación con padre											
Bastante/muy buenas	82,2	80,7	85,6	78,4	83,5	80,0	83,0	74,7	84,8	71,0	83,0
Regulares	13,0	13,9	11,0	15,3	12,2	14,2	12,5	17,7	11,4	18,4	12,6
Bastante/muy malas	4,8	5,4	3,4	6,3	4,3	5,8	4,5	7,6	3,8	10,5	4,4
Relación con madre											
Bastante/muy buenas	88,4	87,0	91,5	85,0	89,6	86,0	89,2	82,2	90,5	80,4	89,0
Regulares	9,4	10,5	7,0	11,8	8,6	11,0	8,8	13,9	7,9	14,4	9,0
Bastante/muy malas	2,2	2,5	1,5	3,2	1,9	3,0	1,9	3,9	1,6	5,2	1,9
En los últimos 12 meses he tenido un conflicto o discusión importante con padres o hermanos											
Sí	31,1	35,6	21,7	42,6	27,8	40,3	28,3	45,8	26,1	50,5	29,7
No	68,9	64,4	78,3	57,4	72,2	59,7	71,7	54,2	73,9	49,5	70,3
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre y/o mi padre											
A menudo/casi siempre	87,0	85,7	89,7	83,8	88,0	85,8	87,4	82,9	88,4	78,4	87,5
Casi nunca/raramente/algunas veces	13,0	14,3	10,3	16,2	12,0	14,2	12,6	17,1	11,6	21,6	12,5
Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa											
A menudo/casi siempre	69,9	69,9	69,8	68,8	70,2	69,7	70,1	69,9	69,9	69,0	70,0
Casi nunca/raramente/algunas veces	30,1	30,1	30,2	31,2	29,8	30,3	29,9	30,1	30,1	31,0	30,0
Mis padres fijan normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa											
A menudo/casi siempre	48,8	45,7	55,4	40,3	51,2	41,9	51,2	41,0	51,4	46,5	48,9
Casi nunca/raramente/algunas veces	51,2	54,3	44,6	59,7	48,8	58,1	48,8	59,0	48,6	53,5	51,1
Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches											
A menudo/casi siempre	80,1	77,6	85,7	73,0	82,5	73,4	82,5	71,5	83,1	74,1	80,6
Casi nunca/raramente/algunas veces	19,9	22,4	14,3	27,0	17,5	26,6	17,5	28,5	16,9	25,9	19,4
Mis padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches											
A menudo/casi siempre	76,3	73,2	83,0	68,8	78,7	67,8	79,3	67,2	79,4	69,1	76,8
Casi nunca/raramente/algunas veces	23,7	26,8	17,0	31,2	21,3	32,2	20,7	32,8	20,6	30,9	23,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.232.

Características de las relaciones familiares entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de los consumos en los últimos 30 días. España, 2014.

	Total alumnado	Consumo de cannabis		Clasificación CAST consumidores cannabis últimos 12 meses			Consumo de cocaína*	
		Sí	No	CAST 0-1	CAST 2-3	CAST ≥4	Sí	No
Relación con padre								
Bastante/muy buenas	82,2	74,1	84,1	77,8	71,7	63,4	71,6	82,4
Regulares	13,0	17,5	12,0	15,9	18,8	22,8	15,2	12,9
Bastante/muy malas	4,8	8,3	4,0	6,2	9,6	13,8	13,2	4,6
Relación con madre								
Bastante/muy buenas	88,4	81,6	90,0	85,0	78,5	72,0	76,4	88,6
Regulares	9,4	14,1	8,3	12,2	16,2	20,5	15,6	9,3
Bastante/muy malas	2,2	4,3	1,7	2,8	5,3	7,5	8,0	2,1
En los últimos 12 meses he tenido un conflicto o discusión importante con padres o hermanos								
Sí	31,1	47,3	27,4	45,4	48,8	66,8	47,8	30,8
No	68,9	52,7	72,6	54,6	51,2	33,2	52,2	69,2
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre y/o mi padre								
A menudo/casi siempre	87,0	80,8	88,3	85,3	78,7	71,0	69,4	87,3
Casi nunca/raramente/algunas veces	13,0	19,2	11,7	14,7	21,3	29,0	30,6	12,7
Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en casa								
A menudo/casi siempre	69,9	68,6	70,2	70,5	65,0	65,6	62,6	70,0
Casi nunca/raramente/algunas veces	30,1	31,4	29,8	29,5	35,0	34,4	37,4	30,0
Mis padres fijan normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa								
A menudo/casi siempre	48,8	39,2	51,0	41,7	33,3	36,1	40,8	49,0
Casi nunca /raramente/algunas veces	51,2	60,8	49,0	58,3	66,7	63,9	59,2	51,0
Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las noches								
A menudo/casi siempre	80,1	69,2	82,7	75,1	65,1	55,6	58,5	80,6
Casi nunca/raramente/algunas veces	19,9	30,8	17,3	24,9	34,9	44,4	41,5	19,4
Mis padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches								
A menudo/casi siempre	76,3	65,0	78,9	71,4	62,1	49,8	55,3	76,7
Casi nunca/raramente/algunas veces	23,7	35,0	21,1	28,6	37,9	50,2	44,7	23,3

* Cocaína polvo y/o base.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Puntuación CAST ≥4 = consumo problemático.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.233.


Percepción de tolerancia parental para consumir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido alcohol, se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking en los últimos 30 días o botellón en los últimos 12 meses (%). España, 2014.

	Consumo alcohol últimos 30 días		Borracheras últimos 30 días		Binge drinking últimos 30 días		Botellón últimos 12 meses	
	Ha consumido alcohol en los últimos 30 días	No ha consumido alcohol en los últimos 30 días	Se ha emborrachado en los últimos 30 días	No se ha emborrachado en los últimos 30 días	Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año
Te permitirían tomar bebidas alcohólicas... Madre								
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	44,0	82,6	29,2	64,7	32,3	68,1	42,7	75,4
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	27,0	8,2	34,3	17,0	33,1	15,0	26,4	13,4
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	29,0	9,1	36,6	18,4	34,5	16,9	30,8	11,2
Te permitirían tomar bebidas alcohólicas... Padre								
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	43,7	81,9	29,4	64,0	32,1	67,5	42,5	74,8
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	27,4	8,4	34,8	17,2	33,8	15,3	26,8	13,7
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	28,9	9,6	35,8	18,8	34,1	17,3	30,7	11,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.234.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.235.

Percepción de tolerancia parental para consumir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis (%). España, 2014.

	Consumo cannabis últimos 12 meses		Consumo cannabis últimos 30 días		Clasificación CAST consumidores cannabis últimos 12 meses		
	Sí	No	Sí	No	CAST 0-1	CAST 2-3	CAST ≥4
Si quisiera tomar bebidas alcohólicas, su madre se lo permitiría							
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	34,1	64,2	33,1	61,7	34,4	25,7	24,6
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	31,9	17,1	33,3	18,1	30,1	38,6	43,6
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	33,9	18,7	33,6	20,1	35,5	35,7	31,8
Si quisiera tomar bebidas alcohólicas, su padre se lo permitiría							
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	33,5	63,7	32,6	61,2	33,8	26,1	24,0
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	32,8	17,3	34,3	18,4	31,4	38,8	43,8
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	33,6	19,0	33,1	20,4	34,7	35,1	32,2

CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Puntuación CAST ≥4 = consumo problemático.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.236.

Percepción del consumo de alcohol del padre y de la madre que tienen los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2014.

	Madre	Padre
No ha bebido ningún día	42,1	25,2
Ha bebido algún día aislado	35,8	35,6
Ha bebido solo los fines de semana	15,3	21,8
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	6,4	16,2
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	0,3	1,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.237.

Percepción de tolerancia parental para consumir tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido tabaco en los últimos 30 días o hayan consumido tabaco a diario en los últimos 30 días (%). España, 2014.

	Ha consumido tabaco últimos 30 días		Ha consumido tabaco diariamente últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No
Te permitirían fumar tabaco... Madre				
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	64,3	93,2	34,7	90,9
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	14,5	2,9	30,8	3,4
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	21,2	3,9	34,5	5,7
Te permitirían fumar tabaco... Padre				
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	69,1	93,3	43,1	91,5
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	11,8	2,8	25,0	3,2
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	19,1	3,9	31,9	5,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.238.

Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de tolerancia parental para consumir tabaco (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.239.


Percepción de tolerancia parental para consumir tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis (%). España, 2014.

	Consumo cannabis últimos 12 meses		Consumo cannabis últimos 30 días		Clasificación CAST consumidores cannabis últimos 12 meses		
	Sí	No	Sí	No	CAST 0-1	CAST 2-3	CAST ≥4
Si quisiera fumar tabaco, su madre se lo permitiría							
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	66,9	92,2	63,0	91,0	73,5	53,2	37,4
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	13,4	3,3	15,6	3,6	9,1	18,9	32,6
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	19,7	4,5	21,4	5,4	17,4	27,8	29,9
Si quisiera fumar tabaco, su padre se lo permitiría							
No me lo permitiría (o no me lo permite), en absoluto	70,5	92,8	67,2	91,7	76,0	58,9	40,9
Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	11,1	3,1	12,5	3,4	8,0	14,3	27,0
Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa	18,4	4,1	20,3	4,9	16,0	26,9	32,1

* CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Puntuación CAST ≥4 = consumo problemático.
FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.240.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de tolerancia parental para consumir tabaco (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.241.

Frecuencia de actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y según edad (%). España, 2014.

	TOTAL	POR SEXO Y EDAD						
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Juego con el ordenador (videojuegos, la wii...)								
Nunca	20,8	9,9	31,3	14,2	17,7	22,3	25,6	27,8
2 o 3 veces al año	15,4	6,3	24,3	14,0	15,5	16,2	16,4	13,5
1 o 2 veces al mes	18,4	15,2	21,4	19,8	18,6	18,1	17,8	16,5
Por lo menos una vez por semana	26,9	38,3	15,8	31,9	28,7	25,8	23,1	23,7
Casi todos los días	18,5	30,2	7,2	20,2	19,5	17,6	17,0	18,4
Practico algún deporte, atletismo, hago ejercicio								
Nunca	8,6	4,9	12,2	6,5	8,4	8,2	10,1	10,6
2 o 3 veces al año	4,1	2,0	6,2	2,8	3,0	3,7	6,0	6,8
1 o 2 veces al mes	10,0	6,2	13,8	5,9	8,4	10,0	13,6	14,9
Por lo menos una vez por semana	32,3	27,2	37,4	33,7	33,2	33,3	30,5	29,1
Casi todos los días	44,9	59,8	30,4	51,2	47,0	44,8	39,8	38,6
Leo libros como entretenimiento (sin tener en cuenta los libros del colegio)								
Nunca	28,3	35,4	21,4	24,1	27,3	29,5	29,6	34,0
2 o 3 veces al año	23,4	25,1	21,7	20,9	21,1	24,4	26,1	26,0
1 o 2 veces al mes	20,4	19,3	21,4	22,5	20,7	19,9	19,3	18,5
Por lo menos una vez por semana	14,7	12,9	16,4	16,3	15,7	13,9	14,1	12,1
Casi todos los días	13,3	7,3	19,0	16,3	15,2	12,4	10,9	9,4
Salgo por las noches (a una discoteca, bar, fiesta, café...)								
Nunca	16,7	17,0	16,5	31,1	20,5	12,5	8,0	7,7
2 o 3 veces al año	15,7	15,3	16,1	21,2	18,6	14,6	11,1	10,4
1 o 2 veces al mes	34,5	32,6	36,3	26,4	33,0	36,2	40,5	36,1
Por lo menos una vez por semana	31,4	33,3	29,6	20,1	26,0	35,0	39,0	43,3
Casi todos los días	1,7	1,8	1,5	1,2	1,9	1,7	1,5	2,4
Otros hobbies (toco un instrumento, canto, pinto, escribo...)								
Nunca	37,3	42,3	32,4	36,8	37,5	36,6	37,2	40,0
2 o 3 veces al año	8,6	9,0	8,1	7,0	8,2	9,2	9,1	10,0
1 o 2 veces al mes	13,0	12,5	13,4	12,0	12,2	13,5	14,1	12,8
Por lo menos una vez por semana	20,8	19,1	22,5	21,1	21,0	20,8	20,8	19,7
Casi todos los días	20,4	17,2	23,5	23,1	21,1	20,0	18,8	17,6
Salgo con amigos de compras, a dar un paseo, voy a un parque para pasar el rato								
Nunca	3,3	4,8	1,7	4,3	3,4	2,5	2,8	3,7
2 o 3 veces al año	3,5	4,3	2,6	4,1	3,5	3,0	3,5	2,9
1 o 2 veces al mes	18,7	19,3	18,2	19,7	18,1	18,1	18,9	19,8
Por lo menos una vez por semana	57,4	54,3	60,5	56,2	57,0	57,8	59,4	55,3
Casi todos los días	17,1	17,3	16,9	15,7	18,0	18,6	15,5	18,3
Uso internet para divertirme (chatear, oír música, juegos, redes sociales como facebook, ver videos...)								
Nunca	1,5	1,6	1,3	1,7	1,3	1,4	1,4	1,7
2 o 3 veces al año	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8	0,5	0,9
1 o 2 veces al mes	2,8	3,1	2,6	3,8	2,6	2,4	2,9	2,3
Por lo menos una vez por semana	13,1	15,0	11,2	18,2	12,9	11,7	10,8	11,8
Casi todos los días	81,9	79,5	84,2	75,3	82,3	83,8	84,5	83,3
Juego dinero en máquinas tragaperras								
Nunca	92,7	88,2	97,1	95,8	94,5	92,7	90,6	86,1
2 o 3 veces al año	3,1	4,7	1,5	2,3	2,3	3,3	3,5	5,7
1 o 2 veces al mes	1,9	3,3	0,5	0,6	1,1	2,0	3,0	3,9
Por lo menos una vez por semana	1,3	2,4	0,2	0,6	1,0	1,2	1,8	2,7
Casi todos los días	1,0	1,4	0,6	0,8	1,0	0,8	1,1	1,5

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.242.

Frecuencia de actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2014.


	Total alumnos	Consumo alcohol		Borracheras		Consumo tabaco		Consumo cannabis		Consumo cocaína*	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Juego con el ordenador (videojuegos, la wii...)											
Nunca	20,8	22,8	13,9	24,7	17,6	26,8	18,0	24,5	19,4	25,4	20,6
2 o 3 veces al año	15,4	16,3	12,7	17,4	14,2	16,8	14,8	15,4	15,5	15,5	15,5
1 o 2 veces al mes	18,4	18,6	17,6	19,1	18,0	18,3	18,4	18,1	18,5	17,3	18,4
Por lo menos una vez por semana	26,9	25,5	31,8	23,4	29,5	23,4	28,5	25,0	27,6	21,2	27,1
Casi todos los días	18,5	16,8	23,9	15,5	20,7	14,7	20,2	17,0	19,0	20,6	18,4
Practico algún deporte, atletismo, hago ejercicio											
Nunca	8,6	8,1	9,9	7,9	8,9	9,4	8,2	8,2	8,6	12,3	8,4
2 o 3 veces al año	4,1	4,2	3,8	4,4	3,9	4,6	3,9	4,3	4,1	4,2	4,1
1 o 2 veces al mes	10,0	10,3	9,1	11,3	9,2	11,3	9,4	10,8	9,8	8,6	10,1
Por lo menos una vez por semana	32,3	31,9	34,1	31,2	33,4	31,4	32,8	30,3	33,1	24,7	32,6
Casi todos los días	44,9	45,4	43,2	45,2	44,5	43,4	45,7	46,4	44,5	50,1	44,8
Leo libros como entretenimiento (sin tener en cuenta los libros del colegio)											
Nunca	28,3	30,3	21,5	32,6	24,5	34,2	25,6	35,3	25,8	43,0	27,8
2 o 3 veces al año	23,4	24,3	20,6	25,2	22,2	23,4	23,4	24,5	23,0	19,1	23,5
1 o 2 veces al mes	20,4	19,7	22,6	19,0	21,5	18,6	21,2	17,7	21,3	15,7	20,5
Por lo menos una vez por semana	14,7	13,8	17,6	13,1	16,0	13,2	15,4	12,6	15,5	13,3	14,7
Casi todos los días	13,3	11,9	17,7	10,1	15,8	10,6	14,5	10,0	14,4	9,0	13,4
Salgo por las noches (a una discoteca, bar, fiesta, café...)											
Nunca	16,7	8,3	44,5	3,1	27,1	4,7	22,2	3,9	21,1	8,5	17,0
2 o 3 veces al año	15,7	14,2	20,8	9,1	20,8	9,5	18,6	8,5	18,2	8,6	16,0
1 o 2 veces al mes	34,5	38,2	22,1	39,9	30,5	36,2	33,6	36,4	33,9	25,5	34,7
Por lo menos una vez por semana	31,4	37,2	12,2	45,3	20,9	46,1	24,7	47,7	25,8	47,5	30,9
Casi todos los días	1,7	2,0	0,5	2,6	0,8	3,4	0,8	3,5	1,0	10,0	1,4
Otros hobbies (toco un instrumento, canto, pinto, escribo...)											
Nunca	37,3	37,7	35,9	37,9	36,3	38,6	36,7	38,0	37,0	41,8	37,1
2 o 3 veces al año	8,6	9,0	7,1	9,8	7,8	8,7	8,5	9,1	8,4	9,2	8,5
1 o 2 veces al mes	13,0	13,2	12,3	13,6	12,6	12,9	13,0	13,1	13,0	9,1	13,1
Por lo menos una vez por semana	20,8	20,5	22,0	20,2	21,5	19,8	21,3	20,0	21,2	18,1	21,0
Casi todos los días	20,4	19,7	22,7	18,6	21,8	20,0	20,6	19,9	20,5	21,8	20,3
Salgo con amigos de compras, a dar un paseo, voy a un parque para pasar el rato											
Nunca	3,3	2,2	6,8	1,6	4,5	1,8	3,9	1,8	3,8	3,9	3,2
2 o 3 veces al año	3,5	2,7	6,1	2,0	4,5	2,1	4,1	2,0	3,9	3,0	3,5
1 o 2 veces al mes	18,7	16,6	25,9	14,6	21,9	12,8	21,5	12,5	20,9	13,8	18,9
Por lo menos una vez por semana	57,4	59,0	52,5	59,0	56,6	55,7	58,2	55,7	58,1	44,7	57,9
Casi todos los días	17,1	19,6	8,6	22,8	12,5	27,6	12,3	28,0	13,3	34,7	16,6
Uso internet para divertirme (chatear, oír música, juegos, redes sociales como facebook, ver videos...)											
Nunca	1,5	1,2	2,4	1,1	1,7	1,7	1,4	1,3	1,5	2,6	1,4
2 o 3 veces al año	0,8	0,6	1,3	0,5	0,9	0,5	0,9	0,5	0,8	0,8	0,8
1 o 2 veces al mes	2,8	2,4	4,3	2,1	3,3	2,4	3,0	2,3	3,0	3,3	2,8
Por lo menos una vez por semana	13,1	11,0	19,8	9,0	16,2	9,3	14,8	9,2	14,4	11,3	13,1
Casi todos los días	81,9	84,8	72,3	87,3	77,9	86,1	80,0	86,7	80,3	81,9	81,9
Juego dinero en máquinas tragaperras											
Nunca	92,7	91,4	97,3	89,1	95,7	87,8	95,0	86,0	95,1	74,6	93,3
2 o 3 veces al año	3,1	3,6	1,3	4,5	2,0	4,8	2,3	5,4	2,3	5,7	3,0
1 o 2 veces al mes	1,9	2,3	0,4	3,1	0,9	3,4	1,1	4,1	1,1	6,1	1,7
Por lo menos una vez por semana	1,3	1,5	0,6	2,1	0,7	2,2	0,9	2,5	0,9	5,3	1,2
Casi todos los días	1,0	1,1	0,5	1,2	0,7	1,8	0,6	1,9	0,7	8,2	0,8

* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.243.

Evolución de la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.244.

Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según sexo y según edad (%). España, 2014.


	TOTAL	POR SEXO Y EDAD						
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Nunca	8,7	8,4	9,0	16,5	10,2	6,8	4,2	4,6
Menos de una noche al mes	17,7	16,7	18,6	21,1	19,4	17,6	14,5	14,0
De 1 a 3 noches al mes	30,1	29,1	31,0	24,7	29,3	30,0	34,3	32,6
1 noche a la semana	17,0	17,5	16,4	14,6	15,2	18,0	19,0	19,3
2 noches a la semana	18,6	20,0	17,2	14,9	17,5	19,7	20,8	20,5
3-4 noches a la semana	4,7	5,0	4,4	4,6	4,8	4,8	4,2	5,3
Más de 4 noches a la semana	3,3	3,3	3,4	3,5	3,5	3,2	3,0	3,7

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.245.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.




	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína (polvo y/o base)
Nunca	30,0	6,9	4,3	1,1
Menos de una noche al mes	66,7	19,0	13,6	1,4
De 1 a 3 noches al mes	83,6	32,2	26,0	1,9
1 noche a la semana	84,2	34,9	29,3	2,7
2 noches a la semana	89,7	45,5	38,3	3,7
3-4 noches a la semana	90,0	47,9	40,0	6,8
Más de 4 noches a la semana	90,1	52,4	44,8	11,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.246.

Prevalencia de binge drinking, borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón y beber alcohol en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis*, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.




	Binge drinking	Borracheras últimos 30 días	Botellón y beber alcohol últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis*
Menos de una noche al mes	13,5	8,1	30,7	10,4
De 1 a 3 noches al mes	33,5	24,1	55,4	10,7
1 noche a la semana	40,5	27,2	60,1	12,4
2 noches a la semana	50,4	36,0	70,3	15,4
3-4 noches a la semana	52,7	36,9	68,3	21,1
Más de 4 noches a la semana	50,4	36,9	71,0	23,9

* CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático = puntuación CAST ≥ 4 .
FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.247.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



Han consumido drogas ilegales	5,2	14,5	27,0	30,1	39,3	41,2	46,3
No han consumido drogas ilegales	94,8	85,5	73,0	69,9	60,7	58,8	53,7

* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.248.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2014.


	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Nunca	3,2	6,9	6,6	4,5	9,9
Menos de una noche al mes	8,0	12,3	17,3	19,9	22,0
De 1 a 3 noches al mes	14,2	21,6	29,1	35,7	33,1
1 noche a la semana	13,3	22,4	34,1	39,3	42,6
2 noches a la semana	18,0	29,7	44,8	49,4	55,8
3-4 noches a la semana	25,0	31,1	47,6	56,1	53,0
Más de 4 noches a la semana	32,3	40,6	53,1	57,0	52,8

* Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.249.


Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.250.


Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.251.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.252.


Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.253.

Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.254.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2014.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.255.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según sexo y según edad (%). España, 2014.

TOTAL		POR SEXO Y EDAD						
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Antes de las 12 de la noche	17,1	16,2	17,9	35,9	23,4	12,2	5,9	4,6
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	17,1	17,9	16,4	25,6	22,7	15,7	10,3	6,7
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	12,7	13,2	12,2	12,7	14,7	13,7	11,0	8,6
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	12,3	12,5	12,2	9,9	12,2	13,8	13,5	10,3
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	14,0	13,1	14,8	7,8	11,8	16,5	17,3	16,9
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	21,0	20,3	21,6	6,1	11,2	22,5	33,6	40,4
Después de las 8 de la mañana	5,8	6,7	4,9	2,1	3,9	5,7	8,4	12,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.256.

Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2014.

	2006	2008	2010	2012	2014
Antes de las 12 de la noche	16,1	14,5	16,5	14,6	17,1
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	15,1	15,7	16,4	14,0	17,1
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	13,9	13,8	13,8	11,3	12,7
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	13,8	14,6	13,0	11,4	12,3
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	15,3	15,3	15,6	14,9	14,0
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	20,6	20,3	19,6	25,2	21,0
Después de las 8 de la mañana	5,2	5,9	5,1	8,6	5,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.257.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2014.


	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína*
No ha salido	30,7	7,2	4,4	1,2
Antes de las 12 de la noche	54,4	14,9	9,1	1,5
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	72,0	20,6	15,0	1,5
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	81,5	28,3	21,8	2,0
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	87,3	34,6	27,9	2,3
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	91,0	37,8	32,0	2,7
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	96,0	51,8	44,8	3,9
Después de las 8 de la mañana	95,8	61,3	55,6	11,3

* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.258.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2014.



	Legales	Ilegales
Antes de las 12 de la noche	58,3	9,9
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	74,9	15,9
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	83,4	22,9
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	88,5	28,9
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	92,0	33,0
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	96,6	45,8
Después de las 8 de la mañana	96,6	57,3

* Drogas legales: tabaco, alcohol e hipnosedantes con/sin receta. Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.259.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según edad (%). España, 2014.


	14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
	Legales	Ilegales	Legales	Ilegales	Legales	Ilegales	Legales	Ilegales	Legales	Ilegales
Antes de las 12 de la noche	51,1	7,1	60,3	10,9	63,0	12,9	70,4	13,1	71,4	15,1
Entre las 12 y la 1	67,8	9,6	73,9	14,8	78,0	21,5	82,9	21,4	85,1	19,2
Entre la 1 y las 2	72,7	16,2	81,0	18,2	87,6	24,6	89,7	32,3	86,7	27,0
Entre las 2 y las 3	79,7	23,4	85,4	25,4	90,6	30,0	92,0	32,8	96,5	34,9
Entre las 3 y las 4	84,0	25,3	90,2	31,7	92,7	35,3	93,9	34,3	96,2	34,4
Entre las 4 y las 8	92,7	28,0	93,8	39,4	96,7	47,8	97,5	48,8	98,0	46,6
Después de las 8	92,6	38,5	96,1	55,6	95,8	58,9	97,3	60,3	98,0	58,6

* Drogas legales: tabaco, alcohol e hipnosedantes con/sin receta. Drogas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.260.

Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana). Total y según edad (%). España, 2014.



	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Antes de las 12 de la noche	39,3	11,7	5,7	1,7
Entre las 12 y la 1 de la madrugada	46,9	15,6	9,9	2,6
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	45,3	19,9	14,1	4,0
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	43,3	21,1	19,1	5,2
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	42,5	22,4	21,2	6,0
Entre las 4 y las 8 de la mañana	33,3	22,7	30,7	9,9
Después de las 8 de la mañana	25,3	20,4	30,9	20,0

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.
FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.261.

Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) y según edad (%). España, 2014.

	14 años				15 años				16 años				17 años				18 años			
	1	2	3	4**	1	2	3	4**	1	2	3	4**	1	2	3	4**	1	2	3	4**
Antes de las 12	35,7	9,7	4,1	1,5	39,9	12,8	6,4	1,6	40,8	12,8	7,5	1,4	46,9	13,9	8,0	1,7	49,9	10,3	3,5	8,5
Entre las 12 y la 1	45,2	15,0	6,2	1,7	47,7	14,2	9,2	2,9	45,0	15,4	13,9	3,4	50,5	18,9	11,0	3,2	48,5	18,8	15,5	2,0
Entre la 1 y las 2	43,6	14,1	11,9	2,4	48,9	18,3	9,9	4,2	44,6	23,0	16,2	3,7	43,2	23,0	17,8	5,6	42,5	20,3	19,2	4,6
Entre las 2 y las 3	40,8	19,3	15,3	4,4	45,6	17,9	16,8	5,5	43,2	21,9	20,2	5,0	43,6	22,0	21,1	5,6	39,4	27,5	24,2	5,6
Entre las 3 y las 4	43,7	20,6	14,7	4,8	41,1	22,7	20,5	5,9	41,9	21,1	23,0	6,8	44,3	21,7	21,8	6,0	40,1	29,6	21,4	5,2
Entre las 4 y las 8	47,3	17,3	18,8	9,4	38,7	18,2	26,9	10,0	32,5	22,7	31,3	10,5	30,1	25,1	32,8	9,5	34,0	22,3	31,8	9,9
Después de las 8	39,9	15,1	19,4	17,6	27,8	20,0	30,2	18,4	24,7	20,3	30,9	20,0	23,9	20,6	31,6	21,2	21,4	22,0	34,4	20,1

* Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.
** 4 o más sustancias.
FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.262.

Prevalencia de binge drinking, borracheras en los últimos 30 días, hacer botellón y beber alcohol en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2014.


	Binge drinking	No binge drinking	Borracheras últimos 30 días	No borracheras últimos 30 días	Botellón y beber alcohol últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis*
Antes de las 12 de la noche	10,8	89,2	5,7	94,3	21,2	11,9
Entre las 12 y la 1	18,6	81,4	10,0	90,0	38,3	11,3
Entre la 1 y las 2	28,8	71,2	17,2	82,8	51,2	8,6
Entre las 2 y las 3	34,0	66,0	22,4	77,6	58,5	8,0
Entre las 3 y las 4	42,9	57,1	30,6	69,4	67,1	12,1
Entre las 4 y las 8	58,8	41,2	45,1	54,9	79,0	15,3
Después de las 8 de la mañana	63,4	36,6	51,0	49,0	77,4	24,0

* Consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4). CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.263.

Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad. España, 2014.




Dinero disponible (euros)	
Total	17,2
Hombre	18,6
Mujer	15,9
14 años	14,4
15 años	15,8
16 años	17,3
17 años	19,3
18 años	21,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.264.

Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función del consumo de sustancias psicoactivas. España, 2014.



Dinero disponible (euros)	
Total alumnado de 14 a 18 años	17,2
Alcohol últimos 12 meses	17,8
Borracheras últimos 12 meses	18,6
Binge drinking últimos 30 días	19,7
Tabaco últimos 12 meses	18,8
Tabaco diariamente últimos 30 días	20,8
Cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	19,5
Hipnosedantes últimos 12 meses	19,4
Cannabis últimos 12 meses	18,9
Cocaína últimos 12 meses	25,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.265.

Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2014.

Notas saca habitualmente				Repetido curso alguna vez		Expulsión del centro*		Dificultad de concentración**	
	Sobresaliente/notable	Aprobado/bien	Suspenso	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido alcohol últimos 30 días	37,8	54,8	7,4	30,8	69,2	4,7	95,3	16,2	83,8
No ha consumido alcohol últimos 30 días	50,6	44,8	4,6	18,5	81,5	2,4	97,6	3,4	96,6
Se ha emborrachado últimos 30 días	33,5	57,4	9,1	35,0	65,0	6,7	93,3	26,4	73,6
No se ha emborrachado últimos 30 días	44,9	49,5	5,6	23,7	76,3	3,0	97,0	7,8	92,2
Ha hecho binge drinking últimos 30 días	32,2	58,5	9,3	36,7	63,3	6,2	93,8	24,2	75,8
No ha hecho binge drinking últimos 30 días	46,6	48,3	5,2	22,0	78,0	2,9	97,1	6,4	93,6
Ha hecho botellón último año	38,2	54,4	7,4	30,3	69,7	5,0	95,0	17,6	82,4
No ha hecho botellón último año	46,8	47,8	5,4	22,2	77,8	2,6	97,4	4,6	95,4
Ha consumido tabaco diariamente últimos 30 días	22,6	62,5	14,9	54,0	46,0	12,3	87,7	32,3	67,7
No ha consumido tabaco diariamente últimos 30 días	44,1	50,2	5,7	24,1	75,9	3,1	96,9	10,0	90,0
Ha consumido cannabis últimos 30 días	28,2	60,4	11,4	40,5	59,5	9,6	90,4	27,6	72,4
No ha consumido cannabis últimos 30 días	45,1	49,5	5,4	23,7	76,3	2,7	97,3	8,6	91,4
Puntuación CAST ≥ 4 ***	19,9	63,6	16,4	55,2	44,8	20,5	79,5	49,6	50,4
Puntuación CAST < 4 ***	34,6	57,9	7,5	30,1	69,9	5,2	94,8	20,3	79,7
Ha consumido cocaína últimos 30 días****	37,0	50,0	13,0	42,9	57,1	21,2	78,8	34,5	65,5
No ha consumido cocaína últimos 30 días****	42,0	51,6	6,4	26,5	73,5	3,6	96,4	11,6	88,4

* En los últimos 12 meses ha sido expulsado del centro educativo durante un día completo o más.

** En los últimos 12 meses ha tenido dificultad para concentrarme en el colegio al día siguiente después de salir.


*** CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático = puntuación CAST ≥ 4 .

**** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.266.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que en los últimos 12 meses ha conducido un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol o ha viajado como pasajero en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol (%). España, 2006-2014.



	2006	2008	2010	2012	2014
Ha conducido un vehículo bajo los efectos del alcohol	9,8	9,5	7,3	5,3	3,1
Ha viajado como pasajero en un vehículo conducido por alguien bajo los efectos del alcohol	22,0	24,6	21,4	23,3	17,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.267.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que en los últimos 12 meses han conducido un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias psicoactivas o han viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de sustancias psicoactivas, según sexo y según edad (%). España, 2014.

	Total	H	M	14	15	16	17	18	14-17
He conducido un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol	3,1	4,7	1,6	1,2	2,0	3,3	4,4	6,7	2,8
He conducido un vehículo de motor bajo los efectos de hachís o marihuana	2,0	3,0	1,0	0,7	1,2	2,3	2,8	4,3	1,8
He conducido un vehículo de motor bajo los efectos de cocaína	0,4	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol	17,2	15,9	18,4	8,3	13,7	18,1	23,4	28,5	16,2
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de hachís o marihuana	9,0	9,6	8,5	2,6	5,8	10,5	13,5	17,7	8,3
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de cocaína	1,7	1,9	1,5	0,8	1,3	1,7	2,3	3,1	1,6

H = Hombre; M = Mujer.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.268.

Situaciones que en los últimos 12 meses han experimentado los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2014.

	Comportamientos violentos*	Rel. sexuales y arrepentido*	Rel. sexuales sin preservativo*	No recordar*	Tener resaca*
Total alumnado	15,6	4,7	11,6	18,0	35,9
Consumo de alcohol en los últimos 12 meses					
SI	18,0	5,7	14,2	23,1	46,7
NO	7,5	1,2	2,9	1,2	0,8
Consumo de alcohol en los últimos 30 días					
SI	18,9	6,2	15,1	24,8	49,6
NO	8,3	1,4	4,1	3,7	7,2
Borracheras en los últimos 30 días					
SI	26,7	10,2	23,9	45,8	77,7
NO	12,0	2,9	7,8	9,9	23,5
Realización de binge drinking en los últimos 30 días					
SI	25,3	9,5	21,4	38,6	69,5
NO	10,8	2,4	6,9	8,3	20,2
Botellón en los últimos 30 días					
SI	25,3	9,9	21,5	39,2	69,5
NO	12,1	2,9	8,4	11,4	25,5
Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días					
SI	36,7	13,2	34,5	41,4	72,6
NO	13,2	3,7	9,2	15,4	31,8
Consumo de hipnosedantes en los últimos 12 meses					
SI	26,7	10,2	20,8	30,5	51,5
NO	14,1	4,0	10,4	16,5	34,1
Consumo de hipnosedantes en los últimos 30 días					
SI	28,8	11,3	21,1	30,3	50,0
NO	14,5	4,2	10,9	17,2	35,0
Consumo de cannabis en los últimos 12 meses					
SI	29,1	11,1	25,4	39,9	68,0
NO	10,9	2,5	6,9	10,6	25,1
Consumo de cannabis en los últimos 30 días					
SI	32,1	12,6	27,7	41,6	68,4
NO	11,8	2,9	7,9	12,7	28,6
Clasificación CAST de los consumidores de cannabis en los últimos 12 meses**					
Puntuación CAST 0-1	24,0	8,6	20,7	37,9	68,9
Puntuación CAST 2-3	37,2	14,4	34,3	50,5	74,1
Puntuación CAST ≥4	51,9	20,3	44,6	52,5	76,1
Consumo de cocaína en los últimos 12 meses***					
SI	48,4	24,3	38,9	44,8	61,1
NO	14,6	4,1	10,8	17,2	35,2
Consumo de cocaína en los últimos 30 días***					
SI	47,7	25,1	38,6	42,2	55,2
NO	14,9	4,3	11,0	17,5	35,5

* Las definiciones completas son las siguientes: He participado en alguna pelea o he sufrido o realizado alguna agresión física. He tenido relaciones sexuales de las que me he arrepentido al día siguiente. He tenido relaciones sexuales sin preservativo. No he podido recordar lo que sucedió la noche anterior después de haber salido. He tenido resaca al día siguiente después de salir.

** CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático = puntuación CAST ≥4.

*** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).




Problemas relacionados con las drogas

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2014

2.1.1.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2014.




	Nº de admisiones
1998	54.338
2002	46.744
2004	52.128
2005	50.630
2006	49.283
2007	50.555
2008	53.155
2009	52.549
2010	53.434
2011	50.281
2012	49.678
2013	51.946
2014	48.926

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.2.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2014.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	15.277	13.296	–
1992	20.017	15.956	–
1993	18.977	16.703	–
1994	18.770	17.526	–
1995	17.878	20.369	–
1996	16.647	28.382	–
1997	12.993	30.173	–
1998	11.867	30.756	–
1999	10.473	26.031	–
2000	8.151	26.412	–
2001	7.461	24.844	–
2002	5.051	21.162	–
2003	4.337	17.867	23.225
2004	3.836	15.617	20.532
2005	3.604	14.005	18.653
2006	3.318	14.502	18.803
2007	3.672	14.331	18.904
2008	3.840	13.616	17.456
2009	3.412	12.750	16.989
2010	4.526	12.166	17.325
2011	2.951	10.391	13.898
2012	2.555	9.302	12.238
2013	2.572	8.940	11.756
2014*	2.356	8.555	10.911

* Datos estimados para conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable Tratamiento previo en 2014. El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable Tratamiento previo.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.3.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. España, 1991-2014.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	681	262	-
1992	932	367	-
1993	1.146	431	-
1994	1.265	491	-
1995	1.415	516	-
1996	1.892	932	-
1997	3.129	1.402	-
1998	4.174	1.838	-
1999	6.126	2.576	-
2000	5.499	2.773	-
2001	5.977	3.046	-
2002	7.125	3.893	11.904
2003	11.851	5.893	18.359
2004	14.126	6.747	21.646
2005	15.258	7.562	23.746
2006	13.463	8.036	22.242
2007	13.429	8.753	23.037
2008	12.847	10.786	24.680
2009	12.142	9.107	23.132
2010	12.130	9.095	22.087
2011	10.637	8.889	20.335
2012	10.142	8.855	19.497
2013	10.734	8.726	19.848
2014*	9.683	8.182	17.864

* Datos estimados para conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable Tratamiento previo en 2014. El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable Tratamiento previo.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2014.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	1.300	230	-
1997	1.768	387	-
1998	2.412	407	-
1999	2.335	418	-
2000	2.487	408	-
2001	2.966	540	-
2002	3.972	665	4.772
2003	4.613	871	5.711
2004	5.319	928	6.500
2005	4.426	844	5.524
2006	4.125	941	5.304
2007	4.619	1.114	5.936
2008	5.058	2.055	7.419
2009	7.273	1.705	9.503
2010	8.639	2.101	11.192
2011	9.736	2.603	12.873
2012	10.982	3.402	14.869
2013	12.912	3.585	16.914
2014*	12.968	3.510	16.478

* Datos estimados para conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable Tratamiento previo en 2014. El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable Tratamiento previo.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2014.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	109	77	-
1997	144	111	-
1998	197	143	-
1999	165	147	-
2000	214	154	-
2001	299	170	-
2002	350	242	-
2003	382	225	-
2004	441	224	693
2005	383	209	618
2006	466	223	717
2007	503	261	795
2008	463	352	845
2009	598	312	963
2010	580	323	944
2011	709	386	1.143
2012	648	421	1.083
2013	787	374	1.175
2014*	871	321	1.192

* Datos estimados para conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable Tratamiento previo en 2014. El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable Tratamiento previo.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.6.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2014.




	Anfetaminas	Éxtasis	Alucinógenos
1996	319	226	74
1997	323	237	85
1998	347	154	62
1999	339	135	50
2000	288	240	64
2001	255	335	83
2002	342	452	68
2003	266	254	63
2004	330	236	44
2005	386	229	39
2006	426	165	37
2007	415	172	43
2008	400	155	43
2009	461	127	69
2010	501	93	66
2011	595	102	83
2012	512	134	107
2013	671	201	120
2014	635	133	82

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.7.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2014.




	Admisión a tratamiento (droga principal)	Admisión a tratamiento (droga secundaria)
2005	8	50
2006	10	59
2007	22	107
2008	20	112
2009	43	130
2010	46	132
2011	54	157
2012	66	164
2013	70	141
2014	49	109

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.8.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2014.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
2005	10.096	8.133	18.950
2006	10.172	8.611	19.454
2007	9.898	8.587	19.224
2008	9.395	9.753	26.318
2009	10.924	11.288	27.958
2010	15.126	11.764	28.111
2011	11.612	10.350	29.014
2012	14.816	12.714	28.234
2013	15.121	12.978	28.652
2014*	15.240	12.418	27.658

* Datos estimados para conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable Tratamiento previo en 2014. El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable Tratamiento previo.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.9.

Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total tratados). España, 1996-2014.




	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	31.046	24.224
1997	29.419	21.605
1998	28.527	18.910
1999	24.520	15.562
2000	24.941	13.955
2001	19.988	10.898
2002	17.950	9.583
2003	15.806	7.966
2004	13.605	6.516
2005	12.252	5.620
2006	11.601	4.892
2007	12.487	5.055
2008	12.066	5.050
2009	9.637	3.763
2010	9.697	3.549
2011	8.195	3.010
2012	7.580	2.562
2013	7.026	2.237
2014*	6.360	1.664

* Datos estimados para conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable Inyección en 2014.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.10.

Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (tratados por primera vez). España, 1996-2014.




	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	8.801	7.132
1997	7.154	5.488
1998	6.247	4.526
1999	5.315	3.655
2000	5.055	2.793
2001	3.483	2.181
2002	2.765	1.801
2003	2.722	1.583
2004	2.356	1.303
2005	2.283	1.228
2006	1.879	928
2007	2.073	1.060
2008	2.271	1.124
2009	1.687	866
2010	2.196	979
2011	1.635	702
2012	1.393	523
2013	1.457	530
2014*	1.065	261

* Datos estimados para conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable Inyección en 2014.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.11.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total tratados). España, 1987-2014.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	24,8	19,7
1988	25,4	19,8
1989	25,7	19,8
1990	26,2	20,0
1991	26,4	20,3
1992	26,6	20,3
1993	27,2	20,3
1994	27,8	20,6
1995	28,5	20,6
1996	29,3	20,6
1997	30,0	20,7
1998	30,7	20,6
1999	31,3	20,8
2000	32,0	20,6
2001	32,0	20,8
2002	33,6	20,9
2003	33,9	20,7
2004	35,4	20,8
2005	35,6	20,6
2006	36,4	20,3
2007	36,0	21,0
2008	37,5	21,1
2009	37,9	20,9
2010	38,4	21,4
2011	39,3	20,8
2012	40,4	20,7
2013	40,8	20,9
2014	40,9	21,1

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.12.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2014.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	25,7	20,6
1992	26,0	20,6
1993	26,4	20,7
1994	27,3	21,0
1995	27,9	21,2
1996	28,6	21,3
1997	29,2	21,4
1998	29,9	21,2
1999	30,3	21,8
2000	30,9	22,1
2001	31,4	22,3
2002	31,8	22,6
2003	31,9	22,3
2004	33,0	22,8
2005	33,0	22,0
2006	33,0	21,5
2007	34,1	23,3
2008	35,0	22,9
2009	34,5	22,8
2010	35,0	23,5
2011	36,7	22,6
2012	38,1	22,4
2013	38,2	22,3
2014	37,9	23,5

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.13.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (total tratados). España, 1987-2014.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	25,4	20,9
1988	26,1	21,3
1989	26,2	21,2
1990	26,5	21,4
1991	27,0	21,9
1992	27,6	22,1
1993	27,9	22,0
1994	28,5	22,0
1995	29,1	22,5
1996	29,3	22,3
1997	29,1	22,2
1998	29,1	22,1
1999	28,6	21,7
2000	29,1	21,5
2001	29,8	21,6
2002	29,8	21,9
2003	29,8	21,3
2004	30,0	21,3
2005	30,5	21,0
2006	31,2	20,8
2007	31,6	21,2
2008	32,1	21,0
2009	32,5	20,7
2010	33,3	20,8
2011	33,9	20,7
2012	34,4	20,7
2013	34,9	20,6
2014	35,3	20,6

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.14.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2014.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	26,6	21,9
1992	27,2	22,3
1993	27,6	22,3
1994	28,2	22,2
1995	28,6	22,6
1996	28,8	22,4
1997	28,6	22,4
1998	28,4	22,2
1999	27,8	21,9
2000	28,2	21,6
2001	29,0	21,8
2002	28,8	21,7
2003	28,8	21,5
2004	29,1	21,4
2005	30,0	21,1
2006	30,4	20,9
2007	30,8	21,5
2008	31,2	21,1
2009	31,6	20,9
2010	32,4	21,2
2011	33,0	21,1
2012	33,4	21,1
2013	33,9	21,0
2014	34,1	20,8

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.15.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	6.188	7.164	822
1992	9.585	8.232	1.219
1993	10.493	7.129	995
1994	10.873	6.435	978
1995	11.161	5.033	1.028
1996	10.934	4.488	696
1997	8.487	3.011	887
1998	7.884	2.518	910
1999	7.033	1.969	968
2000	5.917	1.414	532
2001	5.461	1.276	471
2002	3.540	894	399
2003	2.805	748	386
2004	2.690	648	358
2005	2.487	544	350
2006	2.320	486	303
2007	2.842	470	327
2008	2.891	455	285
2009	2.719	386	256
2010	3.589	465	258
2011	2.211	365	201
2012	1.870	276	159
2013	2.047	283	175
2014	1.670	154	125

Notas: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable Vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.16.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	43,4	50,3	5,8
1992	50,0	42,9	6,4
1993	56,1	38,1	5,3
1994	59,2	35,0	5,3
1995	64,5	29,1	5,9
1996	67,0	27,5	4,3
1997	67,2	23,8	7,0
1998	68,3	21,8	7,9
1999	69,3	19,4	9,5
2000	74,1	17,7	6,7
2001	74,9	17,5	6,5
2002	71,8	18,1	8,1
2003	69,3	18,5	9,5
2004	68,0	16,4	9,0
2005	69,0	15,1	9,7
2006	73,8	15,5	9,6
2007	77,4	12,8	8,9
2008	78,5	12,4	7,7
2009	79,7	11,3	7,5
2010	82,0	10,6	5,9
2011	77,7	12,8	7,1
2012	78,3	11,6	6,7
2013	79,6	11,0	6,8
2014	80,6	7,4	6,0

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.17.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014.




	Snifada	Pulmonar	Inyectada
1991	315	139	109
1992	547	196	121
1993	611	278	108
1994	714	238	97
1995	739	287	74
1996	1.307	413	82
1997	2.172	741	100
1998	3.073	856	128
1999	4.777	1.048	128
2000	4.067	1.172	105
2001	4.413	1.284	91
2002	5.613	1.403	156
2003	9.228	1.242	485
2004	11.140	1.837	693
2005	12.298	1.755	793
2006	11.155	1.617	103
2007	11.393	1.295	130
2008	10.391	1.276	117
2009	10.272	1.139	136
2010	9.952	1.203	166
2011	8.787	1.205	97
2012	8.346	781	95
2013	8.995	1.320	129
2014	6.798	986	56

Notas: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable Vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.18.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2014.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	55,4	24,4	19,2
1992	62,7	22,5	13,9
1993	60,8	27,7	10,7
1994	67,4	22,5	9,2
1995	66,5	25,8	6,7
1996	71,7	22,6	4,5
1997	71,0	24,2	3,3
1998	74,8	20,8	3,3
1999	79,5	17,4	2,1
2000	75,2	21,7	1,9
2001	75,2	21,9	1,6
2002	77,0	19,2	2,1
2003	83,0	11,2	4,4
2004	80,9	13,3	4,8
2005	80,6	11,5	5,2
2006	86,0	12,5	0,8
2007	88,0	10,0	1,0
2008	86,9	10,7	1,0
2009	87,7	9,7	1,2
2010	86,8	10,5	1,4
2011	85,5	11,7	0,9
2012	88,3	8,3	1,0
2013	83,8	12,3	1,2
2014	82,6	12,0	0,7

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.


2.1.19.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2014.



2.1.20.

Porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2014.




	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Opiáceos	Estimulantes	Alucinógenos
2005	57,4	42,7	8,9	10,9	5,9	0,6
2006	58,7	44,1	9,0	11,8	5,2	0,9
2007	58,0	43,3	8,5	12,3	4,6	0,8
2008	66,1	49,1	10,6	11,8	4,3	1,2
2009	61,5	50,9	9,8	5,9	3,9	0,9
2010	63,4	52,0	9,9	6,6	4,3	1,3
2011	63,7	51,6	9,3	6,5	4,9	1,5
2012	62,1	52,9	10,1	7,1	4,6	1,2
2013	60,8	53,5	9,1	6,7	4,8	1,2
2014	56,7	48,3	8,1	4,5	2,8	0,4

El 76,9% de los admitidos a tratamiento por alcohol sólo han consumido alcohol (30 días previos a la admisión a tratamiento). Los porcentajes de esta tabla están calculados sobre el 24,1% restante (n = 6.394) que han consumido otras sustancias (30 días previos a la admisión a tratamiento).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.21.

Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2014.




	Hombre	Mujer	Total
1996	35,9	43,4	37,1
1997	32,4	41,0	33,7
1998	32,4	39,7	33,6
1999	31,9	40,2	33,0
2000	32,7	37,9	33,5
2001	32,7	40,2	33,7
2002	30,9	38,9	32,0
2003	31,5	39,3	32,6
2004	27,7	38,3	29,3
2005	31,5	39,5	32,7
2006	32,7	37,4	33,4
2007	30,0	36,2	30,9
2008	26,7	33,3	27,6
2009	26,0	32,2	26,9
2010	29,8	31,7	30,2
2011	28,5	30,0	28,7
2012	28,2	30,0	28,4
2013	24,2	26,1	24,4
2014	26,3	24,4	26,0

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013 y 27,2% en 2014.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.22.

Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2014.



	< 25 años	25-34 años	> 34 años
1996	20,3	39,3	48,9
1997	17,5	34,0	46,4
1998	15,1	33,4	45,8
1999	15,2	32,0	44,0
2000	13,1	30,5	45,5
2001	14,0	29,1	44,4
2002	12,1	26,7	42,8
2003	9,2	25,5	43,8
2004	7,1	20,9	39,4
2005	9,7	23,1	41,9
2006	7,2	21,4	42,2
2007	3,2	18,7	40,3
2008	3,2	16,9	35,6
2009	2,2	15,2	34,7
2010	8,1	14,8	38,0
2011	9,9	14,5	35,6
2012	8,6	11,7	35,4
2013	4,7	8,9	30,4
2014	5,9	12,0	31,2

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013 y 27,2% en 2014.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.23.

Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2014.


Droga principal por la que es admitido a tratamiento	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	17.864	23,3
Cocaína polvo	17.185	22,4
Cocaína base	673	0,9
Opioides	12.032	15,7
Heroína	10.911	14,2
Metadona (mal uso)	477	0,6
Otros opioides	644	0,9
Cannabis	16.478	21,5
Hipnosedantes	1.192	1,6
Estimulantes	860	1,1
Anfetaminas	635	0,8
Éxtasis y derivados	133	0,2
Otros estimulantes	92	0,1
Alucinógenos	82	0,1
Inhalantes volátiles	20	0,0
Otras drogas ilegales	398	0,5
Alcohol	27.658	36,1
Total drogas ilegales	48.926	63,9
Total drogas ilegales y alcohol	76.584	100,0

Nota: Las admisiones por cocaína no suman debido a la existencia de 6 casos cuya sustancia de admisión a tratamiento son otras formas de cocaína diferentes al clorhidrato o la base.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.24.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2014.



	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores 18 años	Nacidos fuera de España
Opioides	15,7	6,8	0,4	15,4
Cocaína	23,3	22,5	2,6	19,7
Cannabis	21,5	31,1	92,3	22,7
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc)	1,1	1,5	0,6	0,8
Alcohol	36,1	35,4	2,1	38,5
Número de admisiones	76.584	36.633	2.340	7.233


* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en este gráfico sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.25.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2014.



	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores 18 años	Nacidos fuera de España
Opioides	24,6	10,5	0,4	25,4
Cocaína	36,5	34,8	2,7	32,6
Cannabis	33,7	48,1	94,3	37,6
Otros estimulantes	1,8	2,3	0,7	1,3
Otras sustancias	3,4	4,3	1,9	3,1
Número de admisiones	48.926	23.656	2.290	4.378

* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.
El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en este gráfico sólo se representan algunas drogas.
FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.26.

Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2014.



	TASAS (España 104,94 casos/100.000 habitantes)	NÚMERO DE CASOS (Total 48.926)
Canarias	181,59	3.814
Ceuta	172,08	145
Melilla	171,76	147
Andalucía	152,04	12.770
Extremadura	144,92	1.584
Comunidad Valenciana	124,70	6.211
Baleares	114,62	1.266
Galicia	108,70	2.970
Cataluña	92,73	6.962
Madrid	91,01	5.858
Murcia	85,40	1.253
La Rioja	77,59	246
Cantabria	74,51	436
Castilla-La Mancha	73,96	1.523
País Vasco	66,96	1.466
Castilla y león	55,95	1.383
Aragón	43,56	574
Navarra	26,07	167
Asturias	14,36	151

Nota: Tasas brutas calculadas con la población de cada Comunidad/Ciudad Autónoma a 1 de enero de 2014 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.27.

Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas, según existencia o no de tratamiento previo y según sexo. España, 2014.

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Nº de casos	48.926	18.786	23.656	41.044	7.718
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	55,7	–	–	54,9	60,9
Edad media (años)	33,7	37,3	30,5	33,6	34,2
Mujeres (%)	15,8	14,8	16,5	–	–
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	1,2	1,5	1,1	1,2	1,2
Enseñanza primaria	55,9	58,1	56,4	56,9	50,1
Enseñanzas secundarias	38,9	37,3	38,7	38,2	42,6
Estudios universitarios	4,0	3,2	3,9	3,6	6,1
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	26,6	24,9	27,2	27,4	22,3
Parado no habiendo trabajado	7,6	6,9	8,4	7,5	8,2
Parado habiendo trabajado	43,7	49,7	40,5	43,8	42,8
Otras	22,1	18,5	23,9	21,3	26,6
Nacidos fuera de España (%)	9,3	7,7	9,6	9,2	10,1
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	6,0	10,8	1,6	5,6	7,8
Médicos generales, atención primaria de salud	10,2	6,8	13,4	10,0	11,4
Hospitales u otros servicios de salud	6,3	5,4	7,5	5,6	9,8
Servicios sociales	3,2	2,5	3,9	2,5	7,0
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	7,7	11,0	6,1	8,4	4,1
Servicios legales o policiales	10,9	7,6	15,2	11,7	6,6
Empresas o empleadores	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Familiares o amigos/as	11,8	7,8	16,4	12,0	10,9
Iniciativa propia	41,3	46,6	32,9	41,7	39,2
Otras	2,5	1,4	2,8	2,4	3,0
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	12,0	14,4	9,7	12,2	10,6
Unicamente con pareja	10,4	10,7	9,9	9,5	15,2
Unicamente con hijos	3,3	2,9	2,7	2,3	8,5
Con pareja e hijos/as	15,7	15,4	16,1	15,7	15,5
Con padres o familia de origen	42,4	34,9	48,8	44,0	33,5
Con amigos	2,8	2,9	2,4	2,7	3,5
Otros	13,5	18,7	10,4	13,5	13,1
Número de hijos	0,7	0,8	0,6	0,6	0,9
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	87,4	81,8	91,5	87,0	89,7
Prisiones, centros de internamiento cerrado para menores	6,5	9,9	4,7	7,1	3,5
Otras instituciones	2,5	3,3	1,9	2,4	3,1
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,7	0,3	0,5	0,4
Alojamientos inestables/precarios	2,6	3,6	1,5	2,5	2,7
Otros lugares	0,5	0,6	0,2	0,5	0,6

2.1.27. (continuación)

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de casos	48.926	18.786	23.656	41.044	7.718
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	24,6	42,9	10,5	24,8	23,3
Heroína	22,3	40,1	8,8	22,7	20,1
Metadona	1,0	1,2	0,8	1,0	1,1
Otros opioides	1,3	1,5	1,0	1,2	2,2
Cocaína	36,5	37,0	34,8	37,2	33,0
CLH Cocaína	35,1	35,8	33,2	35,8	31,8
Cocaína otras	1,4	1,2	1,6	1,4	1,2
Otros estimulantes	1,8	1,3	2,3	1,6	2,4
Anfetaminas	1,3	1,1	1,6	1,2	1,9
Éxtasis y derivados	0,3	0,1	0,5	0,3	0,2
Otros estimulantes	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3
Hipnosedantes	2,4	1,5	3,3	1,8	5,9
Barbitúricos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benzodiacepinas	2,2	1,4	3,0	1,7	5,2
Otros hipnosedantes	0,2	0,1	0,3	0,1	0,7
Alucinógenos	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Cannabis	33,7	16,4	48,1	33,7	33,6
Otras sustancias	0,8	0,7	0,7	0,7	1,5
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	19,3	19,5	19,0	19,0	21,2
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	46,2	42,0	50,0	45,6	49,0
4-6 días/semana	7,3	6,3	7,8	7,5	5,9
2-3 días/semana	13,5	11,8	14,7	13,8	12,1
1 día/semana	5,5	5,1	5,7	5,5	5,5
Menos de 1 día/semana	7,4	7,7	6,9	7,5	6,9
No consumió	20,2	27,1	14,9	20,1	20,5
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	6,8	5,4	7,5	5,8	11,6
Pulmonar	56,1	53,4	59,3	56,5	54,1
Intranasal	32,6	33,1	31,5	33,1	29,7
Parenteral	3,8	7,3	1,0	3,8	3,6
Otras	0,8	0,9	0,7	0,7	1,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	13,0	24,3	4,5	13,3	11,3
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	3,4	6,6	1,1	3,5	3,1
Prevalencia mínima VIH**	3,8	6,9	1,3	3,6	4,8
Prevalencia mínima Hepatitis C**	7,6	14,6	2,0	7,6	7,5
Prevalencia mínima Hepatitis B** (portador crónico)	0,8	1,5	0,4	0,8	0,8

* El número de casos con o sin tratamiento previo o el número de hombres más el número de mujeres pueden no sumar el total, debido a la existencia de casos con valores desconocidos en estas variables.

** Positivos entre el total (prevalencia mínima).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.28.

Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2014.

Admitidos a tratamiento por alcohol	Número absoluto	Porcentaje
Han consumido sólo alcohol	21.264	76,9
Han consumido alcohol y otras drogas	6.394	23,1
Una droga más	4.725	17,1
Dos drogas más	1.379	5,0
Tres o más drogas	290	1,0

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.29.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según existencia o no de tratamiento previo, y según sexo. España, 2014.

	Total	Tratamiento previo por alcohol*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de casos	27.658	10.571	12.977	21.470	6.101
Tratados por primera vez por alcohol (%)	55,1	–	–	54,9	55,7
Edad media (años)	45,7	46,7	44,9	45,6	46,0
Mujeres (%)	22,1	21,4	21,9	–	–
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	1,1	1,0	1,3	1,2	0,9
Enseñanza primaria	51,7	53,7	52,7	53,5	45,0
Enseñanzas secundarias	39,5	38,6	38,8	38,7	42,5
Estudios Universitarios	7,7	6,6	7,2	6,6	11,6
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	35,5	31,9	38,2	36,6	31,8
Parado no habiendo trabajado	2,8	2,7	3,0	2,3	4,3
Parado habiendo trabajado	41,1	43,7	40,0	41,4	40,2
Otras	20,6	21,7	18,8	19,8	23,7
Nacidos fuera de España (%)	10,8	7,8	11,4	9,8	14,3
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	3,4	4,8	1,3	3,1	4,1
Médicos generales, atención primaria de salud	25,8	20,2	32,3	26,0	24,6
Hospitales u otros servicios de salud	12,5	11,8	14,4	11,7	15,6
Servicios sociales	5,4	5,6	5,9	4,9	7,5
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	2,3	2,5	2,6	2,7	1,1
Servicios legales o policiales	2,2	2,3	2,4	2,5	1,2
Empresas o empleadores	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2
Familiares o amigos/as	12,3	11,7	14,6	12,6	11,6
Iniciativa propia	33,8	38,8	24,3	34,4	32,1
Otras	1,9	1,9	1,9	1,8	2,0

2.1.29. (continuación)

	Total	Tratamiento previo por alcohol*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	18,4	20,2	17,0	18,9	16,6
Unicamente con pareja	14,0	13,5	14,3	13,3	16,4
Unicamente con hijos	5,4	5,0	5,4	3,5	12,5
Con pareja e hijos/as	25,6	23,2	28,2	26,0	23,8
Con padres o familia de origen	22,7	21,8	23,0	24,5	16,5
Con amigos	2,3	2,3	2,0	2,3	2,5
Otros	11,5	13,9	10,1	11,5	11,6
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	92,0	89,9	93,7	91,2	94,9
Prisiones, centros de internamiento cerrado para menores	1,8	2,1	1,9	2,1	0,7
Otras instituciones	2,4	3,7	1,4	2,5	1,9
Pensiones, hoteles, hostales	0,7	0,8	0,5	0,8	0,5
Alojamientos inestables/precarios	2,8	3,2	2,4	3,0	1,9
Otros lugares	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2
Edad al inicio del consumo de alcohol (años)	18,8	18,0	18,7	17,7	21,6
Frecuencia de consumo de alcohol en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	58,6	56,9	61,7	59,2	56,4
4-6 días/semana	6,2	5,7	6,2	6,1	6,8
2-3 días/semana	11,3	9,4	12,3	11,2	11,7
1 día/semana	4,2	4,0	4,3	4,0	4,9
Menos de 1 día/semana	5,5	5,8	4,9	5,3	6,1
No consumió	14,2	18,3	10,5	14,2	14,1
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	3,9	4,7	3,0	4,1	2,9
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	0,6	0,7	0,4	0,6	0,5
Prevalencia VIH positivo**	1,0	1,3	0,9	1,0	1,0
Prevalencia Hepatitis C**	2,8	3,7	2,1	2,9	2,7
Prevalencia Hepatitis B (portador crónico)**	0,5	0,7	0,4	0,5	0,4

* El número de casos con o sin tratamiento previo o el número de hombres más el número de mujeres pueden no sumar el total, debido a la existencia de casos con valores desconocidos en estas variables.

** Prevalencias mínimas (positivos entre todos los admitidos a tratamiento).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.30.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal que motiva el tratamiento. España, 2014.

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Número de casos	17.864	16.478	12.032	10.911	1.192	1.082	477	635	133	82	20
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	54,2	78,7	23,6	21,6	73,1	72,4	43,2	64,5	89,5	67,1	57,9
Edad media (años)	35,3	26,2	41,0	40,9	39,9	39,4	42,2	33,1	26,3	29,4	29,6
Mujeres (%)	14,3	15,8	15,0	14,3	38,2	37,0	17,5	22,9	13,5	19,5	25,0
Máximo nivel de estudios completados (%)											
Sin estudios	0,9	0,5	2,5	2,5	3,2	2,9	4,9	0,3	0,0	0,0	5,6
Enseñanza primaria	52,2	55,7	62,5	62,8	59,4	59,6	64,0	43,8	36,9	48,7	66,7
Enseñanza secundaria	42,2	39,9	32,4	32,3	30,3	31,0	29,4	48,9	53,1	47,4	22,2
Estudios superiores	4,7	3,8	2,6	2,3	7,1	6,6	1,6	7,0	10,0	3,8	5,6
Situación laboral											
Trabajando	38,7	20,8	16,8	16,7	19,0	18,8	14,0	30,0	31,8	26,6	11,1
Parado sin trabajo previo	4,1	10,6	8,1	8,2	15,3	16,1	8,4	5,8	6,8	7,6	5,6
Parado habiendo trabajado	45,4	34,6	53,8	54,2	43,4	43,2	56,8	50,1	32,6	46,8	38,9
Otras situaciones	11,8	34,0	21,3	20,9	22,2	21,9	20,8	14,1	28,8	19,0	44,4
Nacidos fuera de España (%)	8,3	10,3	9,7	9,8	9,4	9,7	7,8	5,9	8,0	6,2	55,6
Fuente de referencia principal que lo ha referido a tratamiento (%)											
Otros servicios tto. drogodependencias	4,2	2,0	14,4	13,9	2,2	2,2	25,0	6,8	2,3	2,5	0,0
Médico general, At. Primaria de Salud	12,0	11,0	4,9	4,6	22,2	20,5	2,4	13,8	5,3	16,0	25,0
Hospitales u otros servicios de salud	5,8	7,9	3,5	2,9	14,8	14,8	6,0	11,0	4,5	4,9	20,0
Servicios Sociales	2,4	4,9	1,8	1,8	3,0	3,2	1,5	3,9	2,3	1,2	30,0
Prisión, centros reforma o internamiento menores	6,5	5,3	12,9	13,3	11,6	12,3	12,2	4,0	4,5	9,9	10,0
Servicios legales o policiales	7,4	19,7	4,2	4,3	4,1	4,6	4,1	11,8	39,1	12,3	0,0
Empresas o empleador	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2,5	0,0
Familiares y amigos	13,6	14,8	5,5	5,7	8,0	7,9	2,8	14,2	11,3	8,6	0,0
Iniciativa propia	46,3	30,5	50,6	51,4	31,6	32,0	44,9	31,9	28,6	38,3	10,0
Servicios de educación	0,2	1,1	0,4	0,4	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Otras situaciones	1,4	2,6	1,6	1,6	2,0	2,0	1,3	2,4	2,3	3,7	0,0
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Solo/a	11,7	8,1	17,3	17,3	14,4	14,6	17,1	14,8	12,9	12,5	10,0
Únicamente con pareja	12,7	7,0	11,7	11,2	12,0	12,2	16,7	10,6	2,3	5,0	20,0
Únicamente con hijos/as	3,5	2,7	3,0	3,0	6,1	5,8	1,8	5,1	0,0	5,0	5,0
Con la pareja e hijos/as	22,6	9,3	14,2	13,9	20,2	19,7	16,4	7,2	5,3	13,8	5,0
Con padres o familia de origen	34,8	60,4	29,6	29,7	33,2	33,5	28,5	47,3	63,6	38,8	15,0
Con amigos/as	2,3	2,6	3,9	4,0	2,1	2,1	2,2	4,5	3,8	5,0	0,0
Detenido	4,9	3,1	8,9	9,0	4,6	4,7	9,4	5,3	7,6	6,3	15,0
En instituciones no detenido	1,5	1,9	2,8	2,8	2,4	2,5	2,0	1,4	1,5	0,0	20,0
Otras situaciones	5,9	4,9	8,8	9,1	5,0	4,9	5,9	3,7	3,0	13,8	10,0

2.1.30. (continuación)

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Nº de casos	17.864	16.478	12.032	10.911	1.192	1.082	477	635	133	82	20
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Casas, pisos, apartamentos	90,1	92,7	75,8	75,4	88,4	88,2	76,6	88,6	91,7	91,4	70,0
Prisión, centros reforma o internamiento menores	5,6	3,1	12,8	13,3	5,7	5,8	10,3	4,9	6,1	8,6	0,0
Otras instituciones	2,0	2,5	3,5	3,3	1,9	1,9	3,6	2,9	1,5	0,0	25,0
Pensiones, hoteles, hostales	0,4	0,3	1,0	1,0	0,3	0,3	2,1	0,8	0,0	0,0	0,0
Alojamiento inestable/precario	1,6	1,1	6,0	6,1	3,7	3,8	5,8	2,5	0,8	0,0	5,0
Otros lugares	0,4	0,3	0,9	0,9	0,1	0,1	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0
Edad de inicio consumo droga principal (años)	20,6	15,6	21,6	21,1	27,0	26,5	29,0	20,5	19,9	21,3	21,7
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)											
Oral	2,8	2,3	6,4	0,8	98,7	98,7	91,1	21,6	91,1	47,2	5,6
Pulmonar	13,8	96,8	72,7	77,8	0,7	0,8	6,3	3,6	1,6	0,0	50,0
Intranasal o esnifada	81,4	0,4	5,7	5,9	0,3	0,3	0,4	73,5	5,6	52,8	44,4
Inyectada o parenteral	1,3	0,0	13,7	14,2	0,0	0,0	1,3	1,0	0,8	0,0	0,0
Otras	0,7	0,4	1,4	1,3	0,3	0,3	0,9	0,3	0,8	0,0	0,0
Frecuencia de consumo de la droga principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Todos los días	21,0	66,6	54,2	52,4	83,1	83,2	88,0	24,9	10,6	28,4	31,6
4-6 días a la semana	10,7	5,9	4,4	4,5	2,5	2,4	2,6	10,7	4,5	6,8	0,0
2-3 días a la semana	23,8	8,6	5,7	6,0	3,6	3,7	0,9	24,4	14,4	20,3	21,1
1 día a la semana	10,2	2,7	2,3	2,4	1,1	1,2	0,4	8,9	11,4	10,8	5,3
Menos de 1 día a la semana	12,8	3,7	3,9	4,1	1,2	1,1	0,9	11,1	18,2	12,2	26,3
No consumió	21,6	12,5	29,5	30,6	8,4	8,2	7,2	20,0	40,9	21,6	15,8
Otras sustancias consumidas los últimos 30 días previos a la admisión a tratamiento											
Opioides	5,7	1,8	8,8	8,6	7,5	7,5	17,8	2,6	1,3	8,3	14,3
Heroína	5,2	1,4	0,7	0,0	5,6	5,7	16,5	2,3	0,0	6,3	14,3
Metadona	0,3	0,1	7,4	7,9	1,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros opioides	0,3	0,4	0,7	0,7	0,6	0,5	1,3	0,3	1,3	2,1	0,0
Cocaína	0,4	29,6	44,4	45,9	24,2	23,7	15,3	27,5	35,0	37,5	14,3
CLH Cocaína	0,2	29,3	39,5	40,9	21,5	21,0	10,2	27,2	33,8	35,4	14,3
Cocaína base	0,2	0,4	5,2	5,2	3,0	3,0	5,1	0,3	1,3	2,1	0,0
Cocaína otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.1.30. (continuación)

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Nº de casos	17.864	16.478	12.032	10.911	1.192	1.082	477	635	133	82	20
Estimulantes	4,4	7,2	1,7	1,6	3,6	3,9	0,8	5,7	7,5	10,4	0,0
Anfetaminas	2,4	4,0	1,1	1,0	1,9	2,1	0,4	0,0	6,3	6,3	0,0
Metanfetaminas	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,3	0,0	0,0
MDMA y derivados	1,9	2,7	0,4	0,5	1,3	1,4	0,0	4,9	0,0	4,2	0,0
Otros estimulantes	0,2	0,4	0,1	0,1	0,4	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Hipnosedantes	4,7	4,0	14,0	13,6	3,2	2,7	21,6	2,8	5,0	4,2	0,0
Alucinógenos	0,9	1,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,4	3,1	6,3	0,0	0,0
Sustancias volátiles	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Cannabis	45,5	0,0	45,3	45,2	54,1	54,6	49,2	57,3	50,0	35,4	42,9
Alcohol	67,5	77,0	28,9	28,4	42,5	43,2	35,2	45,5	47,5	52,1	57,1
Otras sustancias psicoactivas	0,7	0,6	0,5	0,6	1,3	1,4	0,0	0,5	3,8	2,1	0,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida	4,7	2,0	43,9	44,0	7,4	7,4	51,2	5,6	0,8	4,2	7,1
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses	1,4	0,3	11,8	12,2	0,7	0,8	5,1	1,8	0,8	1,4	0,0
Se inyectó drogas en los últimos 30 días	0,8	0,2	6,3	6,5	0,4	0,4	2,1	1,3	0,8	1,4	0,0
Prevalencia mínima VIH positivo	1,7	0,7	11,6	11,7	3,1	2,9	11,7	1,9	2,3	2,4	0,0
Prevalencia mínima de Hepatitis C	2,6	1,3	24,4	24,9	4,4	4,3	21,4	2,8	1,5	3,7	0,0
Prevalencia mínima de Hepatitis B (portador crónico)	0,4	0,2	2,2	2,1	0,8	0,7	2,7	0,3	0,0	0,0	0,0

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.31.

Prevalencia* de infección por VIH entre los inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas en %. España, 2014.

	Inyección en 12 meses previos a la admisión			Inyección alguna vez en la vida		
	Total	Tratamiento previo**		Total	Tratamiento previo**	
		Sí	No		Sí	No
Total inyectores (nº)	1.387	1.068	242	5.224	3.948	974
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.010	822	133	3.992	3.156	610
Prevalencia de infección por VIH (%)	26,0	26,5	18,8	30,9	31,1	27,9
Hombres inyectores (nº)	1.191	929	201	4.505	3.401	852
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	871	716	111	3.425	2.710	526
Prevalencia de infección por VIH (%)	26,3	26,4	19,8	30,1	30,2	27,8
Mujeres inyectadoras (nº)	191	135	41	695	529	118
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	135	102	22	549	432	81
Prevalencia de infección por VIH (%)	24,4	27,5	13,6	35,7	36,6	28,4
Inyectores < 25 años (nº)	64	32	29	96	42	43
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	34	19	13	47	25	18
Prevalencia de infección por VIH (%)	5,9	5,3	0,0	4,3	4,0	0,0
Inyectores 25-34 años (nº)	347	235	94	702	488	181
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	225	166	47	470	344	107
Prevalencia de infección por VIH (%)	12,0	13,9	6,4	11,3	12,5	7,5
Inyectores > 34 años (nº)	975	800	119	4.424	3.416	750
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	751	637	73	3.474	2.786	485
Prevalencia de infección por VIH (%)	31,2	30,5	30,1	34,0	33,7	33,4
Inyectores consumidores de opiáceos**	1.185	1.014	167	4.333	3.495	591
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	861	743	115	3.342	2.788	360
Prevalencia de infección por VIH (%)	27,9	28,0	27,0	32,2	32,3	28,6
Inyectores no consumidores de opiáceos	202	124	62	891	453	383
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	149	98	40	650	368	250
Prevalencia de infección por VIH (%)	15,4	13,3	17,5	24,3	22,6	26,8

El número de casos con o sin tratamiento previo pueden no sumar el total, debido a la existencia de casos con valores desconocidos en esta variable.


* Las prevalencias están calculadas sobre el nº de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las otras variables que se cruzan.

** Se incluyen tanto los admitidos a tratamiento por dependencia de opiáceos como los admitidos por otras drogas psicoactivas que han consumido opiáceos en los 30 días previos a la admisión.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.32.

Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (%). España, 2005-2014.



FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.33.

Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (% y números absolutos). España, 2005-2014.


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total inyectores último año previo a admisión (nº)	4.358	4.892	4.575	4.546	3.763	3.549	3.094	2.562	2.237	1.387
Conocen su estado serológico frente a VIH (nº)	2.996	3.665	3.319	3.203	2.585	2.487	2.259	1.910	1.646	1.010
Prevalencia de infección por VIH (%)	32,7	33,4	30,8	27,6	26,9	30,2	28,7	28,4	24,4	26,0
Total inyectores alguna vez en la vida (nº)	9.533	11.601	11.249	10.895	9.637	9.697	8.385	7.580	7.026	5.224
Conocen su estado serológico frente a VIH (nº)	6.991	9.068	8.643	8.126	7.143	7.243	6.546	5.957	5.439	3.992
Prevalencia de infección por VIH (%)	36,1	36,4	34,5	32,5	32,3	33,6	33,0	33,1	30,6	30,9

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2014

2.2.1.

Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España*, 1996-2014.



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Cocaína	19,9	25,0	31,6	39,4	40,9	40,5	44,7	50,0	55,5	51,1	53,8	55,1	51,1	49,5	45,2	46,0	44,9	43,7
Alcohol	12,4	15,2	22,2	20,0	26,8	29,0	35,4	30,7	32,3	36,0	35,7	37,3	40,2	36,3	40,4	39,0	38,7	38,7
Cannabis	6,2	6,6	8,9	9,3	12,8	16,9	19,9	19,3	21,7	23,9	22,9	24,7	29,5	30,5	33,3	33,0	34,6	35,5
Hipnosedantes	23,6	18,9	24,3	23,8	28,9	29,2	30,1	22,3	17,0	21,0	15,8	15,6	16,5	16,7	18,9	18,3	17,8	18,5
Heroína	56,1	50,9	38,7	33,0	35,3	29,2	21,4	17,5	19,0	16,9	16,9	17,2	17,1	17,8	14,2	13,0	11,9	10,3
Anfetaminas	2,2	2,9	3,0	9,8	2,2	4,2	3,4	2,3	4,2	4,7	4,2	4,4	4,6	5,5	9,2	8,9	9,0	8,6
Otros opioides	13,5	17,4	16,8	18,9	18,0	17,4	13,1	9,1	8,3	8,5	8,1	7,5	7,6	6,7	6,2	6,1	5,7	7,6
MDMA y derivados	1,3	2,2	2,2	2,4	4,5	4,4	5,3	3,2	4,7	6,4	5,0	4,2	2,4	2,9	3,9	4,6	4,8	4,5
Otras sustancias	4,1	3,2	4,9	1,3	0,8	1,6	1,8	8,7	3,3	4,9	6,0	1,8	1,2	1,8	2,2	3,3	2,5	2,6
Alucinógenos	2,1	1,8	2,4	1,7	2,7	1,9	1,3	0,8	1,7	1,7	2,0	1,6	2,6	1,7	2,1	2,5	2,6	2,5
Inhalables volátiles	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,9	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.2.

Número total de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje de urgencias en el que aparece cada sustancia. España*, 1996-2014.

	Nº de episodios	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnóticos y sedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	Éxtasis y derivados	Alucinógenos	Inhalables volátiles
1996	2.585	19,9	12,4	6,2	23,6	56,1	2,2	13,5	1,3	2,1	0,2
1997	1.932	25,0	15,2	6,6	18,9	50,9	2,9	17,4	2,2	1,8	0,1
1998	2.099	31,6	22,2	8,9	24,3	38,7	3,0	16,8	2,2	2,4	0,3
1999	2.141	39,4	20,0	9,3	23,8	33,0	9,8	18,9	2,4	1,7	0,1
2000	2.328	40,9	26,8	12,8	28,9	35,3	2,2	18,0	4,5	2,7	0,3
2001	2.145	40,5	29,0	16,9	29,2	29,2	4,2	17,4	4,4	1,9	0,9
2002	2.673	44,7	35,4	19,9	30,1	21,4	3,4	13,1	5,3	1,3	0,2
2004	5.828	50,0	30,7	19,3	22,3	17,5	2,3	9,1	3,2	0,8	0,6
2005	7.089	55,5	32,3	21,7	17,0	19,0	4,2	8,3	4,7	1,7	0,5
2006	7.042	51,1	36,0	23,9	21,0	16,9	4,7	8,5	6,4	1,7	0,4
2007	7.822	53,8	35,7	22,9	15,8	16,9	4,2	8,1	5,0	2,0	0,5
2008	6.431	55,1	37,3	24,7	15,6	17,2	4,4	7,5	4,2	1,6	0,5
2009	5.567	51,1	40,2	29,5	16,5	17,1	4,6	7,6	2,4	2,6	0,5
2010	5.626	49,5	36,3	30,5	16,7	17,8	5,5	6,7	2,9	1,7	0,4
2011	5.279	45,2	40,4	33,3	18,9	14,2	9,2	6,2	3,9	2,1	0,3
2012	5.999	46,0	39,0	33,0	18,3	13,0	8,9	6,1	4,6	2,5	0,5
2013	5.715	44,9	38,7	34,6	17,8	11,9	9,0	5,7	4,8	2,5	0,4
2014	6.441	43,7	38,7	35,5	18,5	10,3	8,6	7,6	4,5	2,5	0,3

El sumatorio de los porcentajes supera el 100% debido a que en cada episodio puede aparecer más de una sustancia.

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.2.3.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España*, 1996-2014.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Número de episodios	2.585	1.932	2.099	2.141	2.328	2.145	2.673	5.828	7.089	7.042	7.822	6.431	5.567	5.626	5.279	5.999	5.715	6.441
Edad media (años)	27,8	28,1	29,1	29,4	30,3	29,8	29,8	31,0	30,7	31,6	32,0	32,4	33,0	32,6	32,7	32,8	33,0	33,2
Sexo (%)																		
Mujeres	21,4	20,8	23,1	23,5	27,4	27,1	27,4	28,0	25,0	26,1	23,4	22,7	21,6	26,3	24,7	26,1	26,1	24,5
Condición legal (%)																		
Detenido	14,4	22,4	11,7	9,4	6,4	5,7	5,2	4,1	4,9	3,7	3,8	4,4	4,9	4,2	3,7	4,1	3,8	4,3
Resolución urgencia (%)																		
Alta médica	80,5	82,0	81,2	80,9	78,7	79,1	82,1	81,4	79,1	76,2	79,1	80,0	80,9	79,6	75,4	75,9	72,8	69,8
Alta voluntaria	7,0	6,7	8,8	8,6	8,5	7,5	7,4	5,3	6,7	8,6	7,8	8,5	8,2	7,0	8,5	8,2	9,4	9,9
Ingreso hospitalario	7,6	7,2	6,0	6,5	8,3	7,8	6,3	8,0	8,4	8,8	9,0	7,8	8,1	10,2	12,5	12,5	14,8	15,9
Muerte en urgencias	0,1	0,1	0,0	0,2	0,7	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Traslado a otro centro	4,8	4,1	3,9	3,9	3,7	5,4	4,0	5,3	5,7	6,3	4,1	3,7	2,8	3,2	3,6	3,3	2,9	4,2

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.4.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España*, 2014.

	Total	Según sexo		Según droga									
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Número de episodios	6.441	4.857	1.580	2.651	2.349	2.154	1.124	623	524	464	274	150	17
Edad media (años)	33,2	33,6	32,0	34,4	34,3	29,9	35,6	38,5	30,7	39,7	27,6	28,6	31,2
Sexo (% mujeres)	24,5	–	–	23,1	23,7	21,9	27,7	15,4	24,5	21,8	29,6	25,3	58,8
Detenidos (%)	4,3	4,8	2,6	5,0	3,7	4,6	5,6	5,6	2,3	6,9	1,8	10,8	17,6
Resolución de la urgencia (%)													
Alta médica	69,8	69,8	70,2	70,3	72,5	69,2	67,6	60,5	74,3	66,2	79,1	59,2	66,7
Alta voluntaria	9,9	10,1	9,1	9,2	11,1	6,7	9,9	12,8	10,6	8,8	12,6	12,3	6,7
Ingreso hospitalario	15,9	16,1	15,7	15,7	13,9	20,2	17,0	18,8	10,8	20,0	5,3	16,2	26,7
Muerte en urgencias	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro	4,2	4,0	4,8	4,6	2,5	3,9	5,5	7,9	4,4	4,7	2,9	12,3	0,0

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.5.

Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España*, 2014.

Vía de administración	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	Éxtasis y der.	Alucinógenos
Oral	2,3	5,3	98,8	1,5	71,9	89,3	95,3	37,1
Pulmonar o esnifada	10,4	93,5	0,8	25,7	4,5	1,8	1,6	2,2
Intranasal o esnifada	72,7	0,7	0,2	5,2	21,9	0,0	2,4	16,9
Parenteral o inyectada	14,4	0,2	0,2	67,7	1,7	7,7	0,8	43,8
Otra vía	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.6.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según sexo. España*, 2014.


	Total	Hombres	Mujeres
Cocaína	43,7	44,4	41,3
Alcohol	38,7	39,1	37,5
Cannabis	35,5	36,7	31,8
Hipnosedantes	18,5	17,7	21,0
Heroína	10,3	11,5	6,5
Anfetaminas	8,6	8,6	8,6
Otros opioides	7,6	7,9	6,8
MDMA y derivados	4,5	4,2	5,5
Otras sustancias	2,6	2,1	4,0
Alucinógenos	2,5	2,4	2,6
Inhalables volátiles	0,3	0,2	0,7

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.7.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según tipo de sustancia psicoactiva (total, hombres y mujeres). España*, 2014.



	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y der.	Otras sust.	Alucinógenos	I. volátiles
Total	43,7	38,7	35,5	18,5	10,3	8,6	7,6	4,5	2,6	2,5	0,3
Hombres	44,4	39,1	36,7	17,7	11,5	8,6	7,9	4,2	2,1	2,4	0,2
Mujeres	41,3	37,5	31,8	21,0	6,5	8,6	6,8	5,5	4,0	2,6	0,7


* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1999-2014

2.3.1.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según diferentes fuentes de información. España, 1983-2014.



	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Estimación nacional	266	440	453	516	741	1.067	1.440	1.440	1.833	1.760	1.399	1.067	1.051	1.310	1.127	1.049
Seis ciudades españolas	82	139	143	163	234	337	455	455	579	558	444	388	395	421	339	306
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Estimación nacional	972	1.012	923	1.079	900	796	1.004	820	703	773	739	706	736	707	727	767
Seis ciudades españolas	291	284	268	229	270	212	242	218	188	139	181	182	181	195	196	556
Indicador mortalidad	-	444	496	496	493	468	455	428	475	424	438	517	453	519	489	172
INE	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	393	361	383	403	455

1. Datos elaborados por el Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) a partir de datos del registro General de Mortalidad. Instituto de Estadística.
2. Selección de seis ciudades correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Fuente: Indicador Mortalidad. Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
3. Comunidades Autónomas que declaran al Indicador mortalidad (50% de la población de España).
Hasta 1995, sólo se recogían las muertes por reacción aguda a opioides o cocaína.
FUENTE: Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT).

2.3.2.

Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España*, 2003-2014.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Número de fallecidos	493	468	455	428	475	424	438	517	453**	519	489	556
Sexo (%)												
Varones	85,3	83,9	86,3	84,3	87,4	85,6	84,5	83,9	82,1	85,7	80,7	80,9
Mujeres	14,7	16,1	13,7	15,7	12,6	14,4	15,5	16,1	17,9	14,3	19,3	19,1
Edad media (años)	35,3	37,0	36,1	37,2	38,2	38,1	38,3	39,8	40,2	42	42,7	44,3
Grupo de edad (años)												
15-19	0,8	1,3	1,4	0,9	0,6	1,9	0,7	0,4	1,2	0,4	0,2	0,7
20-24	6,7	4,1	6,2	4,2	4,3	6,1	6,4	2,5	5,0	2,9	1,4	1,5
25-29	14,6	11,9	11,2	12,9	9,7	10,6	8,0	7,9	6,0	6,7	7,6	4,7
30-34	22,6	20,5	20,0	18,0	17,6	16,3	17,4	12,4	12,2	11,6	13,1	10,4
35-39	28,2	27,9	28,9	23,8	24,1	22,2	18,9	25,5	19,9	15,8	15,7	13,8
40-44	16,9	19,2	20,7	21,3	22,2	19,8	24,9	24,8	21,4	22,4	19,6	17,7
>= 45	10,2	15,1	11,6	18,9	21,5	23,1	23,7	26,5	34,0	40,3	42,3	51,2
Estado civil (%)												
Soltero	69,4	68,9	68,7	72,0	62,8	61,4	67,3	61,0	63,6	65,4	61,3	59,3
Casado	19,0	15,6	16,4	12,2	19,1	16,8	15,4	21,6	18,2	20,7	18,9	14,5
Separado/Divorciado	10,5	14,4	13,7	13,6	17,4	18,9	15,0	15,9	16,2	12,8	18,9	23,1
Viudo	1,0	1,1	1,1	2,2	0,7	2,9	2,3	1,5	2,0	1,1	1,0	3,1
Procedencia del cadáver (%)												
Domicilio	54,5	55,2	58,1	52,3	60,6	60,0	61,9	64,3	68,6	69,6	71,7	74,4
Hotel-Pensión	5,3	5,1	6,2	5,8	4,6	3,9	5,9	4,3	2,8	2,0	2,1	2,4
Calle	18,5	17,4	13,5	20,1	13,1	15,8	11,8	14,0	11,1	12,3	9,1	10,1
Local público	1,8	1,3	2,5	4,8	2,4	1,7	2,8	2,6	2,6	1,2	2,5	0,9
Hospital	10,6	9,5	6,4	7,7	5,7	6,8	6,1	3,9	5,1	5,6	5,6	5,5
Cárcel	1,1	3,5	4,8	3,9	3,7	4,9	4,0	3,7	4,9	4,0	3,1	1,5
Otra	8,2	8,1	8,5	5,3	9,8	7,0	7,3	7,1	4,9	5,4	6,0	5,1
Evidencias de consumo reciente (%)												
Sí	85,6	92,6	94,4	92,4	85,3	89,0	90,4	77,4	89,9	76,6	85,8	81,8
No	14,4	7,4	5,6	7,6	14,7	11,0	9,6	22,6	10,1	23,4	14,2	18,2
Evidencia de suicidio (%)												
Sí	12,1	8,8	5,7	10,8	8,8	9,0	8,5	9,7	12,4	8,1	11,1	20,3
No	87,9	91,2	94,3	89,2	91,2	91,0	91,5	90,3	87,6	91,9	88,9	79,7
Signos recientes venopunción (%)												
Sí	53,3	43,0	51,7	40,6	35,2	35,4	39,2	29,6	16,3	14,9	16,2	12,5
No	46,7	57,0	48,3	59,4	64,8	64,6	60,8	70,4	83,7	85,1	83,8	87,5
Muerte causada por patología previa agravada por el consumo de sustancias psicoactivas (%)												
Sí	35,4	32,6	35,5	28,6	20,4	26,6	30,9	31,4	37,2	37,4	36,0	35,4
No	64,6	67,4	64,5	71,4	79,6	73,4	69,1	68,6	62,8	62,6	64,0	64,6
Anticuerpos anti-VIH (%)												
Positivo	42,7	40,6	42,8	36,9	37,4	40,7	41,1	34,4	39,2	37,8	31,5	27,2
Negativo	57,3	59,4	57,2	63,1	62,6	59,3	58,9	65,6	60,8	62,2	68,5	72,8


* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

** El número de fallecidos incluye 45 casos de Galicia de los que no se disponía de información desagregada por sustancias.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.3.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 1983-2014.



	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Opioides	98,0	98,8	93,9	100,0	92,4	96,6	94,8	96,0	93,1	94,9	92,8	92,9	93,4	90,4	89,8	90,1
Cocaína	2,0	12,5	11,0	11,5	19,3	18,4	29,6	24,8	21,6	26,0	30,9	28,8	24,7	32,7	41,4	51,2
Hipnosedantes	13,7	22,5	41,5	46,0	33,8	40,2	43,8	47,4	37,2	37,9	37,4	48,4	54,8	47,7	58,6	47,4
Anfetaminas	–	–	–	–	–	–	–	1,0	2,9	3,8	3,2	4,3	4,9	4,0	8,6	2,8
Cannabis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	12,2	11,3
Éxtasis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	1,5	0,0
Alcohol	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27,7	28,6	26,2
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Opioides	88,0	89,4	86,8	83,8	76,7	74,9	78,2	78,7	72,8	77,7	79,8	79,1	77,9	76,6	77,3	64,0
Cocaína	63,3	54,4	51,7	54,2	62,2	60,1	69,2	60,0	67,0	60,2	59,1	57,3	52,2	58,6	54,1	51,7
Hipnosedantes	48,8	58,5	55,2	54,0	48,0	48,7	54,1	50,7	46,9	45,1	42,2	58,4	65,0	63,2	62,8	65,8
Anfetaminas	4,5	6,9	3,4	2,9	3,1	2,6	2,6	3,6	3,6	2,2	3,5	1,5	4,7	3,8	6,2	7,9
Cannabis	14,3	15,2	18,7	20,0	16,7	16,7	20,9	16,8	14,6	15,6	22,8	23,8	24,5	22,4	21,6	16,5
Éxtasis	1,8	1,6	1,5	2,5	1,6	1,9	0,4	1,7	1,1	1,4	1,1	0,8	1,7	1,7	1,1	3,5
Alcohol	30,5	35,5	35,3	42,5	39,0	35,8	33,0	34,3	27,8	25,9	28,8	28,8	33,3	28,9	31,2	40,8

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.4.

Número y proporción (%) de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 2003-2014.

	2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opioides	376	76,7	349	74,9	356	78,2	338	78,7	340	72,8	324	77,7
Cocaína	305	62,2	280	60,1	315	69,2	250	60,0	313	67,0	251	60,2
Barbitúricos	1	0,2	2	0,4	5	1,1	4	1,0	0	0,0	0	0,0
Benzodiazepinas	234	47,8	225	48,3	241	53,0	203	48,7	212	45,4	186	44,6
Anfetaminas	15	3,1	12	2,6	12	2,6	15	3,6	17	3,6	9	2,2
MDMA y derivados	8	1,6	9	1,9	2	0,4	7	1,7	5	1,1	6	1,4
Cannabis	82	16,7	78	16,7	95	20,9	70	16,8	68	14,6	65	15,6
Alucinógenos	2	0,4	5	1,1	0	0,0	1	0,2	2	0,4	3	0,7
S. volátiles	0	0,0	0	0,0	1	0,2	1	0,2	7	1,5	0	0,0
Alcohol	191	39,0	167	35,8	150	33,0	143	34,3	130	27,8	108	25,9
Casos analizados	490	100,0	466	100,0	455	100,0	428	100,0	475	100,0	424	100,0
	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opioides	346	81,0	409	79,1	318	78,1	366	76,6	337	77,3	333	64,0
Cocaína	247	57,8	297	57,4	213	52,3	280	58,6	236	54,1	269	51,7
Barbitúricos	2	0,5	2	0,4	4	1,0	2	0,4	6	1,4	1	0,2
Benzodiazepinas	180	42,2	292	56,5	258	63,4	291	60,9	265	60,8	327	62,9
Anfetaminas	13	3,0	8	1,5	19	4,7	18	3,8	27	6,2	41	7,9
MDMA y derivados	4	0,9	4	0,8	7	1,7	8	1,7	5	1,1	18	3,5
Cannabis	88	20,6	123	23,8	100	24,6	107	22,4	94	21,6	86	16,5
Alucinógenos	0	0,0	2	0,4	2	0,5	3	0,6	1	0,2	2	0,4
S. volátiles	0	0,0	0	0,0	3	0,7	0	0,0	1	20,0	6	1,2
Alcohol	120	28,1	149	28,8	136	33,4	138	28,9	136	31,2	212	40,8
Casos analizados	427	97,5	517	100,0	408**	100,0	478	92,1	437	89,4	520	92,1


* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

** 45 casos de Galicia sin información.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.5.

Porcentaje de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España*, 1983-2014.




	Cocaína y no opioides	Sólo cocaína	Cocaína y alcohol		Cocaína y no opioides	Sólo cocaína	Cocaína y alcohol
1983	0,0	0,0	-	1999	8,8	4,1	-
1984	0,0	0,0	-	2000	6,1	2,9	-
1985	2,1	0,7	-	2001	7,9	3,2	-
1986	0,0	0,0	-	2002	11,3	2,6	-
1987	1,7	0,9	-	2003	16,4	7,5	-
1988	0,9	0,0	-	2004	15,0	6,8	-
1989	1,8	1,3	-	2005	20,6	6,8	4,1
1990	0,4	0,0	-	2006	18,5	4,7	3,7
1991	1,0	0,0	-	2007	25,1	7,8	2,9
1992	0,6	0,4	-	2008	19,3	6,4	4,0
1993	3,3	1,2	-	2009	16,4	5,4	4,7
1994	2,8	0,6	-	2010	18,2	5,8	2,1
1995	3,5	1,2	-	2011	17,1	3,4	4,6
1996	3,9	2,3	-	2012	19,9	7,1	7,6
1997	5,5	2,4	-	2013	19,7	3,8	3,2
1998	7,3	3,1	-	2014	17,7	4,6	3,5

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.6.

Porcentajes de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (opioides y no cocaína, sólo opioides, opioides con benzodiacepinas (BZD) y/o alcohol). España*, 1983-2014.



	Opioides y no cocaína	Sólo opioides	Opioides, BZD y/o alcohol		Opioides y no cocaína	Sólo opioides	Opioides, BZD y/o alcohol
1983	59,8	46,3	-	1999	31,5	7,6	-
1984	49,6	28,1	-	2000	40,3	9,2	-
1985	49,7	25,2	-	2001	41,7	8,7	-
1986	49,2	20,2	-	2002	40,5	7,1	-
1987	47,0	23,9	-	2003	30,8	5,9	-
1988	42,4	20,8	-	2004	29,7	6,4	-
1989	35,2	14,1	-	2005	26,6	4,1	16,9
1990	46,6	20,6	-	2006	36,8	4,7	17,6
1991	31,3	11,5	-	2007	30,7	7,8	14,5
1992	35,4	14,2	-	2008	34,3	7,0	15,3
1993	44,0	18,1	-	2009	37,8	7,5	13,9
1994	55,8	13,1	-	2010	39,8	6,3	16,0
1995	59,8	9,0	-	2011	42,9	4,4	16,9
1996	55,1	17,7	-	2012	37,9	2,7	24,3
1997	45,4	12,6	-	2013	42,8	4,6	29,3
1998	41,7	10,8	-	2014	30,0	3,1	12,3

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.7.

Porcentajes de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (metadona, sólo metadona, metadona y no otro opioide, sólo metadona y benzodiazepinas). España*, 1996-2014.


Año	Sólo metadona	Metadona	Metadona y no otro opioide	Sólo metadona y benzodiazepinas
1996	1,5	–	–	–
1997	0,9	–	–	–
1998	0,9	–	–	–
1999	0,4	–	–	–
2000	1,2	–	–	–
2001	2,7	–	–	–
2002	1,8	–	–	–
2003	0,6	–	–	–
2004	0,4	–	–	–
2005	0,6	36,5	15,1	3,0
2006	2,8	39,8	27,4	3,3
2007	4,2	37,5	24,4	4,8
2008	2,4	30,0	20,6	4,2
2009	2,6	32,4	21,9	3,2
2010	2,7	47,4	30,7	4,6
2011	2,2	49,7	34,6	5,9
2012	1,1	52,2	40,2	5,9
2013	2,1	47,8	34,8	4,6
2014	1,5	36,9	20,0	2,1

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.8.

Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según sexo (Registro de Mortalidad del INE). España, 1999-2014.




	Hombres	Mujeres	Total
1999	657	95	752
2000	610	81	691
2001	558	92	650
2002	564	88	652
2003	552	81	633
2004	568	91	659
2005	539	97	636
2006	417	72	489
2007	462	57	519
2008	470	70	540
2009	366	76	442
2010	330	63	393
2011	291	70	361
2012	324	59	383
2013	333	70	403
2014	376	79	455

Nota: Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.9.

Evolución del número de muertes por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según edad. España, 1999-2014.



	< 35 años	≥ 35 años	Total
1999	505	247	752
2000	429	262	691
2001	391	259	650
2002	349	303	652
2003	310	323	633
2004	285	374	659
2005	262	374	636
2006	200	289	489
2007	192	327	519
2008	193	347	540
2009	141	301	442
2010	108	285	393
2011	101	260	361
2012	104	279	383
2013	93	310	403
2014	76	379	455

Nota: Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Información complementaria

Páginas web de interés

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

<http://www.msssi.gob.es/>

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

<http://www.pnsd.msssi.gob.es/>

Encuesta Nacional de Salud

<http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/>

MINISTERIO DEL INTERIOR

<http://www.interior.gob.es/>

Dirección General de Tráfico

<http://www.dgt.es/es/>

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

<http://www.minhap.gob.es/>

Comisionado para el Mercado de Tabacos

<http://www.cmtabacos.es/>

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

<http://www.mineco.gob.es/>

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

<http://www.isciii.es/>

OFICINAS DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD) UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)

<https://www.unodc.org/>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

<http://www.who.int/es/>

Abuso de sustancias psicoactivas. Management of Substance Abuse

http://www.who.int/substance_abuse/en/

OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS
EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUGS ADDICTION (EMCDDA)

<http://www.emcdda.europa.eu/>

ENCUESTA ESCOLAR EUROPEA SOBRE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (ESPAD)
THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (ESPAD)

<http://www.espad.org/>

REDUCING ALCOHOL RELATED HARMS (RARHA)

<http://www.rarha.eu/>

CONDUCTAS DE SALUD EN NIÑOS (HBSC)
HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC)

<http://www.hbsc.org/>

COMISIÓN EUROPEA. EUROBARÓMETRO
EUROPEAN COMMISSION. EUROBAROMETER

http://ec.europa.eu/public_opinion/