

# ESTADÍSTICAS 2018

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE SERVICIOS SOCIALES

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  
PARA EL PLAN NACIONAL  
SOBRE DROGAS

## GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Elena ÁLVAREZ. Begoña BRIME. Noelia LLORENS. Marta MOLINA. Eva SÁNCHEZ. Rosario SENDINO.

## RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

### Andalucía

Fernando ARENAS

Mercedes SUÁREZ

Rosario BALLESTA

Izaskun BILBAO

### Aragón

Carmen BARANGUAN

Laura JOSÉ

### Asturias

José Ramón HEVIA

José Antonio GONZÁLEZ

### Baleares

Juana VANRELL

Francisca BIBILONI

Rut SUÁREZ

### Canarias

Luz Marina MORENO

Nicolás AMADOR

### Cantabria

Ángela HIGUERA

Antonia RUEDA

Carmen DIEGO

### Castilla-La Mancha

Carmen DE PEDRO

Carlos ALONSO

### Castilla y León

Ana SÁNCHEZ

Susana REDONDO

Alexander VELÁZQUEZ

### Cataluña

Xavier MAJO

M. Teresa BRUGAL

Regina MUÑOZ

### Extremadura

Antonia María VAS

Mª Pilar MORCILLO

### Galicia

Sergio VEIGA

Jaime FRAGA

Sara CERDEIRA

María TAJES

### Madrid

Ana RUIZ

Mª Angeles GUTIÉRREZ

### Murcia

Juan Francisco CORREA

Mónica BALLESTA

M Dolores CHIRLAQUE

### Navarra

Miguel MARTÍNEZ

Raquel GONZÁLEZ

### País Vasco

Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

### La Rioja

Cristina NUEZ

### Comunidad Valenciana

Mª Jesús MATEU

Francisco VERDÚ

Julia CALABUIG

### Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA

### Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO

## AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las Comunidades Autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ministerio del Interior.
- Comisionado para el Mercado de Tabacos. Ministerio de Hacienda.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.
- Integrantes del Sistema Español de Alerta Temprana, entre los que se incluyen el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales, el Instituto de Toxicología del Ministerio de Defensa, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Centro del Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Plan Nacional sobre Sida, el Centro Nacional de Epidemiología, responsables en las diferentes Comunidades y Ciudades autónomas y Organizaciones No Gubernamentales, especialmente Energy Control, Ai Laket y Cruz Roja Española.

## INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES (OEDA)

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid

Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08

Correo electrónico: cendocupnd@mscbs.es

Internet: <http://www.pnsd.mscbs.gob.es/>

## EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL  
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES  
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 680-18-111-2

*Para poder prevenir y tratar de manera eficaz las adicciones debemos, en primer lugar, conocerlas. Para ello, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas cuenta con sistemas de información, de reconocido prestigio, que son imprescindibles para planificar nuestras acciones y el diseño de Estrategias y Planes de Acción conforme a las evidencias.*

*Desde el año 1985, trabajamos en actividades de recogida y análisis de datos, disponiendo de uno de los repositorios de información más consistentes entre los países de nuestro entorno. En 1998 se dio un paso más en la sistematización de la información con la creación de la Unidad de Sistemas de Información y Documentación, en la que se enmarca el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones que es, desde entonces, quien se encarga de realizar las encuestas necesarias, recopilar los datos, depurar y estructurar la información de carácter estadístico y epidemiológico y elaborar los informes anuales.*

*El informe que aquí se presenta, incorpora por una parte los resultados pormenorizados de la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) de 2016 y, por otra parte los indicadores de: Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas y relacionada con drogas y el indicador de Infecciones en consumidores de drogas.*

*Los Informes y Estadísticas anuales del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, suponen la mejor herramienta para lograr que las partes implicadas, y la sociedad en definitiva, tengan un conocimiento veraz de la situación y evolución de los fenómenos que nos rodean en este ámbito y se constituyen como uno de los instrumentos más valiosos con los que contamos para el correcto desarrollo de políticas en el ámbito de las adicciones en nuestro país.*

*Quiero terminar felicitando a todos los que han hecho posible este informe, resultado del trabajo conjunto de los profesionales de los diferentes departamentos de la Administración Central, Comunidades Autónomas y entidades del tercer sector y, en especial, al equipo del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, por el gran trabajo realizado.*

María Azucena Martí Palacios  
Delegada del Gobierno para el  
Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones

ESTADÍSTICAS 2018

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

# ÍNDICE

Presentación .....	3
Introducción .....	30
<b>1. Consumo, percepciones y opiniones ante las drogas</b> .....	<b>31</b>
1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2017 .....	32
1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2016 ..	33
<b>Metodología: tamaño muestra</b>	
1.2.1. Error muestral de la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de $p = q = 0,5$ ) España, 2016 .....	33
1.2.2. Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2016 .....	34
1.2.3. Distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1996-2016 .....	35
1.2.4. Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2016 .....	36
1.2.5. Evolución del tamaño de la muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016 .....	37
1.2.6. Evolución del tamaño de la muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016 .....	37
<b>Prevalencia de consumo de drogas 1995-2016: evolución temporal. Edad y sexo</b>	
1.2.7. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 .....	38
1.2.8. Prevalencia de consumo de drogas y situaciones de riesgo relacionadas con el consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 .....	40
1.2.9. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 .....	42
1.2.10. Prevalencia de consumo diario de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 .....	44
1.2.11. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 .....	44

1.2.12.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	45
1.2.13.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	46
1.2.14.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	47
1.2.15.	Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	47
1.2.16.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	48
1.2.17.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	48
1.2.18.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	49
1.2.19.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	49
1.2.20.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016 . . . . .	50
1.2.21.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016 . . . . .	50
1.2.22.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016 . . . . .	51
1.2.23.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016 . . . . .	52
1.2.24.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	52
1.2.25.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	53
1.2.26.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	53
1.2.27.	Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	54
1.2.28.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016 . . . . .	54
1.2.29.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016 . . . . .	55
1.2.30.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016 . . . . .	55
1.2.31.	Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	56
1.2.32.	Edad media de inicio (años) en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 2016 . . . . .	56
1.2.33.	Evolución de la edad media de inicio (años) en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016 . . . . .	57
1.2.34.	Evolución de la edad media de inicio (años) en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2016 . . . . .	58

## Incidencia del consumo de drogas

---

1.2.35.	Incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	59
1.2.36.	Incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2016 . . . . .	59

## Prevalencia de consumo de drogas 2016: Comunidad/Ciudad Autónoma

---

1.2.37.	Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	60
1.2.38.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	61
1.2.39.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	62
1.2.40.	Prevalencia de binge drinking entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	63
1.2.41.	Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	64
1.2.42.	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	65
1.2.43.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes (con o sin receta) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	66
1.2.44.	Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	67
1.2.45.	Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	68
1.2.46.	Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según cómo estén informados respecto al tema de las drogas (%). España, 2016 . . . . .	69
1.2.47.	Valoración (algo o muy importante) de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016 . . . . .	70
1.2.48.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	71
1.2.49.	Prevalencia de consumo de tabaco a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	72
1.2.50.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	73
1.2.51.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	74
1.2.52.	Prevalencias de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	75
1.2.53.	Prevalencias de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . . . .	76

1.2.54.	Prevalencias de hipnosedantes (con o sin receta) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . .	77
1.2.55.	Dinero disponible a la semana para gastos personales por término medio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (euros). España, 2016	78
1.2.56.	Valoración de la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016 . . . . .	79
1.2.57.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . .	80

## Bebidas alcohólicas

1.2.58.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo semanal, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	81
1.2.59.	Prevalencia de consumo diario de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	81
1.2.60.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo habitual y disponibilidad percibida de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	82
1.2.61.	Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (%). España, 2016 . . . . .	82
1.2.62.	Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida y edad (%). España, 2016 . . . . .	83
1.2.63.	Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días según edad y sexo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	83
1.2.64.	Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida tanto en fin de semana como en días laborables, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	84
1.2.65.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 1994-2016 . . . . .	84
1.2.66.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según edad y sexo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	85
1.2.67.	Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	85
1.2.68.	Consumo de riesgo de alcohol de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han informado sobre el tipo de bebidas consumidas en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	85
1.2.69.	Prevalencias de consumo de riesgo de bebidas alcohólicas según equivalencias de alcohol por tipo de bebida en centímetros cúbicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking o botellón en los últimos 30 días (%). España, 2016 . . . . .	86
1.2.70.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2016 . . . . .	86

1.2.71.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida, tanto en fin de semana como en días laborables, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016	87
1.2.72.	Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016	87
1.2.73.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016	88
1.2.74.	Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016	89
1.2.75.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016	89
1.2.76.	Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016	90
1.2.77.	Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016	90
1.2.78.	Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016	91
1.2.79.	Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016	91
1.2.80.	Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016	92
1.2.81.	Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016	92
1.2.82.	Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido o no alguna sustancia psicoactiva, según sexo (%). España, 2016	93
1.2.83.	Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido o no alguna sustancia psicoactiva, según edad (%). España, 2016	93
1.2.84.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, por sexo y edad (%). España, 2016	94
1.2.85.	Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2016	94
1.2.86.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según edad y sexo. España, 1994-2016	95
1.2.87.	Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	96

1.2.88.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2016	96
1.2.89.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas algún fin de semana (1, 2 o 3), todos los fines de semana, algún día laborable (1, 2 o 3 por semana) y todos los días laborables en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	97
1.2.90.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2016	97
1.2.91.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2016	98
1.2.92.	Evolución de la prevalencia de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en días laborables y fines de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1996-2016	99
1.2.93.	Evolución de la prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2008-2016	100
1.2.94.	Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016	100
1.2.95.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	101
1.2.96.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado alguna vez en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España, 2016	101
1.2.97.	Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016	102
1.2.98.	Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016	102
1.2.99.	Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016	103
1.2.100.	Lugares donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016	103
1.2.101.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	103
1.2.102.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	104
1.2.103.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses, de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2016	104
1.2.104.	Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2016	105
1.2.105.	Percepción del consumo de alcohol del padre y de la madre que tienen los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016	105

## Bebidas energéticas

---

- 1.2.106. Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . . 106
- 1.2.107. Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2016 . . . 106

## Tabaco

---

- 1.2.108. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . . 107
- 1.2.109. Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . . 107
- 1.2.110. Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que afirman que en sus casas alguna de las personas con las que conviven o comparten casa fuman diariamente. España, 1994-2016 . . . . . 108
- 1.2.111. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de un paquete diario de tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que puede causar bastantes o muchos problemas) y prevalencia del consumo diario de tabaco. España, 1994-2016 . . . . . 108
- 1.2.112. Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco y el riesgo percibido (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . . 109
- 1.2.113. Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . . 109
- 1.2.114. Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, por edad (%). España, 2016 . . . . . 110
- 1.2.115. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2016 . . . . . 110
- 1.2.116. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2016 . . . . . 111
- 1.2.117. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2016 . . . . . 111
- 1.2.118. Media de cigarrillos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016 . . . . . 112
- 1.2.119. Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . . 112
- 1.2.120. Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016 . . . . . 113
- 1.2.121. Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . . 113
- 1.2.122. Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . . 114
- 1.2.123. Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2016 . . . . . 114

1.2.124. Porcentaje de estudiantes que han visto fumar a profesores, a estudiantes o a otras personas dentro del recinto del centro educativo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según titularidad del centro y tipo de estudios (%). España, 2016	114
1.2.125. Porcentaje de estudiantes cuyos padres u otros familiares con los que convive fuman a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según fumen o no (%). España, 2016	115
1.2.126. Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia con la que fumen (%). España, 2016	115

### Cigarrillos electrónicos

1.2.127. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	116
1.2.128. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no (%). España, 2016	116
1.2.129. Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no (%). España, 2016	117
1.2.130. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de cigarrillos electrónicos y de cannabis (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2016	117
1.2.131. Disponibilidad percibida del tabaco y del cannabis entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2016	117

### Consumo por tipo de drogas: hipnosedantes

1.2.132. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	118
1.2.133. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	118
1.2.134. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	119
1.2.135. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	119
1.2.136. Continuidad en el consumo de hipnosedantes sin receta en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	120
1.2.137. Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	120
1.2.138. Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016	121
1.2.139. Prevalencias de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	121

1.2.140.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) y edad media de inicio del consumo. España, 1994-2016 . . . . .	122
1.2.141.	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	122
1.2.142.	Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	123
1.2.143.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días y de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016 . . . . .	123
1.2.144.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	124
1.2.145.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	124
1.2.146.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	125
1.2.147.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	125
1.2.148.	Continuidad en el consumo de cannabis en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	126
1.2.149.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	126
1.2.150.	Características generales del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	127
1.2.151.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2016 . . . . .	127
1.2.152.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2016 . . . . .	128
1.2.153.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4), según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	128
1.2.154.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis o no (%). España, 2016 . . . . .	129
1.2.155.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	129
1.2.156.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4), según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	129
1.2.157.	Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis o no (%). España, 2016 . . . . .	130
1.2.158.	Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y 30 días (%). España, 2016 . . . . .	130
1.2.159.	Evolución de la distribución en el orden de las edades de inicio en el consumo de cannabis y tabaco (%). España, 2002-2016 . . . . .	130

1.2.160.	Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías? Respuesta entre los que no la han probado nunca de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016	131
1.2.161.	Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana, lo probarían los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	131
1.2.162.	Consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la posible legalidad del consumo de hachís o marihuana (%). España, 2016	132
1.2.163.	Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016	132
1.2.164.	Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2016	133
1.2.165.	Evolución de la prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST $\geq 4$ ) entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2016	133
1.2.166.	Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2016	134
1.2.167.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST $\geq 4$ ) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2006-2016	135
1.2.168.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST $\geq 4$ ) en la población de 14-18 años (% y estimación). España, 2006-2016	135
1.2.169.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses, binge drinking, intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días y policonsumo en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016	136
1.2.170.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016	136
1.2.171.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016	137
1.2.172.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016	137
1.2.173.	Características de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST $\geq 4$ ) de la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016	137
1.2.174.	Características de los consumidores de cannabis y de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST $\geq 4$ ) de la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2016	138

#### Consumo por tipo de drogas: cocaína

---

1.2.175.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016	139
1.2.176.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2016	139

1.2.177. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	140
1.2.178. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	140
1.2.179. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	141
1.2.180. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	141
1.2.181. Continuidad en el consumo de cocaína polvo y/o base en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	142
1.2.182. Incidencia del consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	142
1.2.183. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante el consumo habitual de cocaína polvo y de la disponibilidad de cocaína polvo percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	143
1.2.184. Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo o base) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	143
1.2.185. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016 . . . . .	144
1.2.186. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016 . . . . .	144
1.2.187. Características del consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	145
1.2.188. Prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	145
1.2.189. Prevalencia de consumo de cocaína base en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	146
1.2.190. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y /o base en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	146

#### Consumo por tipo de drogas: éxtasis

---

1.2.191. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	147
1.2.192. Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	147
1.2.193. Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	148
1.2.194. Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	148
1.2.195. Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	149
1.2.196. Características generales del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016 . . . . .	149

## Consumo por tipo de drogas: anfetaminas

---

1.2.197. Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	150
1.2.198. Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	150
1.2.199. Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	151
1.2.200. Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	151
1.2.201. Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	152
1.2.202. Características generales del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	152

## Consumo por tipo de drogas: alucinógenos y setas mágicas

---

1.2.203. Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	153
1.2.204. Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	153
1.2.205. Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	154
1.2.206. Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	154
1.2.207. Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	155
1.2.208. Evolución del consumo de alucinógenos y setas mágicas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	155
1.2.209. Evolución del consumo de alucinógenos y setas mágicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	156
1.2.210. Características generales del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	156
1.2.211. Evolución de la prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2016 . . . . .	157

## Consumo por tipo de drogas: heroína

---

1.2.212. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	157
1.2.213. Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2016 . . . . .	158
1.2.214. Prevalencia de consumo de heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	158
1.2.215. Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	159
1.2.216. Evolución de la percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la percepción de disponibilidad de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	159

1.2.217. Características generales del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	160
1.2.218. Evolución del consumo de heroína, alucinógenos, éxtasis, anfetaminas e inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	160
1.2.219. Evolución del consumo de heroína e inhalables volátiles alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	161
1.2.220. Evolución del consumo de heroína e inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . . . . .	161

#### Consumo por tipo de drogas: inhalables volátiles

---

1.2.221. Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 . .	162
1.2.222. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	162
1.2.223. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	163
1.2.224. Características generales del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	163

#### Consumo por tipo de drogas: GHB

---

1.2.225. Evolución de la prevalencia de consumo de GHB y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016 . . . . .	164
--	-----

#### Consumo por tipo de drogas: metanfetaminas

---

1.2.226. Evolución de la prevalencia de consumo de metanfetaminas y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2016 . . . . .	164
1.2.227. Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	165
1.2.228. Prevalencia de consumo de metanfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	165
1.2.229. Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	166
1.2.230. Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2010-2016 . . . . .	166

#### Consumo por tipo de drogas: esteroides anabolizantes

---

1.2.231. Evolución de la prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016 . .	167
1.2.232. Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	167
1.2.233. Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	168
1.2.234. Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	168

## Consumo por tipo de drogas: sustancias estimulantes para mejorar rendimiento en el estudio

---

1.2.235.	Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	169
1.2.236.	Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	169
1.2.237.	Frecuencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido estas sustancias (%). España, 2016 . . . . .	170
1.2.238.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras), binge drinking, tabaco, cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida (%). España, 2016 . . . . .	170
1.2.239.	Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes que han consumido dichas sustancias (%). España, 2016 . . . . .	171

## Consumo por tipo de drogas: nuevas sustancias

---

1.2.240.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	171
1.2.241.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	172
1.2.242.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	172
1.2.243.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 . . . . .	173
1.2.244.	Desconocimiento de los problemas de salud que conlleva el consumo de nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alguna vez en la vida alguna de las siguientes nuevas sustancias (%). España, 2016 . . . . .	173
1.2.245.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	174
1.2.246.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la hora de regreso a casa en la última salida (%). España, 2016 . . . . .	174
1.2.247.	Prevalencia de sustancias psicoactivas (nuevas sustancias frente a legales e ilegales) consumidas alguna vez en la vida, según la hora de regreso a casa en la última salida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	175
1.2.248.	Evolución de las prevalencias de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2016 . . . . .	175
1.2.249.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016 . . . . .	176
1.2.250.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016 . . . . .	177

1.2.251.	Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016 . . . . .	178
1.2.252.	Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias. España, 2016 . . . . .	178
1.2.253.	Prevalencia de consumo problemático de cannabis (puntuación CAST $\geq 4$ ) o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida o no (%). España, 2016 . . . . .	179
1.2.254.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), por sexo y edad (%). España, 2016 . . . . .	179
1.2.255.	Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2016 . . . . .	180
1.2.256.	Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2010-2016 . . . . .	180
1.2.257.	Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2010-2016 . . . . .	181
1.2.258.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de las siguientes nuevas sustancias psicoactivas, según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2016 . . . . .	181
1.2.259.	Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga). España, 2010-2016 . . . . .	182
1.2.260.	Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (%). España, 2010-2016 . . . . .	182
1.2.261.	Formas de conseguir nuevas sustancias en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2016 . .	183

#### Patrones de consumo de drogas: policonsumo

---

1.2.262.	Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	183
1.2.263.	Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	184
1.2.264.	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	184
1.2.265.	Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 . . . . .	184

1.2.266. Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016 . . . . .	185
1.2.267. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la edad (%). España, 2016 . . . . .	185
1.2.268. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	185
1.2.269. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016 . . . . .	186
1.2.270. Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína polvo y/o base, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2016 . . . . .	186
1.2.271. Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína polvo y/o base, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2016 . . . . .	187
1.2.272. Prevalencia de consumo de una, dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2016 . . . . .	187
1.2.273. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2016 . . . . .	188
1.2.274. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2016 . . . . .	188
1.2.275. Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016 . . . . .	189
1.2.276. Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016 . . . . .	190
1.2.277. Prevalencia de consumo conjunto de tabaco y cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2012-2016 . . . . .	191
1.2.278. Prevalencia de consumo conjunto de tabaco diario y cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2012-2016 . . . . .	192

#### Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

---

1.2.279. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2016 . . . . .	193
1.2.280. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de distintas drogas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2008-2016 . . . . .	194

1.2.281. Evolución del riesgo percibido del consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 . . . . .	195
1.2.282. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2016 . . . . .	195
1.2.283. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	196
1.2.284. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal (%). España, 2016 . . . . .	196
1.2.285. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal (%). España, 2016 . . . . .	197
1.2.286. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de hipnosedantes (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	197
1.2.287. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, o el consumo esporádico, una vez por al mes o menos frecuentemente puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan hecho binge drinking o se hayan emborrachado en los últimos 30 días y según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016 . . . . .	198
1.2.288. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2016 . . . . .	199
1.2.289. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan consumido alguna vez cada sustancia o no (%). España, 2016 . . . . .	199

#### Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad

---

1.2.290. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2016 . . . . .	200
1.2.291. Evolución de la disponibilidad de cocaína polvo y/o base percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2016 . . . . .	201
1.2.292. Evolución de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2016 . . . . .	201
1.2.293. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (%). España, 2008-2016 . . . . .	202

1.2.294.	Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas (%). España, 2016 . . . . .	202
1.2.295.	Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas entre los estudiantes que han consumido estas drogas alguna vez (%). España, 2016 . . . . .	203
1.2.296.	Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2016 . . . . .	203
1.2.297.	Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) y % de respuesta Ns/Nc entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2016 . . . . .	204

#### **Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: información/formación sobre drogas**

---

1.2.298.	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según edad y sexo (%). España, 2016 . .	204
1.2.299.	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según edad y sexo (%). España, 2016 . .	205
1.2.300.	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal y según edad (%). España, 2016 . . . . .	205
1.2.301.	Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no cannabis y según edad (%). España, 2016 . . . . .	206
1.2.302.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han recibido formación en su centro educativo o en su familia sobre el consumo de drogas y los problemas asociados, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	206
1.2.303.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y otras adicciones, según el tipo de información recibida y según edad y sexo. (%). España, 2016 . . . . .	207
1.2.304.	Prevalencia de consumo de sustancias legales e ilegales alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la formación que han recibido en su centro educativo sobre el consumo de drogas y otras adicciones (%). España, 2016 . . . . .	207

#### **Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas**

---

1.2.305.	Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad y sexo (%). España, 2012-2016 . . . . .	208
1.2.306.	Evolución de la valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016 . . . . .	208
1.2.307.	Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . .	209
1.2.308.	Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	209

## Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: relación con sus iguales

---

1.2.309. Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (%). España, 2006-2016 . . . . .	210
1.2.310. Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016 . . . . .	210
1.2.311. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016 . . . . .	211
1.2.312. Prevalencia de consumo de cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016 . . . . .	211
1.2.313. Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016 . . . . .	212
1.2.314. Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales se emborrachan (últimos 30 días) (%). España, 2016 . . . . .	212
1.2.315. Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales hacen botellón (últimos 30 días) (%). España, 2016 . . . . .	213
1.2.316. Prevalencia de sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen este tipo de sustancias (alguna vez en la vida) (%). España, 2016 . . . . .	213

## Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: permisividad de los padres y relaciones familiares

---

1.2.317. Permisividad de los padres frente al consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2016 . . . . .	214
1.2.318. Permisividad de los padres frente al consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de tabaco que los estudiantes tengan (%). España, 2016 . . . . .	214
1.2.319. Permisividad de los padres frente al consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de bebidas alcohólicas que los estudiantes tengan (%). España, 2016 . . . . .	215
1.2.320. Permisividad de los padres frente al consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan (%). España, 2016 . . . . .	215
1.2.321. Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016 . . . . .	216
1.2.322. Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016 . . . . .	216
1.2.323. Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016 . . . . .	217
1.2.324. Percepción de tolerancia parental para consumir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido alcohol, se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking en los últimos 30 días o botellón en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	217

1.2.325. Prevalencia de las intoxicaciones etílicas agudas en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	218
1.2.326. Prevalencia del consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	218
1.2.327. Prevalencia del consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 . . . . .	219
1.2.328. Percepción de tolerancia parental para cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan (%). España, 2016 . . .	219

#### Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: internet, ocio

---

1.2.329. Frecuencia de uso de tablet como herramienta de trabajo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	220
1.2.330. Frecuencia de uso de internet en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	220
1.2.331. Frecuencia (días) de actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	221
1.2.332. Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	223
1.2.333. Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según las relaciones que mantienen los estudiantes con sus padres y las normas que ellos fijan (%). España, 2016 . . . . .	225
1.2.334. Tiempo dedicado, de media al día, en actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	227
1.2.335. Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	229
1.2.336. Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según las relaciones que mantienen los estudiantes con sus padres y las normas que ellos fijan (%). España, 2016 . . . . .	231

#### Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: salidas nocturnas y hora de regreso

---

1.2.337. Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	233
1.2.338. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	233
1.2.339. Prevalencia de binge drinking, intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	234
1.2.340. Evolución de la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016 . . . . .	235
1.2.341. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	236

1.2.342. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	236
1.2.343. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	237
1.2.344. Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	237
1.2.345. Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	238
1.2.346. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	238
1.2.347. Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	239
1.2.348. Prevalencia de consumo de cocaína en polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	239
1.2.349. Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 . . . . .	240
1.2.350. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según edad y sexo. (%). España, 2016 . . . . .	240
1.2.351. Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016 . . . . .	241
1.2.352. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 . . . . .	241
1.2.353. Prevalencia de binge drinking, inntoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 . . . . .	242
1.2.354. Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 . . . . .	242
1.2.355. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 . . . . .	243
1.2.356. Situaciones conflictivas experimentadas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 . . . . .	244

## Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: dinero disponible

1.2.357. Dinero disponible (euros) por término medio a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad. España, 2016 . . . . .	245
1.2.358. Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función del consumo de sustancias psicoactivas. España, 2016 . .	245
1.2.359. Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de si han faltado a clase y si han repetido curso. España, 2016 . . . . .	245

## Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: entorno escolar

1.2.360. Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2016 . . . . .	246
--	-----

## Consumo de sustancias psicoactivas: consecuencias negativas del consumo

1.2.361. Conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias psicoactivas y viajar como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 . . . . .	247
1.2.362. Situaciones que en los últimos 12 meses han experimentado los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2016 . . . . .	247

## 2. Problemas relacionados con las drogas 249

### 2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2016 . . . . . 250

#### Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo, hasta 2016

2.1.1. Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2016 . . . . .	250
2.1.2. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2016 . .	251
2.1.3. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1991-2016 . . . . .	252
2.1.4. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2016 . .	253
2.1.5. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2016 . . . . .	254
2.1.6. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2016 . . . . .	255
2.1.7. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2016 . .	255
2.1.8. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2016 . .	256
2.1.9. Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento). España, 1996-2016 . . . . .	257
2.1.10. Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez). España, 1996-2016 . . . . .	258
2.1.11. Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total tratados). España, 1987-2016 . . . . .	259

2.1.12.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2016 . . . . .	260
2.1.13.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (total tratados). España, 1987-2016 . . . . .	261
2.1.14.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2016 . . . . .	262
2.1.15.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016 . . . . .	263
2.1.16.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016 . . . . .	264
2.1.17.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016 . . . . .	265
2.1.18.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (en general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016 . . . . .	266
2.1.19.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2016 . . . . .	267
2.1.20.	Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2016 . .	268
2.1.21.	Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2016 . . . . .	269
2.1.22.	Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2016 . . . . .	270

**Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2016**

---

2.1.23.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2016 . . . . .	271
2.1.24.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). España, 2016 . . . . .	272
2.1.25.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). España, 2016 . . . . .	273
2.1.26.	Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016 . . . . .	274
2.1.27.	Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas ilegales, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2016 .	275
2.1.28.	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2013-2016 . . . . .	277
2.1.29.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2016 . . . . .	278
2.1.30.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2016 . . . . .	280

<b>2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2016 . . .</b>	<b>283</b>
2.2.1. Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según el tipo de droga. España, 1996-2016 . . . . .	283
2.2.2. Número total de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje de urgencias en el que aparece cada sustancia. España, 1996-2016. . . . .	284
2.2.3. Evolución de las características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España, 1996-2016 . . . . .	285
2.2.4. Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. Total, según sexo y según droga. España, 2016 . . . . .	285
2.2.5. Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias. España, 2016 . . . . .	286
2.2.6. Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas ilegales, según sexo. España, 2016 . . . . .	286
<b>2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2016 . . . . .</b>	<b>287</b>
2.3.1. Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2016 . . . . .	287
2.3.2. Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2016 . . . . .	288

**Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas y Registro General de Mortalidad**

---

2.3.3. Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 2003-2016 . . . . .	289
2.3.4. Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1983-2016 . . . . .	290
2.3.5. Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España, 2004-2016 . . . . .	291
2.3.6. Número de fallecidos en los que se detecta la metadona (independientemente de otras sustancias), metadona y no otro opioide y metadona sola. España, 2005-2016. . . . .	291
2.3.7. Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España, 1985-2016 . . . . .	292
2.3.8. Distribución de los fallecidos en los que se detecta cocaína en función de otras sustancias detectadas. España, 2016 . . . . .	292
2.3.9. Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detectan opioides (opioides y no cocaína, sólo opioides, opioides y cocaína). España, 1984-2016 . . . . .	293
2.3.10. Distribución de los fallecidos en los que se detectan opioides en función de otras sustancias detectadas. España, 2016 . . . . .	293
2.3.11. Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide —aunque haya otras sustancias—). España, 1996-2016 . . . . .	294
2.3.12. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo. España, 1999-2016 . . . . .	295
2.3.13. Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según edad. España, 1999-2016 . . . . .	295

2.3.14. Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de hipnosedantes. España, 2015-2016	296
2.3.15. Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de cannabis. España, 2015-2016	296
2.3.16. Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2016	297
2.3.17. Evolución de las edades de los fallecidos en 6 ciudades españolas. España, 2005-2016	297
2.3.18. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales (estimación nacional). España, 1983-2016	298
2.3.19. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 2000-2016	299

<b>Información complementaria</b>	<b>300</b>
-----------------------------------	------------

Páginas web de interés	301
------------------------	-----

# INTRODUCCIÓN

La función primordial del **Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)** es ofrecer una visión global de la evolución y características del consumo de sustancias psicoactivas (incluyendo alcohol, tabaco, hipnosedantes, drogas ilegales y nuevas sustancias), nuevas adicciones y los problemas asociados en España. Para ello se emplea información procedente de diversas fuentes que, una vez analizada y contextualizada, debería ayudar a responsables políticos, asociaciones, profesionales y consumidores a la hora de tomar decisiones sobre estas cuestiones en sus respectivos ámbitos.

Este documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Estadísticas 2018*, se publica junto con otro documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Informe 2018*, al que complementa con una selección de tablas y gráficos.

El presente documento se estructura en dos capítulos que se detallan a continuación:

En el **capítulo 1**, se presenta información relativa al consumo, percepciones y opiniones de la población ante las drogas desde 1994 hasta 2016. La fuente de información es la Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), en sus sucesivas ediciones. ESTUDES se realiza de forma bienal, y se promueve y financia directamente desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas contando con la estrecha colaboración de las Comunidades y Ciudades Autónomas.

En el presente documento no se incluye información de EDADES, ya que los últimos datos disponibles, al cierre de este informe, se corresponden al año 2015 y ya han sido publicados en el *Informe y Estadísticas 2017 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España*.

En el **capítulo 2**, se incluye información relativa a los problemas relacionados con las drogas desde 1987 hasta 2016. La información procede de tres indicadores clave: Indicador “Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas”, Indicador “Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas” e Indicador “Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas”, así como información relativa al consumo problemático de drogas e información relacionada con las infecciones en consumidores de drogas.

Los indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad se gestionan desde 1987 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas como una colaboración interinstitucional en el que tienen un papel muy activo las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como las instituciones de las que procede la información (centros de tratamiento de drogodependencias, hospitales, institutos de medicina legal, laboratorios toxicológicos, etc.). En algunos casos, los Ayuntamientos prestan también soporte a la recogida y depuración de la información. Los indicadores sobre infecciones y consumo problemático proceden de varias fuentes, pero fundamentalmente de la DGPNSD y de otras divisiones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

En la página web del Plan Nacional sobre Drogas pueden consultarse los informes que se han ido publicando periódicamente desde 1998.

<http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/home.htm>

Consumo,  
percepciones  
y opiniones  
ante las drogas



# 1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2017

En 2017, siguiendo con la serie de periodicidad bienal iniciada en 1995, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha llevado a cabo la duodécima edición de la Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES). Esta encuesta se realiza en todo el territorio nacional, en la población general residente en hogares (15-64 años), y se realiza en el domicilio. En 2017 la muestra fue de 21.249.

El objetivo general de la misma es conseguir información que permita diseñar, desarrollar y evaluar estrategias y políticas dirigidas a prevenir el consumo y a abordar las consecuencias negativas del uso de drogas, del mal uso de las tecnologías y de otras conductas relacionadas.

Los objetivos concretos y comunes a toda la serie de encuestas son conocer:

- La prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas y otras conductas relacionadas.
- Las características sociodemográficas de los consumidores.
- Los patrones de consumo de sustancias psicoactivas.
- La disponibilidad de drogas percibida por la población y el riesgo percibido ante diversas conductas de consumo.
- La visibilidad de los problemas de drogas en el lugar donde viven los encuestados.
- La opinión de la población acerca de la importancia de los problemas de drogas y las medidas para reducirlos.
- La evolución temporal (desde 1995) de los aspectos antes expuestos.

Los resultados de EDADES 2017 serán publicados en el próximo informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

La metodología y los resultados, hasta el año 2017, pueden consultarse en la página web del Plan Nacional sobre Drogas: [http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas\\_EDADES.htm](http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_EDADES.htm)

## 1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2016

### 1.2.1.

Error muestral de la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de  $p = q = 0,5$ ) España, 2016.

	Número de colegios			Número de alumnos			Error muestral ( $\pm$ )***
	DGPNSD*	Ampliación**	Tamaño final	DGPNSD*	Ampliación**	Tamaño final	
Andalucía	68	0	68	2.970	0	2.970	1,8%
Aragón	24	45	69	976	1.805	2.781	1,8%
Asturias	21	32	53	641	1.257	1.898	2,2%
Baleares	23	0	23	913	0	913	3,3%
Canarias	32	48	80	1.286	1.928	3.214	1,7%
Cantabria	17	32	49	573	1.286	1.859	2,2%
Castilla-La Mancha	33	20	53	1.319	814	2.133	2,1%
Castilla y León	32	0	32	1.220	0	1.220	2,8%
Cataluña	59	0	59	2.617	0	2.617	1,9%
C. Valenciana	48	38	86	1.945	1.557	3.502	1,7%
Extremadura	23	0	23	817	0	817	3,5%
Galicia	33	20	53	1.321	768	2.089	2,2%
Madrid	55	41	96	2.457	1.864	4.321	1,5%
Murcia	29	0	29	1.259	0	1.259	2,8%
Navarra	18	0	18	773	0	773	3,5%
País Vasco	33	0	33	1.286	0	1.286	2,8%
La Rioja	13	12	25	512	564	1.076	2,9%
Ceuta	6	1	7	192	127	319	5,3%
Melilla	6	1	7	322	0	322	5,3%
<b>Total España</b>	<b>573</b>	<b>290</b>	<b>863</b>	<b>23.399</b>	<b>11.970</b>	<b>35.369</b>	<b>0,5%</b>

\* Muestra financiada por la DGPNSD

\*\* Muestra financiada por las CCAA

\*\*\* Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y  $p=q=0,5$

FUENTES: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.2.

Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
CCAA												
Andalucía	471.794	462.498	439.486	402.840	361.512	363.862	326.571	304.858	350.592	345.073	296.955	307.453
Aragón	69.699	64.548	58.208	49.597	45.599	44.849	40.860	38.581	44.414	45.224	39.471	40.463
Asturias	73.467	67.094	59.379	48.271	42.232	39.752	33.888	28.534	32.598	32.381	26.746	27.234
Baleares	39.271	37.441	36.613	34.923	34.408	34.804	31.333	30.164	33.985	35.788	31.203	32.753
Canarias	113.256	110.955	111.340	96.577	87.248	85.592	74.244	68.929	78.902	81.402	67.994	73.074
Cantabria	36.909	34.734	311.64	26.253	23.666	22.473	19.609	17.583	20.366	19.980	16.536	17.541
Castilla y León	160.256	151.635	137.270	117.058	105.092	102.177	89.776	78.471	88.990	87.789	73.070	74.887
Castilla-La Mancha	90.837	89.425	85.693	79.729	77.727	78.397	73.297	69.538	79.848	81.315	69.444	71.507
Cataluña	384.125	354.024	310.815	262.519	248.490	248.973	236.139	234.395	264.590	275.946	250.522	249.005
C. Valenciana	251.506	234.037	215.858	190.873	178.801	177.602	160.648	154.174	176.955	180.461	153.623	161.202
Extremadura	57.224	59.242	58.622	54.160	51.426	50.791	46.757	41.203	45.254	44.111	38.292	38.332
Galicia	182.834	176.703	163.396	134.929	113.916	112.125	94.564	82.464	95.485	87.948	73.481	75.578
Madrid	347.417	322.791	292.702	251.754	229.324	231.045	207.926	191.834	224.210	227.068	199.999	211.462
Murcia	73.929	71.706	66.423	60.005	55.246	56.305	51.755	49.721	57.769	59.440	51.322	54.473
Navarra	32.758	30.589	26.977	22.174	21.103	20.626	19.640	19.061	22.096	22.524	21.251	21.858
Pais Vasco	151.581	136.827	112.596	90.058	82.048	78.790	67.592	63.000	72.145	72.410	64.174	68.202
La Rioja	17.809	16.224	14.249	11.940	10.928	10.723	9.755	9.080	10.567	10.976	9.628	10.262
Ceuta	3.379	3.565	3.724	3.611	3.303	3.433	2.797	2.680	3.224	3.209	2.715	3.230
Melilla	2.961	3.136	3.455	3.197	3.244	2.970	2.791	2.890	6.099	3.776	3.105	3.421
Titularidad del centro educativo												
Pública	1.911.828	1.769.080	1.626.084	1.362.588	1.225.988	1.241.521	1.093.906	1.004.590	1.154.668	1.189.700	1.014.070	1.056.289
Privada	649.184	658.094	601.886	577.880	549.325	5.237.68	496.036	482.570	553.421	527.121	475.461	485.648
Tipo de estudios												
ESO	237.115	515.206	886.542	953.021	935.678	937.280	891.860	845.306	828.331	826.153	826.260	850.831
Bachillerato	1.510.024	1.261.877	927.249	724.972	614.796	600.389	576.960	520.541	608.428	594.090	550.619	560.404
F. Profesional	813.873	650.091	414.179	262.475	224.839	227.620	121.122	121.313	271.330	296.578	112.652	130.702
<b>Total</b>	<b>2.561.012</b>	<b>2.427.174</b>	<b>2.227.970</b>	<b>1.940.468</b>	<b>1.775.313</b>	<b>1.765.289</b>	<b>1.589.942</b>	<b>1.487.160</b>	<b>1.708.089</b>	<b>1.716.821</b>	<b>1.489.531</b>	<b>1.541.937</b>

FUENTES: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.3.

Distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1996-2016.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
CCAA											
Andalucía	2.075	1.976	2.372	2.552	2.464	2.750	6.143	3.724	2.378	4.636	2.970
Aragón	941	775	671	2.185	1.757	1.764	785	1.377	2.464	2.710	2.781
Asturias	875	765	661	744	584	1.737	627	1.155	2.024	1.890	1.898
Baleares	661	679	602	1.762	1.795	622	599	1.203	806	859	913
Canarias	859	966	739	960	835	2.079	1.398	1.815	1.155	3.592	3.214
Cantabria	575	722	1.244	1.169	1.478	1.376	352	906	1.923	1.885	1.859
Castilla y León	1.120	1.093	919	1.140	983	1.107	1.697	1.865	1.151	2.284	1.220
Castilla-La Mancha	982	943	1.749	2.501	860	984	1.359	1.818	1.721	1.941	2.133
Cataluña	1.881	1.681	1.552	1.885	2.831	2.177	4.628	3.415	2.353	2.510	2.617
C. Valenciana	1.466	1.395	2.287	1.685	1.362	1.657	3.119	2.727	1.696	3.260	3.502
Extremadura	659	718	443	796	1.693	777	807	1.370	860	905	817
Galicia	1.436	1.333	1.170	2.108	1.245	2.244	1.799	1.945	2.022	2.102	2.089
Madrid	1.979	1.853	2.929	3.308	3.033	3.055	3.904	3.056	3.250	4.404	4.321
Murcia	818	813	727	1.394	1.468	1.601	998	1.551	1.054	1.085	1.259
Navarra	659	553	627	530	600	570	361	960	605	662	773
País Vasco	1.104	1.021	852	806	990	884	1.316	1.726	1.096	1.164	1.286
La Rioja	651	570	462	457	975	525	190	647	477	507	1.076
Ceuta	128	30	323	130	140	289	46	325	232	224	319
Melilla	97	199	121	464	428	256	57	382	236	866	322
Titularidad del centro educativo											
Pública	13.716	12.766	10.421	14.445	14.889	13.050	20.720	22.081	18.848	25.976	24.383
Privada	5.250	5.319	10.029	12.131	10.632	13.404	9.463	9.886	8.655	11.510	10.986
Tipo de estudios											
ESO	5.129	9.560	13.664	14.400	14.415	15.983	15.671	17.816	14.953	21.278	20.219
Bachillerato	10.495	7.312	5.869	10.733	9.468	8.468	10.348	11.683	10.384	14.624	13.496
Formación Profesional	3.342	1.213	917	1.443	1.638	2.003	4.164	2.468	2.166	1.584	1.654
<b>Total</b>	<b>18.966</b>	<b>18.085</b>	<b>20.450</b>	<b>26.576</b>	<b>25.521</b>	<b>26.454</b>	<b>30.183</b>	<b>31.967</b>	<b>27.503</b>	<b>37.486</b>	<b>35.369</b>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.4.

Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2016.


	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
<b>CENTROS</b>												
Andalucía	45	45	45	54	60	64	70	77	62	63	110	68
Aragón*	19	18	18	17	35	32	33	49	63	68	69	69
Asturias*	19	18	18	17	18	16	29	48	63	59	55	53
Baleares	12	12	13	15	32	32	15	41	77	22	20	23
Canarias*	22	23	22	21	23	22	33	57	30	32	92	80
Cantabria*	13	12	13	28	29	28	28	39	58	58	50	49
Castilla y León	18	19	27	25	30	27	32	35	29	33	61	32
Castilla-La Mancha*	25	24	17	44	58	22	25	31	29	43	52	53
Cataluña	44	38	39	37	43	70	53	56	53	55	58	59
C. Valenciana*	33	33	33	56	37	35	40	46	66	48	78	86
Extremadura	16	14	16	10	19	31	19	25	22	27	27	23
Galicia*	23	26	29	25	36	30	39	62	65	60	57	53
Madrid*	40	37	40	66	75	71	71	85	81	81	98	96
Murcia	16	16	16	17	38	25	25	48	25	27	25	29
Navarra	13	13	15	15	14	14	13	16	15	17	17	18
País Vasco	26	24	27	21	22	26	28	30	28	30	32	33
La Rioja*	11	12	12	12	12	17	12	25	37	12	11	25
Ceuta*	–	5	1	5	3	5	7	7	6	6	6	7
Melilla	–	–	3	3	7	6	5	7	48	6	23	7
<b>Total</b>	<b>395</b>	<b>389</b>	<b>404</b>	<b>488</b>	<b>591</b>	<b>573</b>	<b>577</b>	<b>784</b>	<b>857</b>	<b>747</b>	<b>941</b>	<b>863</b>
<b>AULAS</b>												
Andalucía	92	92	90	108	119	128	139	154	125	126	218	136
Aragón*	38	36	38	31	101	95	92	98	128	136	138	137
Asturias*	42	36	36	30	35	32	84	96	125	125	106	106
Baleares	29	28	27	24	84	93	30	82	153	43	40	46
Canarias*	44	46	44	41	46	44	98	114	60	66	182	160
Cantabria*	28	28	28	48	58	84	81	78	116	117	98	98
Castilla y León	38	40	40	47	58	54	64	70	60	71	121	64
Castilla-La Mancha*	54	55	55	69	116	44	50	62	63	96	104	106
Cataluña	88	78	78	74	87	140	103	112	111	115	116	118
C. Valenciana*	68	65	69	90	72	70	80	92	136	92	154	172
Extremadura	34	32	53	19	37	92	38	50	45	57	50	46
Galicia*	56	55	33	43	102	60	116	124	129	120	114	104
Madrid*	85	80	58	119	144	142	142	170	160	166	196	190
Murcia	34	36	79	29	72	74	75	96	51	55	50	58
Navarra	30	28	26	22	26	28	26	32	32	30	32	36
País Vasco	52	52	33	40	44	51	56	60	56	60	60	66
La Rioja*	25	29	29	20	22	50	24	50	74	24	22	50
Ceuta*	–	10	2	15	6	10	14	14	12	12	12	19
Melilla	–	–	8	6	22	24	10	14	94	12	45	14
<b>Total</b>	<b>837</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>875</b>	<b>1.251</b>	<b>1.315</b>	<b>1.322</b>	<b>1.568</b>	<b>1.730</b>	<b>1.523</b>	<b>1.858</b>	<b>1.726</b>

\* Han ampliado muestra en el año 2016.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.5.


Evolución del tamaño de la muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.6.

Evolución del tamaño de la muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.7.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																	
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	38,5	36,3	40,7	21,3	19,4	23,3	36,7	35,3	38,3	40,6	38,4	42,8	50,6	47,9	53,3	62,7	59,4	66,5	36,7	34,6	38,9
Cigarrillos electrónicos	20,1	22,6	17,5	12,8	14,5	11,1	21,2	23,7	18,4	21,4	23,9	19,0	23,8	26,5	21,1	26,8	31,9	21,0	19,6	21,8	17,2
Cigarrillos electrónicos con nicotina	8,9	9,4	8,5	4,7	4,9	4,5	9,0	9,4	8,5	9,9	10,1	9,7	11,7	12,1	11,2	12,6	15,6	9,3	8,7	8,9	8,4
Cigarrillos electrónicos sin nicotina	14,6	17,0	12,2	10,1	11,6	8,6	15,8	18,1	13,3	15,7	18,4	13,2	16,7	19,7	13,8	17,6	20,6	14,1	14,4	16,7	12,1
Cigarrillos electrónicos de los 2 tipos	4,7	5,2	4,2	2,8	3,1	2,5	4,8	5,0	4,6	5,3	5,8	4,8	5,8	6,6	5,1	5,7	7,3	3,8	4,6	5,1	4,2
Alcohol	76,9	75,7	78,2	57,1	55,9	58,2	75,4	73,1	77,9	83,1	82,0	84,3	89,9	89,7	90,0	91,9	91,3	92,6	75,8	74,5	77,2
Borracheras	48,9	46,4	51,4	23,1	19,9	26,4	42,4	39,2	45,7	55,9	53,6	58,2	69,7	68,5	70,9	74,7	73,0	76,6	47,0	44,3	49,7
Hipnosedantes con o sin receta	17,9	14,4	21,5	14,1	12,6	15,7	17,2	13,6	21,0	17,9	14,3	21,4	20,7	15,8	25,5	25,9	19,8	32,8	17,3	14,0	20,7
Hipnosedantes sin receta	8,0	6,3	9,8	5,7	4,7	6,8	7,8	6,1	9,6	8,3	6,5	10,2	9,4	7,3	11,5	11,6	8,9	14,6	7,8	6,1	9,4
Cannabis	31,1	33,2	28,9	13,9	15,2	12,6	26,7	28,9	24,4	33,7	36,6	30,8	45,2	48,0	42,5	55,6	56,3	54,7	29,3	31,5	27,2
Cocaína polvo y/o base	3,2	4,1	2,2	1,9	2,3	1,4	3,0	3,5	2,4	3,0	3,6	2,4	3,6	5,3	2,0	7,9	10,4	5,0	2,8	3,6	2,0
Cocaína en polvo	2,6	3,4	1,7	1,3	1,8	0,7	2,4	2,9	1,9	2,4	2,9	2,0	3,1	4,6	1,7	7,0	9,2	4,4	2,3	3,0	1,5
Cocaína base	1,7	2,2	1,2	1,2	1,4	1,0	1,8	1,9	1,7	1,7	2,2	1,2	1,7	2,6	0,9	3,3	4,1	2,4	1,6	2,0	1,2
Éxtasis	2,3	2,7	1,9	0,9	0,9	0,9	2,2	2,6	1,8	2,2	2,6	1,8	3,4	4,4	2,5	5,1	5,6	4,5	2,1	2,5	1,7
Anfetaminas/speed	1,7	2,2	1,2	0,7	0,9	0,5	1,7	2,0	1,4	1,5	1,8	1,3	2,4	3,5	1,3	4,0	5,3	2,6	1,5	2,0	1,1
Alucinógenos	1,6	2,1	1,1	0,7	1,0	0,4	1,7	2,1	1,2	1,4	1,7	1,1	2,3	3,1	1,4	4,1	5,3	2,7	1,5	1,9	1,0
Heroína	0,8	1,0	0,5	0,6	0,8	0,4	0,8	1,0	0,6	0,7	0,9	0,6	0,8	1,2	0,4	1,2	2,1	0,2	0,7	1,0	0,5
Inhalables volátiles	1,0	1,2	0,9	0,9	1,0	0,8	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	0,8	0,9	1,2	0,6	1,7	2,1	1,3	1,0	1,1	0,8
GHB	0,6	0,8	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,7	0,4	0,5	0,7	0,4	0,6	0,9	0,4	1,4	1,9	0,7	0,5	0,7	0,4
Metanfetamina	1,4	1,7	1,0	0,6	0,8	0,5	1,2	1,3	1,0	1,4	1,6	1,2	1,8	2,5	1,1	3,2	4,3	1,9	1,2	1,5	1,0
Setas mágicas	1,4	2,0	0,8	0,7	1,2	0,3	1,4	2,0	0,8	1,2	1,6	0,8	2,0	2,6	1,3	3,1	5,0	1,0	1,3	1,8	0,8
E. anabolizantes	0,5	0,8	0,2	0,4	0,6	0,1	0,4	0,6	0,3	0,5	0,7	0,4	0,5	1,0	0,1	1,1	1,6	0,5	0,5	0,7	0,2

## 1.2.7. (continuación)

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																		
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años			
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	
Sustancias																						
estimulantes	27,2	29,5	24,9	21,6	24,1	19,0	27,6	29,6	25,6	27,3	29,2	25,4	30,6	33,5	27,8	36,0	37,8	34,0	26,6	28,8	24,3	
Metilfenidato	0,8	1,0	0,5	0,7	1,0	0,3	0,7	1,0	0,5	0,7	0,9	0,5	0,9	1,0	0,8	1,3	2,0	0,6	0,8	1,0	0,5	
Piracetam	0,5	0,7	0,3	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4	0,5	0,4	0,6	0,8	0,5	0,5	0,8	0,1	0,5	0,6	0,4	
Modafinilo	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,1	0,3	0,5	0,2	
Donepezilo	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,2	
Durbitan	0,4	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,1	0,4	0,5	0,2	
Eivanse, Adderall	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,5	0,6	0,3	0,4	0,7	0,1	0,3	0,5	0,2	
Complejos																						
vitamínicos	2,5	1,9	3,0	1,3	1,3	1,3	2,0	1,2	2,8	2,7	2,2	3,3	3,4	2,7	4,2	4,1	3,5	4,8	2,3	1,8	2,8	
Ginkgo, guaraná, ácidos grasos...	2,4	2,1	2,6	1,3	1,3	1,4	2,0	1,8	2,3	2,7	2,6	2,8	3,1	2,5	3,8	3,5	3,4	3,6	2,3	2,0	2,5	
Anfetaminas o speed para estudiar	0,7	0,9	0,5	0,4	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,8	0,9	0,6	0,9	1,3	0,5	1,0	1,6	0,3	0,7	0,8	0,5	
Cocaína	1,1	1,4	0,7	0,7	0,8	0,5	0,9	1,1	0,7	1,1	1,3	0,8	1,2	1,6	0,8	2,7	4,2	1,1	0,9	1,2	0,7	
Bebidas energéticas para estudiar	21,3	23,9	18,6	17,1	19,5	14,7	21,7	24,0	19,2	21,3	23,8	18,9	23,5	27,2	20,0	28,9	30,8	26,6	20,7	23,4	18,1	
Nuevas sustancias	4,5	4,7	4,3	2,9	3,1	2,7	4,8	4,8	4,8	4,9	5,2	4,7	5,2	5,6	4,8	6,0	5,8	6,1	4,4	4,6	4,2	
Ketamina	0,6	0,7	0,4	0,4	0,5	0,2	0,7	0,7	0,6	0,6	0,9	0,3	0,6	0,8	0,3	1,0	0,9	1,2	0,5	0,7	0,3	
Spice	0,9	1,2	0,6	0,5	0,7	0,2	0,9	1,1	0,6	1,1	1,5	0,7	1,1	1,4	0,8	1,5	1,8	1,1	0,9	1,2	0,6	
Mefedrona	0,5	0,6	0,3	0,4	0,6	0,3	0,5	0,7	0,3	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,1	0,4	0,7	0,1	0,5	0,6	0,3	
Salvia	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,7	0,3	0,9	0,7	1,0	0,5	0,6	0,5	
Alguna droga ilegal*	32,6	35,0	30,3	15,3	16,6	14,1	28,5	30,8	26,1	35,2	38,4	32,1	46,4	49,5	43,4	57,0	58,1	55,7	30,9	33,2	28,5	
Alguna droga ilegal sin cannabis**	5,6	6,7	4,5	3,2	3,4	3,0	5,5	6,2	4,6	5,1	5,9	4,3	7,0	9,3	4,9	12,1	14,9	8,9	5,1	6,0	4,1	

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con o sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB

\*\* Alguna droga ilegal sin cannabis: incluye cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.8.

Prevalencia de consumo de drogas y situaciones de riesgo relacionadas con el consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																	
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	34,7	32,6	36,9	19,8	17,5	22,2	33,8	32,1	35,6	36,7	34,7	38,7	44,5	42,2	46,7	55,6	52,3	59,4	33,2	31,0	35,4
Alcohol	75,6	74,3	76,9	55,3	53,8	56,8	73,9	71,4	76,6	82,1	81,0	83,2	88,7	88,4	88,9	90,6	90,6	90,7	74,5	73,0	75,9
Borracheras	42,4	40,1	44,8	18,8	15,3	22,3	36,1	33,0	39,3	49,3	47,4	51,2	61,5	60,6	62,3	65,4	64,7	66,1	40,7	38,2	43,3
Botellón	52,0	50,3	53,8	28,0	24,8	31,3	47,7	45,2	50,4	61,1	59,4	62,8	68,9	68,3	69,4	68,1	71,3	64,5	50,9	48,7	53,1
Bebidas alcohólicas y cannabis	15,2	16,5	13,9	5,0	5,0	5,1	12,4	12,9	11,9	17,1	19,0	15,3	24,1	27,0	21,4	27,9	30,1	25,3	14,3	15,5	13,2
Bebidas alcohólicas y cocaína en polvo y/o base	1,2	1,6	0,8	0,5	0,7	0,3	0,9	1,0	0,9	1,1	1,4	0,9	1,5	2,5	0,5	4,2	5,7	2,5	1,0	1,3	0,7
Hipnosedantes con o sin receta	11,6	8,8	14,4	9,0	7,9	10,2	10,7	8,0	13,6	12,1	8,9	15,1	13,6	9,8	17,3	16,2	11,5	21,5	11,3	8,6	14,0
Hipnosedantes sin receta	5,4	4,1	6,7	3,5	2,8	4,3	4,9	3,5	6,3	5,9	4,4	7,3	6,5	5,0	7,9	8,2	6,0	10,8	5,2	3,9	6,4
Cannabis	26,3	28,1	24,4	11,1	11,8	10,5	23,1	24,5	21,6	29,2	31,8	26,7	38,1	40,7	35,6	45,0	47,9	41,8	24,9	26,6	23,2
Cocaína polvo y/o base	2,5	3,3	1,6	1,3	1,9	0,8	2,3	2,8	1,9	2,3	2,8	1,8	2,9	4,4	1,4	6,1	8,7	3,2	2,2	2,9	1,5
Cocaína en polvo	2,1	2,9	1,4	1,0	1,6	0,5	1,9	2,2	1,5	2,0	2,4	1,7	2,7	4,1	1,3	5,5	7,5	3,2	1,9	2,5	1,3
Cocaína base	1,2	1,7	0,8	0,8	1,0	0,5	1,5	1,7	1,3	1,2	1,7	0,8	1,3	2,0	0,5	2,4	3,6	0,9	1,2	1,6	0,8
Éxtasis	1,6	2,0	1,1	0,6	0,7	0,6	1,4	1,6	1,2	1,6	1,9	1,3	2,4	3,4	1,4	3,1	4,3	1,8	1,4	1,8	1,1
Anfetaminas/speed	1,2	1,6	0,7	0,5	0,7	0,3	1,1	1,3	0,9	1,0	1,2	0,8	1,7	2,7	0,7	2,8	4,3	1,2	1,0	1,4	0,7
Alucinógenos	1,0	1,4	0,6	0,4	0,6	0,3	1,0	1,3	0,7	0,9	1,2	0,6	1,4	2,1	0,6	2,1	3,2	1,0	0,9	1,2	0,5
Heroína	0,6	0,8	0,3	0,5	0,7	0,2	0,7	0,9	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5	0,8	0,2	0,9	1,7	0,0	0,5	0,7	0,3
Inhalables volátiles	0,6	0,8	0,4	0,5	0,6	0,3	0,6	0,9	0,4	0,6	0,7	0,4	0,5	0,7	0,2	1,4	1,9	0,8	0,5	0,7	0,3
GHB	0,4	0,6	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7	0,1	0,8	1,3	0,2	0,3	0,5	0,2
Metanfetamina	1,0	1,3	0,7	0,4	0,7	0,2	0,7	0,8	0,6	1,1	1,4	0,9	1,3	1,9	0,8	2,4	3,5	1,2	0,9	1,2	0,6
Setas mágicas	0,9	1,3	0,5	0,4	0,8	0,1	1,0	1,4	0,6	0,8	1,0	0,5	1,3	1,7	0,8	1,9	3,2	0,4	0,8	1,2	0,5
Esteroides anabolizantes	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,0	0,7	1,3	0,0	0,3	0,5	0,1

## 1.2.8. (continuación)

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																	
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Nuevas sustancias	3,1	3,4	2,9	2,0	2,4	1,7	3,4	3,4	3,5	3,7	3,8	3,6	3,3	3,6	3,0	3,7	4,4	3,0	3,1	3,3	2,9
Ketamina	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,6	0,1	0,4	0,6	0,1	0,3	0,4	0,2
Spice	0,7	0,9	0,4	0,4	0,6	0,2	0,7	0,9	0,5	0,8	1,0	0,6	0,7	1,1	0,3	0,9	1,2	0,5	0,6	0,9	0,4
Mefedrona	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,4	0,5	0,2
Salvia	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,6	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,0	0,4	0,4	0,3
Conducir + alcohol	2,5	3,9	1,1	0,8	1,3	0,4	1,8	2,9	0,5	2,6	3,9	1,3	4,2	6,4	1,9	5,4	8,3	2,1	2,3	3,5	1,0
Conducir + hachís	1,8	2,9	0,8	0,6	1,0	0,2	1,4	2,4	0,4	2,0	3,0	1,0	2,9	4,7	1,1	3,9	5,3	2,3	1,7	2,7	0,7
Conducir + cocaína	0,3	0,6	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	0,1	0,5	0,9	0,0	0,9	1,4	0,2	0,3	0,5	0,1
Pasajero + alcohol	17,2	16,4	17,9	8,6	7,7	9,6	13,4	12,8	14,1	19,0	17,8	20,2	24,5	24,4	24,6	30,8	30,6	31,0	16,2	15,3	17,0
Pasajero + hachís	9,1	9,4	8,8	3,0	2,7	3,2	6,4	6,4	6,4	9,2	9,7	8,7	14,7	15,3	14,1	22,1	23,7	20,3	8,1	8,3	8,0
Pasajero + cocaína	1,8	2,1	1,4	0,9	1,2	0,5	1,3	1,3	1,2	1,8	1,8	1,7	2,5	3,2	1,8	4,4	5,6	3,0	1,6	1,8	1,3
Accidente	1,7	2,6	0,8	0,9	1,5	0,3	1,6	2,2	0,9	1,8	2,7	0,9	2,6	3,9	1,3	2,8	4,5	1,0	1,7	2,5	0,8
Accidente + alcohol	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,8	0,1	0,4	0,6	0,3	0,6	0,7	0,4	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,2
Accidente + hachís	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,6	0,1	0,4	0,5	0,2	0,3	0,5	0,1	0,5	0,6	0,3	0,3	0,5	0,1
Pelea	14,1	18,5	9,7	10,8	13,9	7,7	14,4	18,6	10,0	14,5	19,3	10,0	15,4	20,6	10,3	19,9	26,1	12,9	13,7	17,9	9,4
Pelea + alcohol	5,2	6,4	4,0	2,0	2,1	1,8	4,2	4,9	3,4	5,9	7,0	4,8	7,3	9,5	5,2	11,1	14,8	6,9	4,8	5,7	3,8
Pelea + hachís	2,5	3,4	1,6	0,9	1,2	0,5	2,4	3,1	1,6	2,8	3,7	2,0	3,3	4,9	1,9	5,2	7,2	3,1	2,3	3,1	1,5
Tratamiento hachís*	1,3	1,6	1,0	0,4	0,6	0,3	1,3	1,2	1,5	1,6	2,3	1,0	1,9	2,5	1,3	1,6	2,1	0,9	1,3	1,6	1,0
Alguna droga ilegal**	27,1	29,1	25,1	11,8	12,4	11,1	24,1	25,8	22,4	30,0	32,8	27,3	38,9	41,8	36,2	46,1	49,2	42,6	25,7	27,6	23,9
Alguna droga ilegal sin cannabis***	3,7	4,8	2,6	2,0	2,4	1,6	3,6	4,2	2,9	3,4	4,1	2,7	4,9	7,0	2,8	8,0	11,1	4,5	3,4	4,3	2,5

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* Porcentaje de estudiantes de 14-18 años que en los últimos 12 meses han iniciado algún tratamiento para dejar o reducir el consumo de hachís o marihuana.

\*\* Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con o sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

\*\*\* Alguna droga ilegal sin cannabis: incluye cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.9.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																	
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	27,3	25,6	29,0	14,6	12,9	16,4	26,1	24,3	28,1	28,3	26,9	29,8	35,8	34,3	37,3	48,0	45,9	50,4	25,8	24,1	27,5
Alcohol	67,0	65,9	68,1	46,1	44,4	47,8	64,6	62,8	66,6	73,1	72,4	73,8	81,2	80,8	81,6	84,5	85,4	83,5	65,7	64,4	67,0
Borracheras	21,8	21,2	22,3	7,9	6,5	9,2	15,8	14,4	17,4	25,6	25,1	26,1	33,9	35,3	32,6	40,4	40,5	40,3	20,4	19,7	21,1
Binge drinking	31,7	32,3	31,0	13,9	13,2	14,6	26,4	25,5	27,3	35,9	37,0	34,7	45,0	47,5	42,6	56,6	58,9	54,0	29,8	30,2	29,5
Bebidas energéticas	42,7	52,6	32,6	40,7	50,5	30,8	44,9	54,2	35,0	42,1	52,5	31,9	42,0	52,5	31,7	47,8	56,0	38,3	42,3	52,3	32,2
Bebidas energéticas + alcohol	15,0	16,7	13,2	8,0	9,3	6,8	14,3	16,0	12,6	16,4	18,3	14,5	19,6	21,7	17,5	23,4	25,1	21,5	14,4	16,1	12,7
Hipnosedantes con o sin receta	5,9	4,4	7,3	4,7	4,4	5,1	5,4	4,0	6,8	6,1	4,3	7,8	6,6	4,5	8,6	8,7	5,8	12,0	5,7	4,3	7,0
Hipnosedantes sin receta	2,6	2,0	3,3	1,6	1,6	1,7	2,5	2,0	3,1	2,8	2,0	3,6	3,2	2,1	4,1	4,4	3,1	5,8	2,5	1,9	3,1
Cannabis	18,3	20,8	15,9	8,1	9,1	7,1	16,7	18,4	15,0	20,2	23,0	17,4	25,6	29,5	22,0	32,0	36,5	26,9	17,3	19,5	15,1
Principalmente marihuana	7,9	8,7	7,1	3,1	3,6	2,7	6,7	7,4	6,0	8,7	9,4	8,0	11,8	13,1	10,6	14,8	16,2	13,2	7,4	8,2	6,7
Principalmente hachís	1,9	2,0	1,7	0,6	0,6	0,6	1,7	1,9	1,4	2,2	2,4	2,1	2,7	2,7	2,7	3,8	4,4	3,1	1,8	1,9	1,7
De los 2 tipos	5,7	6,9	4,4	1,9	2,1	1,7	5,2	6,0	4,4	6,4	8,0	4,8	8,5	10,8	6,3	10,0	12,2	7,6	5,4	6,5	4,2
En forma de porros o canutos	16,5	18,7	14,3	6,3	6,8	5,8	14,7	16,2	13,1	18,3	20,9	15,6	23,9	27,5	20,4	30,5	35,0	25,3	15,5	17,4	13,5
Pipas de agua, bongs	2,9	3,6	2,1	1,3	1,7	1,0	2,9	3,7	1,9	3,2	3,9	2,6	3,9	5,1	2,8	3,8	5,4	2,0	2,8	3,5	2,1
Usando cigarrillos electrónicos	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2
Por vía oral	1,0	1,2	0,7	0,5	0,7	0,4	0,7	1,0	0,4	0,9	1,0	0,8	1,6	1,9	1,4	1,7	2,4	0,9	0,9	1,1	0,7
Cannabis + tabaco	13,3	14,9	11,7	4,2	4,4	4,0	11,5	12,8	10,2	15,0	16,9	13,2	20,2	23,0	17,6	25,6	28,7	22,0	12,4	13,8	11,1

1.2.9. (continuación)

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																		
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años			
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	
Cocaína																						
polvo y/o base	1,0	1,5	0,5	0,7	0,9	0,4	1,0	1,5	0,5	0,9	1,2	0,7	1,0	1,8	0,3	2,4	3,2	1,3	0,9	1,3	0,5	
Cocaína en polvo	0,8	1,2	0,4	0,5	0,8	0,2	0,8	1,1	0,4	0,8	1,0	0,7	0,9	1,5	0,2	2,2	3,1	1,1	0,7	1,1	0,4	
Cocaína base	0,5	0,8	0,3	0,4	0,5	0,3	0,6	1,0	0,2	0,5	0,7	0,3	0,5	0,8	0,2	1,1	1,5	0,5	0,5	0,8	0,3	
Éxtasis	0,6	0,9	0,3	0,3	0,4	0,2	0,6	0,8	0,3	0,6	0,7	0,5	0,7	1,2	0,2	1,3	2,1	0,3	0,5	0,8	0,3	
Anfetaminas/speed	0,5	0,8	0,3	0,3	0,4	0,1	0,5	0,8	0,3	0,4	0,5	0,4	0,6	1,2	0,1	1,5	2,4	0,6	0,5	0,7	0,2	
Alucinógenos	0,4	0,6	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,2	0,5	0,8	0,2	0,8	1,4	0,2	0,4	0,5	0,2	
Heroína	0,3	0,6	0,1	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4	0,1	0,4	0,7	0,1	0,8	1,5	0,0	0,3	0,5	0,1	
Inhalables volátiles	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,8	1,3	0,2	0,3	0,4	0,2	
GHB	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,6	1,1	0,0	0,2	0,3	0,1	
Metanfetamina	0,4	0,6	0,2	0,3	0,4	0,1	0,3	0,5	0,2	0,4	0,5	0,3	0,5	0,9	0,2	0,9	1,6	0,0	0,4	0,6	0,2	
Setas mágicas	0,3	0,6	0,1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,6	0,0	0,3	0,4	0,2	0,4	0,6	0,2	0,8	1,3	0,3	0,3	0,5	0,1	
Esteroides																						
anabolizantes	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,6	1,2	0,0	0,2	0,3	0,1	
Nuevas sustancias	1,7	1,9	1,4	1,2	1,6	0,7	1,9	1,8	2,0	1,9	2,1	1,7	1,6	2,0	1,2	2,3	2,5	2,0	1,6	1,9	1,4	
Ketamina	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	
Spice	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,5	0,9	0,1	0,3	0,4	0,1	
Mefedrona	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,2	0,2	0,1	
Salvia	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	
Alguna droga																						
ilegal*	18,9	21,5	16,3	8,5	9,4	7,5	17,4	19,2	15,4	20,7	23,7	17,8	26,2	30,2	22,3	32,9	37,8	27,4	17,9	20,2	15,5	
Alguna droga ilegal																						
sin cannabis**	1,5	2,2	0,9	0,9	1,2	0,7	1,5	2,0	0,9	1,4	1,7	1,0	1,9	3,3	0,7	3,2	4,7	1,6	1,4	2,0	0,8	

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con o sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

\*\* Alguna droga ilegal sin cannabis: incluye cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.10.

Prevalencia de consumo diario de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.


	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																	
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	8,8	8,6	9,0	2,2	2,0	2,4	6,7	6,8	6,6	9,7	9,3	10,1	13,5	13,7	13,3	22,1	20,4	24,0	7,8	7,7	8,0
Alcohol	1,6	1,9	1,3	0,7	1,0	0,4	1,8	2,3	1,3	1,6	1,5	1,7	2,1	2,8	1,4	2,3	2,3	2,3	1,5	1,8	1,2
Borracheras	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	0,4	0,4	0,3	0,4	0,6	0,1	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	0,2
Binge drinking	0,7	0,8	0,6	0,4	0,5	0,3	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,8	1,1	0,5	1,0	1,1	0,8	0,7	0,8	0,6
Hipnosedantes con o sin receta	2,7	2,3	3,0	1,8	2,1	1,6	2,5	2,1	2,8	2,9	2,3	3,4	3,1	2,3	3,9	4,3	3,4	5,4	2,6	2,2	2,9
Hipnosedantes sin receta	1,1	1,0	1,2	0,6	0,6	0,5	1,1	1,1	1,0	1,1	1,0	1,3	1,4	1,0	1,7	2,1	2,1	2,1	1,0	0,9	1,1
Cannabis	2,0	2,7	1,3	0,4	0,6	0,2	1,6	2,2	1,0	2,3	2,9	1,6	3,4	5,0	1,8	3,9	4,5	3,1	1,8	2,6	1,1

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.11.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.12.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



	2016
Alcohol	75,6
Tabaco	34,7
Cannabis	26,3
Hipnosedantes*	11,6
Hipnosedantes**	5,4
Nuevas sustancias	3,1
Cocaína polvo y/o base	2,5
Cocaína en polvo	2,1
Éxtasis	1,6
Cocaína base	1,2
Anfetaminas/speed	1,2
Metanfetamina	1,0
Alucinógenos	1,0
Setas mágicas	0,9
Spice	0,7
Inhalables volátiles	0,6
Heroína	0,6
GHB	0,4
Salvia	0,4
Mefedrona	0,4
Ketamina	0,3
Esteroides anabolizantes	0,3


\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.13.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



2016

Alcohol	67,0
Tabaco	27,3
Cannabis	18,3
Hipnosedantes*	5,9
Hipnosedantes**	2,6
Nuevas sustancias	1,7
Cocaína polvo y/o base	1,0
Cocaína en polvo	0,8
Éxtasis	0,6
Cocaína base	0,5
Anfetaminas/speed	0,5
Metanfetamina	0,4
Alucinógenos	0,4
Setas mágicas	0,3
Heroína	0,3
Inhalables volátiles	0,3
Spice	0,3
GHB	0,2
Esteroides anabolizantes	0,2
Salvia	0,2
Ketamina	0,2
Mefedrona	0,2


\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.14.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.15.

Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.

Droga	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario en los últimos 30 días
Tabaco	38,5	34,7	27,3	8,8
Alcohol	76,9	75,6	67,0	1,6
Hipnosedantes*	17,9	11,6	5,9	2,7
Hipnosedantes**	8,0	5,4	2,6	1,1
Cannabis	31,1	26,3	18,3	2,0
Éxtasis	2,3	1,6	0,6	-
Alucinógenos	1,6	1,0	0,4	-
Anfetaminas	1,7	1,2	0,5	-
Cocaína polvo y/o base	3,2	2,5	1,0	0,3
Cocaína polvo	2,6	2,1	0,8	0,2
Cocaína base	1,7	1,2	0,5	0,2
Heroína	0,8	0,6	0,3	-
Inhalables volátiles	1,0	0,6	0,3	-
GHB	0,6	0,4	0,2	-
Metanfetamina	1,4	1,0	0,4	-
Setas mágicas	1,4	0,9	0,3	-
Esteroides anabolizantes	0,5	0,3	0,2	-

\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.16.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Tabaco	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5
Alcohol	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9
Hipnosedantes*	6,9	7,7	7,7	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5	16,1	17,9
Hipnosedantes**	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0
Cannabis	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1	31,1
Éxtasis	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2	2,3
Alucinógenos	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6
Anfetaminas	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7
Cocaína polvo y/o base	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0
GHB	-	-	-	-	-	-	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9	0,8	1,4
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	1,3	1,4
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,5

\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.17.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Tabaco	-	-	-	-	-	-	34,0	38,1	32,4	35,3	31,4	34,7
Alcohol	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8	11,6
Hipnosedantes**	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4
Cannabis	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2
Cocaína polvo y/o base	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6
Inhalables volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6
GHB	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,5	1,0
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,4	0,8	0,9
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,3

\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.18.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Tabaco	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3
Alcohol	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2	5,9
Hipnosedantes**	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6
Cannabis	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3
Éxtasis	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4	0,6
Alucinógenos	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4
Anfetaminas	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5	0,5
Cocaína polvo y/o base	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8	1,0
Heroína	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3
Inhalables volátiles	1,1	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4	0,3
GHB	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,3	0,4
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,4	0,3
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,2

\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.19.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Tabaco	21,6	23,7	23,1	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8
Alcohol	-	-	-	-	-	-	1,9	2,9	6,0	2,7	1,7	1,6
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,7	0,9	0,8	2,7
Hipnosedantes**	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	1,1
Cannabis	1,0	1,4	1,8	3,7	3,8	5,0	3,1	3,1	3,0	2,7	1,8	2,0

\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.20.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	21,3	36,7	40,6	50,6	62,7
Alcohol	57,1	75,4	83,1	89,9	91,9
Hipnosedantes*	14,1	17,2	17,9	20,7	25,9
Hipnosedantes**	5,7	7,8	8,3	9,4	11,6
Cannabis	13,9	26,7	33,7	45,2	55,6
Éxtasis	0,9	2,2	2,2	3,4	5,1
Alucinógenos	0,7	1,7	1,4	2,3	4,1
Anfetaminas/speed	0,7	1,7	1,5	2,4	4,0
Cocaína polvo y/o base	1,9	3,0	3,0	3,6	7,9
Cocaína polvo	1,3	2,4	2,4	3,1	7,0
Cocaína base	1,2	1,8	1,7	1,7	3,3
Heroína	0,6	0,8	0,7	0,8	1,2
Inhalables volátiles	0,9	1,1	1,0	0,9	1,7
GHB	0,4	0,6	0,5	0,6	1,4
Metanfetamina	0,6	1,2	1,4	1,8	3,2
Setas mágicas	0,7	1,4	1,2	2,0	3,1
Esteroides anabolizantes	0,4	0,4	0,5	0,5	1,1

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.21.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	19,8	33,8	36,7	44,5	55,6
Alcohol	55,3	73,9	82,1	88,7	90,6
Hipnosedantes*	9,0	10,7	12,1	13,6	16,2
Hipnosedantes**	3,5	4,9	5,9	6,5	8,2
Cannabis	11,1	23,1	29,2	38,1	45,0
Éxtasis	0,6	1,4	1,6	2,4	3,1
Alucinógenos	0,4	1,0	0,9	1,4	2,1
Anfetaminas/speed	0,5	1,1	1,0	1,7	2,8
Cocaína polvo y/o base	1,3	2,3	2,3	2,9	6,1
Cocaína polvo	1,0	1,9	2,0	2,7	5,5
Cocaína base	0,8	1,5	1,2	1,3	2,4
Heroína	0,5	0,7	0,5	0,5	0,9
Inhalables volátiles	0,5	0,6	0,6	0,5	1,4
GHB	0,2	0,3	0,4	0,4	0,8
Metanfetamina	0,4	0,7	1,1	1,3	2,4
Setas mágicas	0,4	1,0	0,8	1,3	1,9
Esteroides anabolizantes	0,2	0,3	0,3	0,3	0,7

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.22.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	14,6	26,1	28,3	35,8	48,0
Alcohol	46,1	64,6	73,1	81,2	84,5
Hipnosedantes*	4,7	5,4	6,1	6,6	8,7
Hipnosedantes**	1,6	2,5	2,8	3,2	4,4
Cannabis	8,1	16,7	20,2	25,6	32,0
Éxtasis	0,3	0,6	0,6	0,7	1,3
Alucinógenos	0,2	0,4	0,3	0,5	0,8
Anfetaminas/speed	0,3	0,5	0,4	0,6	1,5
Cocaína polvo y/o base	0,7	1,0	0,9	1,0	2,4
Cocaína polvo	0,5	0,8	0,8	0,9	2,2
Cocaína base	0,4	0,6	0,5	0,5	1,1
Heroína	0,3	0,3	0,3	0,4	0,8
Inhalables volátiles	0,3	0,3	0,3	0,2	0,8
GHB	0,1	0,3	0,2	0,2	0,6
Metanfetamina	0,3	0,3	0,4	0,5	0,9
Setas mágicas	0,2	0,3	0,3	0,4	0,8
Esteroides anabolizantes	0,1	0,2	0,2	0,2	0,6

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.23.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016.

	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tabaco	2,2	6,7	9,7	13,5	22,1
Alcohol	0,7	1,8	1,6	2,1	2,3
Hipnosedantes*	1,8	2,5	2,9	3,1	4,3
Hipnosedantes**	0,6	1,1	1,1	1,4	2,1
Cannabis	0,4	1,6	2,3	3,4	3,9

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.24.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	56,6	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	64,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3	36,3	40,7
Alcohol	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1	75,7	78,2
Hipnosedantes*	5,8	8,1	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	12,0	18,8	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	11,9	20,1	14,4	21,5
Hipnosedantes**	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6	6,3	9,8
Cannabis	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	40,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8	33,2	28,9
Éxtasis	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	1,6	0,8	2,7	1,9
Alucinógenos	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	2,3	1,2	2,1	1,1
Anfetaminas	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,5	2,7	3,4	1,8	3,2	1,5	1,8	0,9	2,2	1,2
Cocaína polvo y/o base	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9	4,1	2,2
Heroína	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	0,9	0,4	1,0	0,5
Inhalables volátiles	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,1	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	1,3	0,6	1,2	0,9
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	0,6	1,6	0,7	1,5	0,8	1,9	0,8	1,3	0,8	0,8	0,4
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,6	1,1	0,4	1,7	1,0
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	1,4	1,8	0,8	2,0	0,8
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,3	1,0	0,3	0,8	0,2

H = Hombres; M = Mujeres.

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.25.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,2	37,5	36,0	40,1	28,1	36,4	33,1	37,5	29,6	33,2	32,6	36,9
Alcohol	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2	74,3	76,9
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	11,1	8,1	12,1	7,7	12,5	8,4	14,9	7,7	13,8	8,8	14,4
Hipnosedantes**	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8	4,1	6,7
Cannabis	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	28,2	24,7	29,7	23,3	28,0	23,0	28,1	24,4
Éxtasis	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,3	1,6	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4	1,2	0,6	2,0	1,1
Alucinógenos	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1	1,6	0,7	1,4	0,6
Anfetaminas	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,2	1,8	2,2	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6	1,6	0,7
Cocaína polvo y/o base	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2	3,3	1,6
Heroína	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2	0,8	0,3
Inhalables volátiles	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,6	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8	0,9	0,4	0,8	0,4
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,4	1,2	0,4	1,0	0,5	1,5	0,5	0,9	0,4	0,6	0,2
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,4	0,8	0,3	1,3	0,7
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	0,8	1,2	0,5	1,3	0,5
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,2	0,7	0,2	0,5	0,1

H = Hombres; M = Mujeres.

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.26.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2	25,6	29,0
Alcohol	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5	65,9	68,1
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	5,5	4,0	6,1	4,0	6,6	4,7	8,5	4,2	8,1	4,4	7,3
Hipnosedantes**	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9	2,0	3,3
Cannabis	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	28,5	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	19,3	15,2	18,9	13,3	21,4	15,8	20,8	15,9
Éxtasis	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6	0,6	0,3	0,9	0,3
Alucinógenos	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4	0,9	0,4	0,6	0,2
Anfetaminas	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,6	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,5	0,8	1,3	0,5	1,4	0,6	0,7	0,2	0,8	0,3
Cocaína polvo y/o base	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4	1,5	0,5
Heroína	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,8	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3	0,5	0,2	0,6	0,1
Inhalables volátiles	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6	0,6	0,3	0,5	0,2
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,2	0,8	0,3	0,8	0,3	1,0	0,3	0,6	0,2	0,4	0,1
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,1	0,6	0,2
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,2	0,6	0,1
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,1	0,4	0,1

H = Hombres; M = Mujeres.

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.27.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	17,8	25,4	19,0	28,1	17,9	27,5	19,3	27,0	17,2	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1	8,7	9,1	8,6	9,0
Alcohol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	1,0	3,8	2,0	7,8	4,3	3,3	2,0	2,2	1,3	1,9	1,3
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9	2,3	3,0
Hipnosedantes**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	1,0	1,2
Cannabis	1,5	0,5	2,2	0,8	2,7	0,9	5,5	1,9	5,5	2,1	7,0	2,9	4,2	2,2	4,4	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0	2,7	1,3

H = Hombres; M = Mujeres.

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.28.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016.



\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.


\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

\*\*\* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.29.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016.




\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. \*\*\* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.30.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016.




\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. \*\*\* Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.31.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.



	Alcohol	Tabaco	Hipnosedantes*	Hipnosedantes**	Cannabis
Hombres	1,9	8,6	2,3	1,0	2,7
Mujeres	1,3	9,0	3,0	1,2	1,3
Total	1,6	8,8	2,7	1,1	2,0

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.32.

Edad media de inicio (años) en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 2016.

	Hombres	Mujeres
Alcohol	13,9	14,0
Alcohol (consumo semanal)	15,1	15,1
Borracheras	14,7	14,7
Tabaco	14,1	14,2
Tabaco (consumo diario)	14,7	14,6
Hipnosedantes**	13,5	14,2
Cannabis	14,8	14,9
Cocaína polvo y/o base	15,1	15,0
Heroína	13,7	14,6
Éxtasis	15,3	15,1
Alucinógenos	15,0	15,4
Anfetaminas	15,1	15,0
Sustancias volátiles	13,9	13,7
Hipnosedantes*	13,2	14,1

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.


\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.33.

Evolución de la edad media de inicio (años) en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Éxtasis	15,6	15,7	15,5	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2	15,2
Cocaína polvo	–	–	–	–	–	–	15,4	15,4	15,4	15,6	15,1	15,2
Alucinógenos	15,4	15,6	15,4	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0	15,2
Alcohol (consumo semanal)	–	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,0	15,6	14,8	15,1	15,0	15,1
Cocaína polvo y/o base	15,6	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,3	15,3	14,9	15,5	15,0	15,1
Anfetaminas	15,5	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1
Metanfetamina	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,1
Setas mágicas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15,0
Cannabis	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8	14,8
Borracheras	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,7
Tabaco (consumo diario)	–	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6
Cocaína base	–	–	–	–	–	–	15,0	15,0	14,6	15,2	14,8	14,6
Esteroides anabolizantes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,3
GHB	–	–	–	–	–	–	15,0	15,0	14,6	15,1	14,8	14,2
Tabaco	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1
Heroína	14,3	14,7	14,4	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0	14,0
Hipnosedantes**	14,1	14,5	14,8	14,5	14,6	14,8	14,2	14,3	14,2	14,6	14,2	14,0
Alcohol	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,9	13,8	14,0
Inhalables volátiles	13,3	13,6	13,4	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9	13,8
Hipnosedantes*	–	–	–	–	–	–	13,8	14,0	13,9	14,3	13,9	13,7




\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.34.

Evolución de la edad media de inicio (años) en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2016.



	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alcohol	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,9	13,8	14,0
Alcohol (consumo semanal)	14,9	15	15,1	14,9	15,6	14,8	15,1	15,0	15,1
Borracheras	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7
Tabaco	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1
Tabaco (consumo diario)	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6
Hipnosedantes**	14,5	14,6	14,8	14,2	14,3	14,4	14,6	14,2	14,0
Cannabis	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8	14,8
Cocaína polvo y/o base	15,8	15,7	15,8	15,4	15,3	14,9	15,5	15,0	15,1
Heroína	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0	14,0
Éxtasis	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2	15,2
Alucinógenos	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0	15,2
Anfetaminas	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1
Sustancias volátiles	13,9	14,3	14	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9	13,8
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	14,3	13,9	13,7

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.35.

Incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																	
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	16,3	15,0	17,7	12,6	10,8	14,6	18,6	17,8	19,5	17,4	16,0	18,8	17,5	16,6	18,4	19,9	18,8	21,3	16,1	14,8	17,5
Alcohol	47,7	47,0	48,4	39,4	38,0	40,9	52,8	49,9	56,1	54,5	54,1	55,0	51,5	55,9	46,0	54,3	55,6	52,2	47,5	46,7	48,4
Cannabis	13,9	14,7	13,1	7,3	7,3	7,3	14,8	15,9	13,7	16,8	18,2	15,5	17,8	19,1	16,7	19,5	20,6	18,4	13,6	14,4	12,8
Cocaína en polvo	1,2	1,5	0,9	0,6	0,9	0,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,1	1,4	1,9	0,9	2,7	3,7	1,7	1,1	1,3	0,8
Cocaína base	0,7	0,8	0,5	0,5	0,7	0,4	0,9	0,8	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,8	0,4	1,0	1,5	0,4	0,7	0,8	0,6
Cocaína																					
polvo y/o base	1,4	1,8	1,0	0,9	1,2	0,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,2	1,6	2,2	0,9	3,3	4,8	1,7	1,3	1,6	1,0

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.36.

Incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos\* en miles de estudiantes). España, 2016.

	TOTAL			POR EDAD Y SEXO																	
				14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	184,6	87,7	96,9	44,4	19,2	25,2	46,3	23,1	23,2	51,0	23,8	27,2	33,3	16,3	16,9	9,7	5,3	4,4	174,9	82,4	92,5
Alcohol	323,9	167,4	156,4	108,9	53,4	55,5	88,0	44,2	43,8	82,7	43,2	39,5	34,2	20,5	13,7	10,1	6,1	4,0	313,8	161,3	152,5
Cannabis	170,0	88,9	81,1	26,3	13,1	13,2	40,5	22,0	18,5	54,5	28,4	26,0	37,5	19,1	18,4	11,2	6,3	4,9	158,8	82,6	76,1
Cocaína en polvo	17,7	11,0	6,6	2,3	1,7	0,5	3,7	1,9	1,8	4,7	2,5	2,2	4,3	3,0	1,3	2,7	1,9	0,8	15,0	9,1	5,8
Cocaína base	10,2	6,1	4,1	2,0	1,3	0,7	2,7	1,3	1,4	2,6	1,5	1,1	1,8	1,2	0,6	1,0	0,8	0,2	9,2	5,3	3,9
Cocaína																					
polvo y/o base	21,5	13,7	7,8	3,3	2,3	1,0	4,6	2,4	2,2	5,5	3,1	2,3	4,8	3,3	1,5	3,3	2,5	0,8	18,2	11,2	7,0

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2016. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Notas: Debido al redondeo, la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

En 2016 no se dispone de la desagregación poblacional según sexo y edad, por eso la tabla se ha calculado utilizando el factor de expansión.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.37.

Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Andalucía	2.970	52,4	47,6	25,2	20,3	28,8	18,8	6,8
Aragón	2.781	53,2	46,8	25,1	22,4	26,7	19,5	6,3
Asturias	1.898	51,5	48,5	26,6	19,9	27,9	18,7	6,9
Baleares	913	49,3	50,7	21,5	21,9	30,3	21,0	5,4
Canarias	3.214	49,0	51,0	21,8	21,4	27,3	21,2	8,3
Cantabria	1.859	48,5	51,5	27,1	21,5	27,1	19,5	4,7
Castilla y León	1.220	48,7	51,3	22,1	21,1	26,9	21,9	8,0
Castilla-La Mancha	2.133	50,2	49,8	23,1	21,5	23,6	23,9	7,9
Cataluña	2.617	50,5	49,5	32,5	19,2	22,9	20,1	5,2
C. Valenciana	3.502	50,7	49,3	21,8	20,9	28,6	20,9	7,8
Extremadura	817	48,8	51,2	28,1	17,7	25,3	22,5	6,4
Galicia	2.089	49,8	50,2	22,9	20,2	27,0	22,0	8,0
Madrid	4.321	50,4	49,6	25,1	19,4	23,5	23,1	8,9
Murcia	1.259	45,8	54,2	29,1	22,6	28,3	17,3	2,7
Navarra	773	49,9	50,1	26,0	20,3	29,0	19,4	5,3
País Vasco	1.286	51,7	48,3	16,4	29,3	29,8	20,1	4,4
La Rioja	1.076	49,6	50,4	28,7	17,9	27,8	19,7	5,8
Ceuta	319	42,4	57,6	26,0	27,3	20,1	20,1	6,4
Melilla	322	55,7	44,3	21,3	29,1	37,0	10,8	1,8
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>50,6</b>	<b>49,4</b>	<b>25,3</b>	<b>20,7</b>	<b>26,5</b>	<b>20,6</b>	<b>6,8</b>

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.38.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

	Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.970	78,5	77,0	80,0	77,4	75,9	78,9	68,7	67,0	70,4
Aragón	2.781	82,6	81,2	84,0	81,6	80,1	83,0	73,8	72,1	75,4
Asturias	1.898	77,7	75,8	79,6	76,3	74,4	78,3	70,6	68,6	72,7
Baleares	913	79,2	76,5	81,8	78,0	75,3	80,7	68,9	65,9	71,9
Canarias	3.214	71,8	70,2	73,3	69,9	68,3	71,5	60,9	59,2	62,5
Cantabria	1.859	77,1	75,2	79,0	75,8	73,9	77,8	68,8	66,7	70,9
Castilla y León	1.220	80,4	78,1	82,6	79,6	77,3	81,8	71,1	68,5	73,6
Castilla-La Mancha	2.133	81,3	79,7	83,0	80,3	78,6	82,0	72,5	70,6	74,4
Cataluña	2.617	71,6	69,9	73,4	69,9	68,1	71,6	61,9	60,1	63,8
C. Valenciana	3.502	81,2	79,9	82,4	79,8	78,5	81,1	72,6	71,1	74,0
Extremadura	817	80,6	77,9	83,3	79,3	76,5	82,0	69,0	65,8	72,2
Galicia	2.089	70,6	68,6	72,6	69,3	67,3	71,2	60,3	58,2	62,4
Madrid	4.321	74,9	73,6	76,2	73,2	71,9	74,5	63,1	61,6	64,5
Murcia	1.259	76,2	73,8	78,6	75,4	73,0	77,8	67,5	64,9	70,1
Navarra	773	85,9	83,4	88,3	85,3	82,8	87,8	71,3	68,1	74,5
País Vasco	1.286	83,5	81,4	85,5	82,0	79,9	84,1	73,1	70,7	75,5
La Rioja	1.076	78,6	76,1	81,0	77,5	75,0	80,0	70,3	67,6	73,1
Ceuta	319	38,3	33,0	43,7	37,1	31,8	42,4	31,2	26,1	36,3
Melilla	322	45,5	40,1	50,9	43,9	38,5	49,3	39,1	33,8	44,5
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>76,9</b>	<b>76,5</b>	<b>77,4</b>	<b>75,6</b>	<b>75,1</b>	<b>76,0</b>	<b>67,0</b>	<b>66,5</b>	<b>67,5</b>

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.39.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

	Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.970	49,9	48,1	51,7	42,8	41,1	44,6	22,2	20,7	23,7
Aragón	2.781	57,8	56,0	59,7	51,0	49,1	52,9	25,5	23,9	27,1
Asturias	1.898	46,4	44,1	48,6	41,0	38,8	43,2	22,0	20,2	23,9
Baleares	913	50,2	47,0	53,5	43,6	40,4	46,8	23,7	21,0	26,5
Canarias	3.214	39,1	37,4	40,8	31,7	30,1	33,3	13,7	12,5	14,9
Cantabria	1.859	49,4	47,1	51,7	43,0	40,8	45,3	24,8	22,9	26,8
Castilla y León	1.220	56,1	53,3	58,8	51,2	48,4	54,0	26,1	23,7	28,6
Castilla-La Mancha	2.133	54,7	52,6	56,8	47,3	45,2	49,5	25,3	23,5	27,1
Cataluña	2.617	44,1	42,2	46,0	39,4	37,5	41,3	21,1	19,6	22,7
C. Valenciana	3.502	53,0	51,3	54,6	45,9	44,2	47,5	24,6	23,2	26,1
Extremadura	817	52,7	49,3	56,2	44,5	41,1	47,9	21,3	18,5	24,1
Galicia	2.089	42,2	40,1	44,3	36,1	34,1	38,2	16,6	15,0	18,2
Madrid	4.321	47,2	45,7	48,7	39,8	38,4	41,3	19,3	18,1	20,4
Murcia	1.259	43,6	40,9	46,4	38,0	35,3	40,6	21,0	18,8	23,3
Navarra	773	62,5	59,1	66,0	57,6	54,1	61,1	27,8	24,6	30,9
País Vasco	1.286	56,0	53,3	58,7	49,2	46,5	51,9	25,1	22,7	27,4
La Rioja	1.076	53,7	50,7	56,7	48,3	45,3	51,3	24,8	22,2	27,4
Ceuta	319	19,8	15,4	24,2	14,2	10,4	18,0	7,6	4,7	10,5
Melilla	322	20,5	16,1	24,9	15,5	11,6	19,5	8,6	5,5	11,7
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>48,9</b>	<b>48,4</b>	<b>49,4</b>	<b>42,4</b>	<b>41,9</b>	<b>42,9</b>	<b>21,8</b>	<b>21,3</b>	<b>22,2</b>

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.40.

Prevalencia de binge drinking entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

	Muestra	Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.970	33,0	31,3	34,7
Aragón	2.781	37,3	35,5	39,1
Asturias	1.898	35,2	33,1	37,4
Baleares	913	30,4	27,4	33,4
Canarias	3.214	24,7	23,2	26,2
Cantabria	1.859	33,2	31,0	35,3
Castilla y León	1.220	36,1	33,4	38,8
Castilla-La Mancha	2.133	37,5	35,4	39,5
Cataluña	2.617	27,4	25,7	29,1
C. Valenciana	3.502	36,9	35,3	38,4
Extremadura	817	36,0	32,8	39,3
Galicia	2.089	24,7	22,8	26,5
Madrid	4.321	28,2	26,9	29,6
Murcia	1.259	33,8	31,2	36,4
Navarra	773	36,2	32,8	39,6
País Vasco	1.286	34,8	32,1	37,4
La Rioja	1.076	36,9	34,0	39,8
Ceuta	319	10,6	7,2	14,0
Melilla	322	13,8	10,0	17,6
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>31,7</b>	<b>31,2</b>	<b>32,1</b>

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.41.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			A diario en los últimos 30 días			
	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	
Andalucía	2.970	37,6	35,9	39,3	34,2	32,5	35,9	27,5	25,9	29,2	8,6	7,6	9,6
Aragón	2.781	42,6	40,7	44,4	37,9	36,1	39,7	29,8	28,1	31,5	11,4	10,2	12,6
Asturias	1.898	36,0	33,8	38,2	32,9	30,7	35,0	25,9	23,9	27,9	8,3	7,0	9,5
Baleares	913	40,4	37,2	43,6	36,0	32,9	39,2	28,5	25,6	31,4	9,2	7,3	11,0
Canarias	3.214	33,5	31,9	35,1	28,4	26,9	30,0	22,2	20,7	23,6	6,1	5,3	6,9
Cantabria	1.859	35,8	33,6	38,0	33,0	30,8	35,1	26,1	24,1	28,1	8,9	7,6	10,2
Castilla y León	1.220	41,9	39,2	44,7	37,4	34,7	40,1	31,1	28,5	33,7	11,7	9,9	13,6
Castilla-La Mancha	2.133	38,1	36,0	40,1	34,1	32,1	36,1	26,4	24,5	28,3	8,0	6,9	9,2
Cataluña	2.617	39,8	38,0	41,7	35,6	33,8	37,5	26,9	25,2	28,6	9,2	8,1	10,3
C. Valenciana	3.502	41,1	39,5	42,8	37,2	35,6	38,8	29,1	27,6	30,6	9,3	8,4	10,3
Extremadura	817	37,1	33,8	40,5	33,2	30,0	36,5	28,2	25,1	31,3	10,4	8,3	12,5
Galicia	2.089	33,5	31,5	35,5	31,1	29,1	33,1	22,7	20,9	24,5	6,0	5,0	7,1
Madrid	4.321	37,7	36,2	39,1	34,0	32,6	35,5	27,2	25,9	28,5	8,1	7,3	9,0
Murcia	1.259	34,8	32,2	37,4	31,7	29,1	34,2	25,3	22,9	27,8	6,8	5,4	8,2
Navarra	773	41,0	37,5	44,5	37,0	33,6	40,4	29,7	26,5	32,9	9,7	7,6	11,8
País Vasco	1.286	44,0	41,3	46,7	40,8	38,1	43,5	30,8	28,2	33,3	11,4	9,7	13,2
La Rioja	1.076	40,4	37,5	43,3	36,9	34,0	39,7	29,1	26,4	31,9	9,7	7,9	11,4
Ceuta	319	26,1	21,3	30,9	24,2	19,5	28,9	20,0	15,6	24,4	5,1	2,7	7,5
Melilla	322	22,3	17,7	26,8	21,3	16,8	25,7	18,9	14,6	23,2	4,9	2,5	7,2
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>38,5</b>	<b>38,0</b>	<b>39,0</b>	<b>34,7</b>	<b>34,2</b>	<b>35,2</b>	<b>27,3</b>	<b>26,8</b>	<b>27,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>	<b>9,1</b>

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.42.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

	Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.970	26,1	24,5	27,6	21,9	20,4	23,4	15,1	13,8	16,4
Aragón	2.781	30,7	29,0	32,5	26,2	24,6	27,8	17,9	16,5	19,3
Asturias	1.898	27,7	25,7	29,7	22,5	20,6	24,4	16,6	14,9	18,2
Baleares	913	34,2	31,1	37,3	28,3	25,4	31,2	20,1	17,5	22,7
Canarias	3.214	27,7	26,1	29,2	23,8	22,3	25,3	16,7	15,4	18,0
Cantabria	1.859	30,2	28,1	32,3	25,5	23,5	27,5	18,6	16,9	20,4
Castilla y León	1.220	32,2	29,6	34,8	28,1	25,6	30,6	18,5	16,3	20,7
Castilla-La Mancha	2.133	28,6	26,6	30,5	24,2	22,3	26,0	16,4	14,9	18,0
Cataluña	2.617	34,9	33,1	36,8	28,3	26,6	30,0	20,3	18,8	21,9
C. Valenciana	3.502	37,2	35,6	38,8	31,7	30,1	33,2	22,8	21,5	24,2
Extremadura	817	26,8	23,7	29,8	21,3	18,5	24,1	15,4	12,9	17,8
Galicia	2.089	25,5	23,6	27,4	22,2	20,4	24,0	15,5	14,0	17,1
Madrid	4.321	31,5	30,1	32,8	26,7	25,4	28,0	17,9	16,8	19,1
Murcia	1.259	26,0	23,6	28,5	22,3	20,0	24,6	16,4	14,4	18,5
Navarra	773	38,6	35,1	42,0	33,5	30,2	36,8	22,1	19,2	25,1
País Vasco	1.286	41,1	38,4	43,8	36,9	34,3	39,6	25,6	23,2	27,9
La Rioja	1.076	31,6	28,8	34,4	27,0	24,4	29,7	17,7	15,4	20,0
Ceuta	319	21,9	17,4	26,4	19,0	14,7	23,3	13,2	9,5	16,9
Melilla	322	21,1	16,7	25,6	16,1	12,1	20,1	12,0	8,5	15,6
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>31,1</b>	<b>30,6</b>	<b>31,6</b>	<b>26,3</b>	<b>25,8</b>	<b>26,7</b>	<b>18,3</b>	<b>17,9</b>	<b>18,7</b>

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.43.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes (con o sin receta) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

	Muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.970	18,3	16,9	19,7	11,7	10,5	12,8	5,4	4,6	6,2
Aragón	2.781	14,7	13,4	16,0	9,9	8,8	11,1	4,8	4,0	5,6
Asturias	1.898	18,5	16,8	20,3	12,6	11,1	14,1	6,0	4,9	7,0
Baleares	913	18,6	16,1	21,1	11,8	9,7	13,9	6,0	4,5	7,6
Canarias	3.214	17,6	16,3	18,9	11,6	10,5	12,7	4,9	4,2	5,7
Cantabria	1.859	16,1	14,4	17,8	11,5	10,0	12,9	5,9	4,8	6,9
Castilla y León	1.220	15,2	13,2	17,2	9,3	7,7	11,0	4,8	3,6	6,0
Castilla-La Mancha	2.133	12,9	11,5	14,4	8,0	6,8	9,1	3,7	2,9	4,5
Cataluña	2.617	20,4	18,9	22,0	12,8	11,5	14,1	7,0	6,1	8,0
C. Valenciana	3.502	20,5	19,2	21,8	13,7	12,5	14,8	7,1	6,3	8,0
Extremadura	817	16,4	13,8	18,9	10,6	8,5	12,7	4,8	3,4	6,3
Galicia	2.089	17,5	15,8	19,1	10,8	9,5	12,2	5,4	4,5	6,4
Madrid	4.321	16,7	15,6	17,8	10,9	9,9	11,8	5,9	5,2	6,6
Murcia	1.259	19,6	17,4	21,8	14,1	12,2	16,1	6,9	5,5	8,3
Navarra	773	19,5	16,7	22,3	13,2	10,8	15,6	6,4	4,7	8,1
País Vasco	1.286	15,4	13,5	17,4	11,0	9,2	12,7	6,2	4,9	7,5
La Rioja	1.076	14,8	12,7	16,9	9,6	7,9	11,4	5,2	3,9	6,5
Ceuta	319	12,0	8,4	15,6	7,9	5,0	10,9	4,7	2,4	7,1
Melilla	322	15,4	11,5	19,4	8,0	5,0	11,0	4,0	1,8	6,1
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>17,9</b>	<b>17,5</b>	<b>18,3</b>	<b>11,6</b>	<b>11,3</b>	<b>11,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.44.

Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

	Muestra	Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
		Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia (%)	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	2.970	54,7	52,9	56,4	28,4	26,7	30,0
Aragón	2.781	62,4	60,6	64,2	27,5	25,9	29,2
Asturias	1.898	47,2	44,9	49,4	17,9	16,2	19,7
Baleares	913	49,5	46,3	52,8	24,0	21,2	26,7
Canarias	3.214	32,5	30,8	34,1	12,3	11,2	13,5
Cantabria	1.859	57,6	55,4	59,9	36,9	34,7	39,1
Castilla y León	1.220	59,2	56,5	62,0	26,6	24,2	29,1
Castilla-La Mancha	2.133	62,8	60,7	64,8	33,9	31,9	35,9
Cataluña	2.617	46,3	44,4	48,3	20,2	18,7	21,7
C. Valenciana	3.502	52,5	50,8	54,1	24,2	22,8	25,6
Extremadura	817	70,6	67,5	73,7	35,6	32,3	38,9
Galicia	2.089	45,7	43,6	47,9	23,2	21,4	25,1
Madrid	4.321	48,4	46,9	49,9	18,3	17,1	19,4
Murcia	1.259	55,7	53,0	58,5	26,2	23,7	28,6
Navarra	773	60,0	56,6	63,5	24,2	21,2	27,3
País Vasco	1.286	61,7	59,0	64,4	27,8	25,3	30,2
La Rioja	1.076	55,2	52,3	58,2	26,9	24,3	29,6
Ceuta	319	23,3	18,7	28,0	13,7	9,9	17,4
Melilla	322	25,6	20,9	30,4	15,3	11,4	19,3
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>52,0</b>	<b>51,5</b>	<b>52,6</b>	<b>24,1</b>	<b>23,7</b>	<b>24,6</b>

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.45.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

	Muestra	Edad media inicio en el consumo de			
		Tabaco	Tabaco diario	Alcohol	Cannabis
Andalucía	2.970	14,1	14,6	14,0	14,9
Aragón	2.781	13,6	14,1	13,5	14,6
Asturias	1.898	14,1	14,6	13,9	14,9
Baleares	913	14,1	14,8	14,0	14,7
Canarias	3.214	14,1	14,6	14,1	14,6
Cantabria	1.859	14,1	14,3	14,0	14,8
Castilla y León	1.220	14,0	14,5	13,8	15,0
Castilla-La Mancha	2.133	14,1	14,7	14,0	15,1
Cataluña	2.617	14,0	14,6	13,9	14,6
C. Valenciana	3.502	14,2	14,7	13,9	14,8
Extremadura	817	14,0	14,3	14,0	15,1
Galicia	2.089	14,6	15,0	14,4	15,1
Madrid	4.321	14,2	14,9	14,1	15,0
Murcia	1.259	14,1	14,6	14,0	14,7
Navarra	773	13,9	14,5	13,6	14,5
País Vasco	1.286	14,2	14,7	13,7	14,7
La Rioja	1.076	14,2	14,6	13,8	14,8
Ceuta	319	14,4	15,2	14,0	15,0
Melilla	322	13,8	14,4	14,1	15,0
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>14,1</b>	<b>14,6</b>	<b>14,0</b>	<b>14,8</b>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.46.

Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según cómo estén informados respecto al tema de las drogas (%). España, 2016.

	Muestra	Información con respecto al tema de las drogas	
		Perfectamente informado	Mal informado
Andalucía	2.970	30,5	7,8
Aragón	2.781	31,1	6,2
Asturias	1.898	36,7	8,1
Baleares	913	33,8	8,1
Canarias	3.214	36,8	5,9
Cantabria	1.859	38,5	8,1
Castilla y León	1.220	35,1	4,4
Castilla-La Mancha	2.133	30,6	7,9
Cataluña	2.617	28,9	8,6
C. Valenciana	3.502	33,0	7,4
Extremadura	817	29,7	8,6
Galicia	2.089	34,2	6,9
Madrid	4.321	31,2	6,5
Murcia	1.259	33,6	7,2
Navarra	773	25,9	6,0
País Vasco	1.286	22,0	9,0
La Rioja	1.076	36,6	6,8
Ceuta	319	31,7	17,9
Melilla	322	32,9	19,6
<b>Total</b>	<b>35.369</b>	<b>31,3</b>	<b>7,5</b>

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.47.

Valoración (algo o muy importante) de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%)\* por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016.


	Campañas publicitarias	Educación en las escuelas	Tratamiento voluntario a consumidores	Tratamiento obligatorio a consumidores	Administración médica de metadona	Administración médica de heroína	Control policial y aduanero	Leyes estrictas contra las drogas	Legalización de cannabis	Legalización de todas las drogas
Andalucía	92,6	97,3	95,2	92,0	88,0	81,2	95,4	90,9	51,2	36,9
Aragón	88,9	95,4	95,3	91,3	87,4	79,9	92,5	88,0	53,8	34,9
Asturias	89,3	95,8	95,1	91,5	88,1	78,9	92,5	87,4	53,6	35,6
Baleares	92,0	96,5	96,1	92,9	91,0	88,4	94,2	91,3	59,3	42,5
Canarias	90,7	96,3	95,7	92,2	90,5	84,6	94,4	90,3	57,0	40,7
Cantabria	91,3	96,4	95,1	92,9	89,3	83,0	93,0	90,2	54,8	40,5
Castilla y León	92,7	97,4	96,3	91,7	90,3	82,8	92,7	88,9	54,1	34,8
Castilla-La Mancha	91,3	97,0	95,4	92,1	89,8	82,4	93,0	88,3	54,3	38,1
Cataluña	90,9	95,0	93,9	90,2	89,5	85,5	91,4	86,7	59,1	42,6
C. Valenciana	89,0	95,4	94,6	90,3	88,6	82,4	92,6	88,2	56,1	37,2
Extremadura	94,6	97,4	96,6	93,0	91,1	82,4	95,0	91,1	51,7	34,9
Galicia	91,2	96,7	95,7	91,6	89,8	81,3	93,2	89,2	52,2	33,0
Madrid	91,9	97,3	95,8	92,4	90,8	82,6	93,8	89,4	55,3	36,7
Murcia	92,9	95,7	96,2	93,5	91,6	85,8	92,6	90,1	53,5	40,4
Navarra	90,8	95,4	96,1	89,6	85,5	77,1	88,1	82,9	64,3	39,6
País Vasco	88,6	95,0	94,2	90,8	84,8	74,3	89,8	85,1	60,6	39,8
La Rioja	90,6	96,3	94,1	90,0	91,0	83,1	93,5	87,6	55,3	36,1
Ceuta	93,0	95,0	97,5	93,5	92,0	84,0	94,5	92,9	59,0	49,9
Melilla	84,1	95,5	91,7	86,7	87,5	80,7	91,7	87,9	55,8	49,7
<b>Total</b>	<b>91,3</b>	<b>96,4</b>	<b>95,2</b>	<b>91,6</b>	<b>89,3</b>	<b>82,5</b>	<b>93,2</b>	<b>88,9</b>	<b>55,1</b>	<b>38,0</b>

\* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.48.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.




68,7 73,8 70,6 68,9 60,9 68,8 71,1 72,5 61,9 72,6 69,0 60,3 63,1 67,5 71,3 73,1 70,3 31,2 39,1

Error de estimación: 0,5; Límite inferior: 66,5; Límite superior: 67,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.49.

Prevalencia de consumo de tabaco a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.




8,6	11,4	8,3	9,2	6,1	8,9	11,7	8,0	9,2	9,3	10,4	6,0	8,1	6,8	9,7	11,4	9,7	5,1	4,9
-----	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

Error de estimación: 0,3; Límite inferior: 8,5; Límite superior: 9,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.50.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.





15,1	17,9	16,6	20,1	16,7	18,6	18,5	16,4	20,3	22,8	15,4	15,5	17,9	16,4	22,1	25,6	17,7	13,2	12,0
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Error de estimación: 0,4; Límite inferior: 17,9; Límite superior: 18,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.51.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.




22,2 25,5 22,0 23,7 13,7 24,8 26,1 25,3 21,1 24,6 21,3 16,6 19,3 21,0 27,8 25,1 24,8 7,6 8,6

Error de estimación: 0,4; Límite inferior: 21,3; Límite superior: 22,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.52.

Prevalencias de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.




33,0	37,3	35,2	30,4	24,7	33,2	36,1	37,5	27,4	36,9	36,0	24,7	28,2	33,8	36,2	34,8	36,9	10,6	13,8
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Error de estimación: 0,5; Límite inferior: 31,2; Límite superior: 32,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.53.

Prevalencias de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.





54,7	62,4	47,2	49,5	32,5	57,6	59,2	62,8	46,3	52,5	70,6	45,7	48,4	55,7	60,0	61,7	55,2	23,3	25,6
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Error de estimación: 0,5; Límite inferior: 51,5; Límite superior: 52,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.54.

Prevalencias de hipnosedantes (con o sin receta) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.




11,7	9,9	12,6	11,8	11,6	11,5	9,3	8,0	12,8	13,7	10,6	10,8	10,9	14,1	13,2	11,0	9,6	7,9	8,0
------	-----	------	------	------	------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----

Error de estimación: 0,3; Límite inferior: 11,3; Límite superior: 11,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.55.

Dinero disponible a la semana para gastos personales por término medio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (euros). España, 2016.




16,9	17,8	20,0	21,2	21,1	19,4	17,0	16,0	19,9	18,9	15,0	20,1	17,4	16,9	16,1	15,6	18,7	25,3	25,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Error de estimación: 0,2; Límite inferior: 17,8; Límite superior: 18,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.56.

Valoración de la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%)\* por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016.



51,2	53,8	53,6	59,3	57,0	54,8	54,1	54,3	59,1	56,1	51,7	52,2	55,3	53,5	64,3	60,6	55,3	59,0	55,8
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


\* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

Error de estimación: 0,5; Límite inferior: 54,6; Límite superior: 55,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.57.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.




24,8	17,6	12,4	19,1	16,3	16,0	18,6	15,3	22,6	19,8	15,9	13,6	21,0	15,8	14,6	18,5	17,3	23,7	18,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Error de estimación: 0,4; Límite inferior: 19,6; Límite superior: 20,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.58.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo semanal, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9
Últimos 12 meses	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6
Últimos 30 días	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0
Borracheras últimos 30 días	16,1	15,3	16,5	21,7	20,2	28,0	25,6	29,1	35,6	30,8	22,2	21,8
Binge drinking últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	-	41,4	36,7	41,8	32,2	31,7
Edad media de inicio consumo	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,9	13,8	14,0
Edad media de consumo semanal	-	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,0	14,8	14,8	15,1	15,0	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.59.

Prevalencia de consumo diario de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	14-17 años
Hombres	1,0	2,3	1,5	2,8	2,3	1,8
Mujeres	0,4	1,3	1,7	1,4	2,3	1,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.60.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo habitual y disponibilidad percibida de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Consumo últimos 12 meses	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6
Consumo últimos 30 días	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0
Disponibilidad percibida	93,8	89,0	90,5	91,2	92,0	93,8	91,2	90,8	93,3	92,9	91,4	93,0
Riesgo percibido 5 o 6 cañas /copas fin de semana	43,8	45,2	44,8	44,9	44,8	41,2	51,3	47,2	47,0	47,5	55,3	56,1
Riesgo percibido 1 o 2 cañas /copas diariamente	50,2	48,5	45,9	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7	57,8	52,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.61.

Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (%). España, 2016.




	Vino	Cerveza	Licores fuertes	Combinados/cubatas	Vermut/jerez/fino	Licores de frutas
Laborables	7,2	17,8	6,8	12,6	2,9	8,0
Fin de semana	21,4	39,3	28,3	55,2	6,8	28,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.62.

Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida y edad (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.63.


Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días según edad y sexo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.64.

Prevalencia de consumo de atracción de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida tanto en fin de semana como en días laborables, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.65.


Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 1994-2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.66.

Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según edad y sexo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.67.

Prevalencias de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.

	HOMBRES						MUJERES					
	14	15	16	17	14-17	18	14	15	16	17	14-17	18
Borrracheras alguna vez	19,9	39,2	53,6	68,5	44,3	73,0	26,4	45,7	58,2	70,9	49,7	76,6
Borrracheras últimos 12 meses	15,3	33,0	47,4	60,6	38,2	64,7	22,3	39,3	51,2	62,3	43,3	66,1
Borrracheras últimos 30 días	6,5	14,4	25,1	35,3	19,7	40,5	9,2	17,4	26,1	32,6	21,1	40,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.68.

Consumo de riesgo de alcohol de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han informado sobre el tipo de bebidas consumidas en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	17-18 años	18 años
<b>HOMBRES</b>							
Bebedor de riesgo (más de 49 cc al día)	4,6	1,7	4,9	3,9	5,0	4,1	8,1
No bebedor de riesgo (menos de 50 cc al día)	95,4	98,3	95,1	96,1	95,0	95,9	91,9
<b>MUJERES</b>							
Bebedor de riesgo (más de 29 cc al día)	6,3	3,4	5,7	6,3	6,5	5,8	11,2
No bebedor de riesgo (menos de 30 cc al día)	93,7	96,6	94,3	93,7	93,5	94,2	88,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.69.

Prevalencias de consumo de riesgo de bebidas alcohólicas\* según equivalencias de alcohol por tipo de bebida en centímetros cúbicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking o botellón en los últimos 30 días (%). España, 2016.


	Borracheras		Binge drinking		Botellón	
	en los últimos 30 días		en los últimos 30 días		en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
<b>HOMBRES</b>						
50 cc al día o más (bebedor riesgo)	7,9	2,2	7,0	0,5	8,1	2,0
Menos de 50 cc al día (no riesgo)	92,1	97,8	93,0	99,5	91,9	98,0
<b>MUJERES</b>						
30 cc al día o más (bebedor riesgo)	11,8	2,5	10,4	0,9	10,7	3,1
Menos de 30 cc al día (no riesgo)	88,2	97,5	89,6	99,1	89,3	96,9

\* La base son los alumnos que han consumido en los últimos 30 días y han contestado las bebidas consumidas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.70.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2016.




	Vino	Cerveza	Licores fuertes	Combinados/cubatas	Vermut/jerez/fino	Licores de frutas
14 años	46,1	63,1	71,1	94,8	22,7	65,2
15 años	43,1	73,4	72,5	96,6	22,6	61,3
16 años	39,6	75,4	65,9	97,1	16,6	53,9
17 años	42,9	81,2	57,2	96,6	16,0	42,6
18 años	48,9	82,5	59,5	98,0	19,7	43,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.71.


Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida, tanto en fin de semana como en días laborables, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.72.


Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.73.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016.




	Total	Hombres	Mujeres
Supermercados	37,3	36,0	38,7
Bares o pubs	34,8	33,4	36,2
Tiendas de barrio*	34,7	35,4	34,0
Discotecas	27,7	26,1	29,3
Casa de otras personas	18,7	17,9	19,5
Hipermercados	17,5	18,9	16,1
Casa donde vives	13,1	14,1	12,2
Venta ambulante	3,4	4,3	2,5
Internet o venta telefónica	0,7	1,0	0,4

\* Tiendas de barrio, "chinos", quioscos, bodegas...

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.74.

Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016.




\* Espacios públicos abiertos: calles, plazas, parques, playas...

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.75.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.76.

Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Total	Hombres	Mujeres
Alcohol	2,5	3,9	1,1
Cannabis	1,8	2,9	0,8
Cocaína	0,3	0,6	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.77.

Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Alcohol	2,5	0,8	1,8	2,6	4,2	2,3	5,4
Cannabis	1,8	0,6	1,4	2,0	2,9	1,7	3,9
Cocaína	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3	0,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.78.

Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Total	Hombres	Mujeres
Alcohol	17,2	16,4	17,9
Cannabis	9,1	9,4	8,8
Cocaína	1,8	2,1	1,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.79.

Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Alcohol	17,2	8,6	13,4	19,0	24,5	16,2	30,8
Cannabis	9,1	3,0	6,4	9,2	14,7	8,1	22,1
Cocaína	1,8	0,9	1,3	1,8	2,5	1,6	4,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.80.

Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Total	Hombres	Mujeres
Sin especificar consumo	1,7	2,6	0,8
Alcohol	0,4	0,6	0,2
Cannabis	0,3	0,5	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.81.

Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Sin especificar consumo	1,7	0,9	1,6	1,8	2,6	1,7	2,8
Alcohol	0,4	0,3	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5
Cannabis	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.82.

Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido o no alguna sustancia psicoactiva, según sexo (%). España, 2016.




	Total	Hombres	Mujeres
Sin especificar consumo	14,1	18,5	9,7
Alcohol	5,2	6,4	4,0
Cannabis	2,5	3,4	1,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.83.

Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido o no alguna sustancia psicoactiva, según edad (%). España, 2016.



	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Sin especificar consumo	14,1	10,8	14,4	14,5	15,4	13,7	19,9
Alcohol	5,2	2,0	4,2	5,9	7,3	4,8	11,1
Cannabis	2,5	0,9	2,4	2,8	3,3	2,3	5,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.84.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, por sexo y edad (%). España, 2016.

	Hombres	Mujeres	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años	Total
Alguna vez en la vida	75,7	78,2	57,1	75,4	83,1	89,9	75,8	91,9	76,9
Últimos 12 meses	74,3	76,9	55,3	73,9	82,1	88,7	74,5	90,6	75,6
Últimos 30 días	65,9	68,1	46,1	64,6	73,1	81,2	65,7	84,5	67,0
Borracheras últimos 30 días	21,2	22,3	7,9	15,8	25,6	33,9	20,4	40,4	21,8
Binge drinking últimos 30 días	32,3	31,0	13,9	26,4	35,9	45,0	29,8	56,6	31,7
Edad media de inicio consumo	13,9	14,0	12,9	13,6	14,2	14,4	13,9	14,7	14,0
Edad media de consumo alcohol semanal	15,1	15,1	13,2	14,1	15,1	15,7	14,9	16,3	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.85.

Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio del consumo (años)	13,1	13,8	13,5	14,0	13,5	14,0	13,4	13,8	13,4	13,8	13,6	13,9	13,7	13,8	13,6	13,8	13,7	13,7	13,8	13,9	13,8	13,9	13,9	14,0
Edad media de inicio del consumo de alcohol semanal (años)	-	-	15,0	15,0	15,0	15,1	14,8	14,9	15,0	14,9	15,2	15,1	15,0	14,9	14,9	14,8	14,8	14,7	15,1	15,0	15,1	14,9	15,1	15,1
Prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida	84,3	84,0	84,3	84,1	85,5	86,4	78,2	77,9	75,9	77,2	81,5	82,5	78,4	80,7	80,8	81,7	74,9	75,2	82,9	84,9	77,8	80,1	75,7	78,2
Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses	82,8	82,7	82,3	82,5	83,0	84,5	77,3	77,3	74,9	76,3	80,6	81,5	73,4	76,3	71,5	74,2	73,3	73,8	80,9	82,9	75,3	78,2	74,3	76,9
Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días	75,3	74,9	66,8	66,7	67,5	68,5	60,4	59,9	56,7	55,4	65,5	65,7	58,1	58,0	57,7	59,4	62,7	63,2	72,9	75,2	66,9	69,5	65,9	68,1
Prevalencia de consumo de alcohol en fin de semana en los últimos 30 días	-	-	66,0	66,4	67,0	68,1	60,1	59,8	56,3	55,2	65,1	65,5	57,7	57,7	61,2	61,3	71,3	71,5	70,1	72,8	63,0	66,5	63,4	66,2
Prevalencia de consumo de alcohol en días laborables los últimos 30 días	-	-	26,8	14,9	26,0	16,1	30,0	16,8	20,8	10,6	26,5	14,1	24,2	13,9	28,4	17,8	33,1	21,4	35,3	25,6	28,8	22,4	30,2	23,9

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.86.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según edad y sexo. España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
<b>Prevalencia de consumo alguna vez en la vida</b>												
Total	84,1	84,2	86,0	78,0	76,6	82,0	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9
<b>Sexo</b>												
Hombre	84,3	84,3	85,5	78,2	75,9	81,5	78,4	80,8	74,9	82,9	77,8	75,7
Mujer	84,0	84,1	86,4	77,9	77,2	82,5	80,7	81,7	75,2	84,9	80,1	78,2
<b>Edad</b>												
14 años	69,6	67,6	71,5	52,4	52,7	59,2	57,1	62,6	49,7	65,9	60,1	57,1
5 años	81,8	81,7	82,5	73,4	70,4	76,6	76,1	78,7	71,5	77,7	73,7	75,4
16 años	88,0	88,7	89,7	83,1	81,7	86,9	86,0	86,2	81,6	86,2	84,1	83,1
17 años	91,9	91,3	92,8	89,6	89,0	91,9	91,2	90,5	87,8	90,8	90,6	89,9
18 años	92,5	93,4	96,2	93,8	92,2	93,8	92,3	92,3	88,6	92,6	92,4	91,9
<b>Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses</b>												
Total	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81,0	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8	75,6
<b>Sexo</b>												
Hombre	82,8	82,3	83,0	77,3	74,9	80,6	73,4	71,5	73,3	80,9	75,3	74,3
Mujer	82,7	82,5	84,5	77,3	76,3	81,5	76,3	74,2	73,8	82,9	78,2	76,9
<b>Edad</b>												
14 años	67,7	64,3	67,9	51,5	52,0	57,9	50,9	53,1	48,0	63,1	57,4	55,3
15 años	80,4	79,7	80,5	72,7	69,7	75,6	70,9	69,6	70,0	75,3	71,2	73,9
16 años	86,7	87,4	88,0	82,4	80,9	85,9	82,1	77,6	80,3	84,2	82,2	82,1
17 años	90,7	89,9	90,9	88,7	87,6	91,1	87,4	84,1	86,1	89,2	88,7	88,7
18 años	91,1	92,4	94,1	93,3	91,2	93,0	88,2	84,2	86,4	91,3	90,7	90,6
<b>Prevalencia de consumo en los últimos 30 días</b>												
Total	75,1	66,7	68,1	60,2	56,0	65,6	58,0	58,5	63,0	74,0	68,2	67,0
<b>Sexo</b>												
Hombre	75,3	66,8	67,5	60,4	56,7	65,5	58,1	57,7	62,7	72,9	66,9	65,9
Mujer	74,9	66,7	68,5	59,9	55,4	65,7	58,0	59,4	63,2	75,2	69,5	68,1
<b>Edad</b>												
14 años	56,7	40,1	43,2	32,1	27,7	38,0	31,7	36,2	38,1	53,2	48,4	46,1
15 años	71,8	60,1	62,2	51,8	47,7	57,7	50,7	52,9	58,9	66,0	61,3	64,6
16 años	80,0	74,1	73,4	65,7	61,6	71,9	65,3	63,8	70,0	75,6	74,0	73,1
17 años	85,1	79,4	81,1	73,7	71,5	78,2	74,2	71,9	74,8	82,4	80,8	81,2
18 años	86,2	84,1	85,0	82,7	76,8	81,5	76,5	75,1	77,1	86,4	84,8	84,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.87.

Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	57,0	55,9	58,2	75,4	73,1	78	83	82,0	84	90	89,7	90,0	75,8	74,5	77,2	91,9	91,3	92,6
Últimos 12 meses	55,0	53,8	56,8	73,9	71,4	76,6	82,1	81,0	83,2	88,7	88,4	88,9	74,5	73,0	75,9	90,6	90,6	90,7
Últimos 30 días	46,0	44,4	47,8	64,6	62,8	66,6	73,1	72,4	73,8	81,2	80,8	82	66	64,4	67,0	84,5	85,4	83,5
Diario en los últimos 30 días	0,7	1,0	0,4	1,8	2,3	1,3	1,6	1,5	1,7	2,1	2,8	1,4	1,5	1,8	1,2	2,3	2,3	2,3
Nunca	43,0	44,1	41,8	24,6	26,9	22,1	16,9	18,0	15,7	10,1	10,3	10,0	8,1	8,7	7,4	24,2	25,5	22,8

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.88.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2016.

	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Vermut/jerez/fino	7,7	4,6	8,0	8,0	9,2	7,3	13,4
Vino/champán	23,3	15,5	22,2	23,8	29,2	22,3	37,0
Licores fuertes	29,2	16,0	28,1	34,1	36,5	28,3	41,9
Licores de frutas	29,7	21,7	31,7	32,9	32,6	29,4	33,8
Cerveza/sidra	40,5	19,6	34,8	45,3	57,1	38,8	63,5
Combinados/cubatas	55,7	32,2	51,4	63,1	71,8	54,1	77,4
Cualquier bebida alcohólica	67,0	46,1	64,6	73,1	81,2	65,7	84,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.89.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas algún fin de semana (1, 2 o 3), todos los fines de semana, algún día laborable (1, 2 o 3 por semana) y todos los días laborables en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Algún fin de semana (1, 2 o 3)	Todos los fines de semana	Algún día laborable (1, 2 o 3 por semana)	Todos los días laborables
Total	51,3	12,8	22,8	2,1
Sexo				
Hombres	48,8	13,8	25,0	2,8
Mujeres	53,8	11,8	20,5	1,4
Edad				
14 años	37,2	3,9	12,7	1,2
15 años	51,4	9,5	20,1	2,1
16 años	57,1	13,8	23,0	2,1
17 años	59,9	19,9	31,6	2,5
14-17 años	51,1	11,6	21,5	2,0
18 años	53,6	29,7	39,8	4,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.90.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2016.

	Total		14 años		15 años		16 años		17 años		14-17 años		18 años	
	Días laborables	Fin de semana												
Vino/champán	7,2	21,4	5,1	13,9	7,6	19,9	6,4	22,2	8,5	27,2	6,8	20,5	13,1	34,4
Cerveza/sidra	17,8	39,3	7,1	18,3	14,0	33,4	18,2	44,1	28,0	56,0	16,5	37,6	36,3	62,1
Vermut/jerez/fino	2,9	6,8	2,0	4,1	3,4	6,9	2,6	7,3	3,3	8,2	2,8	6,5	4,9	11,4
Combinados/cubatas	12,6	55,2	8,1	31,4	12,8	51,0	13,2	62,5	14,9	71,3	12,1	53,6	20,1	77,2
Licores de frutas	8,0	28,4	7,0	20,3	9,1	30,6	8,1	31,6	7,5	31,2	7,9	28,1	10,2	31,9
Licores fuertes	6,8	28,3	4,8	15,1	7,4	27,2	6,9	33,2	7,7	35,8	6,6	27,4	9,4	40,9
Cualquier bebida alcohólica	27,1	64,8	15,8	42,2	24,7	61,7	27,5	71,4	36,1	80,1	25,6	63,4	46,4	83,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.91.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2016.

Total		14 años				15 años				16 años				17 años				14-17 años				18 años							
Días laborables		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana		Días laborables		Fin de semana					
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
Vino/champán		8,4	6,0	21,8	21,0	5,8	4,4	14,4	13,4	8,7	6,5	21,4	18,4	7,5	5,4	22,5	21,9	9,9	7,2	27,3	27,1	7,8	5,8	21,0	20,0	16,1	9,9	33,4	35,4
Cerveza/sidra		20,9	14,8	42,4	36,1	7,9	6,3	20,2	16,4	16,7	11,3	36,1	30,6	21,4	15,0	47,4	40,9	33,1	23,0	60,7	51,4	19,2	13,7	40,5	34,6	41,2	30,6	66,5	57,2
Vermut/jerez/fino		3,7	2,2	8,0	5,6	2,4	1,5	4,5	3,6	3,9	2,9	8,1	5,6	3,4	1,8	8,6	6,0	4,7	2,0	10,1	6,4	3,5	2,0	7,6	5,4	5,4	4,3	13,1	9,6
Combinados/cubatas		14,8	10,4	53,0	57,4	8,5	7,6	28,0	34,9	14,9	10,7	48,2	53,9	15,5	11,0	60,8	64,2	18,6	11,4	69,8	72,7	14,1	10,1	51,0	56,0	24,4	15,4	77,4	76,8
Licores de frutas		9,2	6,9	27,3	29,4	7,7	6,4	18,3	22,3	10,4	7,8	29,2	32,0	8,9	7,4	30,9	32,2	9,3	5,8	30,4	32,0	9,0	6,8	26,9	29,4	11,9	8,3	34,0	29,5
Licores fuertes		8,6	5,0	29,5	27,1	5,6	3,9	14,7	15,6	8,9	5,9	26,5	27,8	8,4	5,4	35,1	31,3	10,5	5,0	38,8	32,8	8,2	5,0	28,3	26,6	14,0	4,2	45,8	35,5
Cualquier bebida alcohólica		30,2	23,9	63,4	66,2	16,4	15,1	39,7	44,7	27,7	21,5	59,2	64,3	30,8	24,2	70,5	72,3	41,0	31,2	79,7	80,5	28,4	22,8	61,7	65,0	51,9	40,0	84,4	82,6

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.92.


Evolución de la prevalencia de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en días laborables y fines de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1996-2016.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
<b>CONSUMO EN DÍAS LABORABLES</b>											
Algún día de lunes a jueves durante los últimos 30 días											
Vino	8,1	8,9	8,2	4,9	6,6	5,3	5,8	5,2	6,3	9,1	5,5
Cerveza	15,3	14,0	16,2	10,5	14,1	12,8	15,0	13,7	17,5	16,3	15,1
Vermut	3,0	3,2	2,6	1,7	2,4	3,0	4,1	3,6	5,6	5,8	2,1
Combinados	5,4	6,4	6,8	5,0	6,8	7,4	10,6	10,2	10,8	10,3	10,6
Licores fuertes	3,2	3,6	3,5	2,3	3,2	3,5	5,5	5,3	5,7	6,1	5,5
Licores frutas	6,6	7,5	6,2	3,8	4,2	4,6	6,6	5,3	6,5	7,6	6,6
Todos los días de lunes a jueves durante los últimos 30 días											
Vino	0,8	1,0	0,9	0,3	0,7	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Cerveza	1,7	1,5	2,2	0,9	1,7	0,8	1,1	0,7	1,2	0,8	1,0
Vermut	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,5	0,2
Combinados	0,2	0,3	0,6	0,2	0,6	0,4	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6
Licores fuertes	0,1	0,4	0,4	0,1	0,4	0,2	0,5	0,3	0,5	0,4	0,4
Licores frutas	0,3	0,8	0,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4
<b>CONSUMO EN FIN DE SEMANA</b>											
Algún día de viernes a domingo durante los últimos 30 días											
Vino	32,8	32,8	23,7	21,0	27,7	18,8	17,0	17,3	21,1	33,5	18,0
Cerveza	46,9	40,7	30,8	27,1	34,1	27,9	28,6	30,0	37,5	38,4	29,7
Vermut	12,0	13,6	9,6	8,0	11,0	8,3	8,4	9,4	11,8	13,2	5,1
Combinados	48,8	53,7	49,2	48,2	58,4	51,6	54,0	50,3	58,0	54,0	46,5
Licores fuertes	24,5	26,7	22,4	22,3	27,8	23,0	25,0	23,7	25,8	28,0	23,5
Licores frutas	36,2	37,1	25,6	22,6	26,0	20,6	20,8	18,3	23,6	27,7	24,4
Todos los días de viernes a domingo durante los últimos 30 días											
Vino	9,6	10,6	8,6	5,9	7,5	3,5	2,9	3,3	1,7	1,5	1,5
Cerveza	19,9	17,6	14,4	10,7	13,8	8,6	8,5	8,2	8,9	8,2	7,6
Vermut	2,9	4,2	3,3	2,1	2,7	1,5	1,9	2,2	1,8	1,7	0,7
Combinados	19,6	23,5	22,2	18,9	22,5	16,8	17,9	13,8	10,9	7,2	7,5
Licores fuertes	8,2	10,8	10,1	7,7	9,4	5,5	5,9	4,1	3,6	2,9	2,7
Licores frutas	10,2	12,0	9,0	6,0	6,8	3,8	3,5	2,5	2,2	1,8	1,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.93.

Evolución de la prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2008-2016.



	2008	2010	2012	2014	2016
Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14-18 años que han consumido alcohol en el mismo período	64,4	66,5	56,8	47,3	47,6
Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14-18 años	41,4	36,7	41,8	32,2	31,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.94.

Evolución de la prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016.

	Alguna vez en la vida					Últimos 12 meses					Últimos 30 días				
	2008	2010	2012	2014	2016	2008	2010	2012	2014	2016	2008	2010	2012	2014	2016
Total	56,2	58,8	60,7	50,1	48,9	47,1	52,9	52,0	42,6	42,4	29,1	35,6	30,8	22,2	21,8
Sexo															
Hombres	54,8	58,0	59,9	48,7	46,4	46,5	52,2	51,7	41,5	40,1	29,4	36,4	31,3	22,3	21,2
Mujeres	57,5	59,5	61,5	51,4	51,4	47,7	53,5	52,3	43,7	44,8	28,7	34,8	30,3	22,1	22,3
Edad															
14 años	30,4	27,8	31,5	23,2	23,1	24,5	24,6	26,1	19,0	18,8	13,4	16,0	12,7	7,6	7,9
15 años	48,5	52,2	47,4	39,8	42,4	41,0	47,3	40,2	33,6	36,1	24,2	32,0	21,3	14,9	15,8
16 años	62,2	66,2	62,3	56,5	55,9	53,0	59,8	53,4	48,8	49,3	31,7	38,8	30,9	26,4	25,6
17 años	72,6	76,8	73,1	69,1	69,7	59,7	69,1	62,6	59,0	61,5	39,0	46,6	38,8	33,1	33,9
18 años	76,9	77,8	80,4	74,1	74,7	65,8	69,8	70,5	63,4	65,4	45,2	52,8	46,5	37,5	40,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.95.

Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Más de una vez al mes*	Menos frecuentemente
Total	8,7	91,3
Sexo		
Hombres	9,6	90,4
Mujeres	7,9	92,1
Edad		
14 años	1,3	98,7
15 años	5,1	94,9
16 años	9,7	90,3
17 años	16,4	83,6
18 años	20,6	79,4

\* Se ha emborrachado 10 días o más al año.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.96.

Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado alguna vez en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Más de una vez al mes*	Menos frecuentemente
Total	20,6	79,4
Sexo		
Hombres	23,9	76,1
Mujeres	17,6	82,4
Edad		
14 años	6,7	93,3
15 años	14,1	85,9
16 años	19,7	80,3
17 años	26,6	73,4
18 años	31,5	68,5

\* Se ha emborrachado 10 días o más al año.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.97.

Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016.

	Comprado/conseguido			Consumido		
	Total	14-17 años	18 años	Total	14-17 años	18 años
Supermercados	37,3	35,2	63,1	-	-	-
Bares o pubs	34,8	32,7	60,4	34,4	32,1	63,7
Discotecas	27,7	25,4	56,1	29,0	26,6	58,8
Tiendas de barrio, chinos, quioscos, bodegas	34,7	34,5	37,1	-	-	-
Hipermercados	17,5	16,0	35,9	-	-	-
Casa de otras personas	18,7	18,4	22,5	26,5	25,6	39,0
Casa donde vives	13,1	12,3	22,8	14,5	13,4	28,5
Internet	0,7	0,7	0,7	-	-	-
Venta ambulante	3,4	3,4	3,4	-	-	-
En calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos	-	-	-	33,6	33,1	40,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.98.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Supermercados	37,3	36,0	38,7	14,2	12,2	16,2	30,4	27,0	34,0	42,0	40,8	43,3	53,5	54,1	52,9	35,2	33,6	36,8	63,1	62,7	63,6
Bares o pubs	34,8	33,4	36,2	9,7	8,2	11,2	23,1	21,4	25,0	40,2	37,7	42,6	56,5	55,8	57,1	32,7	30,9	34,5	60,4	62,0	58,5
Tiendas de barrio*	34,7	35,4	34,0	19,4	18,5	20,3	33,8	32,7	34,9	39,6	40,2	39,1	45,0	47,4	42,7	34,5	34,7	34,3	37,1	43,7	29,6
Discotecas	27,7	26,1	29,3	6,6	5,9	7,3	17,3	15,2	19,5	31,7	29,3	34,1	44,8	43,1	46,5	25,4	23,5	27,3	56,1	55,9	56,4
Casa de otras personas	18,7	17,9	19,5	12,1	10,2	14,0	17,9	15,9	20,0	20,3	20,2	20,4	23,2	22,8	23,6	18,4	17,3	19,4	22,5	24,2	20,7
Hipermercados	17,5	18,9	16,1	5,5	5,2	5,8	12,1	12,1	12,1	19,8	21,2	18,5	25,9	28,8	23,2	16,0	16,9	15,1	35,9	41,0	30,1
Casa donde vives	13,1	14,1	12,2	7,2	6,6	7,8	10,7	11,5	9,9	13,3	15,0	11,7	18,1	19,4	16,7	12,3	13,1	11,5	22,8	24,9	20,3
Venta ambulante	3,4	4,3	2,5	2,5	2,9	2,1	3,7	4,9	2,6	3,7	4,7	2,7	3,8	4,7	2,9	3,4	4,3	2,6	3,4	5,0	1,6
Internet o venta telefónica	0,7	1,0	0,4	0,5	0,6	0,4	0,8	1,0	0,5	0,9	1,1	0,7	0,7	1,3	0,1	0,7	1,0	0,4	0,7	0,9	0,5

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* Tiendas de barrio, chinos, quioscos...

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.99.

Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tú directamente	38,2	40,0	36,4	14,0	13,5	14,6	28,6	29,8	27,4	40,5	42,5	38,7	55,5	59,9	51,4	34,9	36,4	33,3	78,8	80,5	76,8
A través de otras personas de 18 años o mayores	32,9	28,2	37,5	17,4	14,8	20,1	32,0	27,0	37,2	41,0	35,1	46,7	45,7	39,7	51,5	34,2	29,2	39,1	16,5	17,1	15,9
A través de otras personas menores de 18 años	10,7	9,6	11,7	9,2	7,9	10,5	12,3	10,3	14,4	13,1	12,4	13,9	10,2	9,7	10,7	11,3	10,1	12,4	3,2	3,6	2,9
De otra forma	4,9	5,5	4,2	4,4	4,9	4,0	6,0	6,8	5,2	5,4	6,5	4,4	4,5	5,2	3,8	5,1	5,8	4,3	2,6	2,3	2,9

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.100.

Lugares donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Bares o pubs	34,4	32,8	36,0	8,4	7,1	9,7	22,3	20,1	24,6	40,4	38,4	42,5	57,2	56,3	58,0	32,1	30,2	33,9	63,7	64,1	63,2
Discotecas	29,0	27,4	30,6	7,3	6,2	8,3	19,2	17,7	20,8	34,0	31,8	36,2	45,8	44,2	47,3	26,6	24,8	28,4	58,8	58,6	59,1
Restaurantes	11,4	12,3	10,5	2,2	2,2	2,3	6,6	7,3	5,7	10,8	11,5	10,1	20,3	21,8	18,9	9,9	10,5	9,3	31,0	33,8	27,7
Casa donde vives	14,5	16,5	12,5	7,2	6,8	7,6	11,7	13,7	9,6	14,6	17,3	12,0	20,3	23,3	17,5	13,4	15,1	11,7	28,5	32,8	23,6
Casa de otras personas	26,5	26,7	26,3	13,7	12,4	15,1	23,3	22,4	24,3	30,0	30,5	29,4	35,4	36,7	34,1	25,6	25,4	25,7	39,0	43,2	34,2
En calles, plazas*	33,6	33,3	34,0	18,8	16,8	20,9	32,1	29,5	34,9	38,8	39,1	38,6	42,7	44,7	40,9	33,1	32,4	33,8	40,7	44,3	36,5
Otros sitios	10,1	11,2	8,9	6,7	7,2	6,3	10,3	9,8	10,9	10,9	12,5	9,3	11,8	14,1	9,6	9,9	10,9	8,9	12,4	15,1	9,4

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* En calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.101.


Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Botellón en los últimos 12 meses		Botellón en los últimos 30 días	
Total		52,0		24,1
Sexo	Hombre	50,3		23,3
	Mujer	53,8		25,0
Edad	14 años	28,0		9,7
	15 años	47,7		20,5
	16 años	61,1		27,9
	17 años	68,9		35,7
	14-17 años	50,9		23,0
	18 años	68,1		39,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.102.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Hombres	24,8	45,2	59,4	68,3	48,7	71,3
Mujeres	31,3	50,4	62,8	69,4	53,1	64,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.103.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses, de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2016.

	Total		14 años		15 años		16 años		17 años		17-18 años		18 años	
	¿HA HECHO BOTELLÓN?													
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	72,6	10,5	57,1	4,4	66,7	9,0	73,1	12,7	79,8	21,7	71,4	9,7	84,5	25,5
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	39,6	3,3	26,4	1,0	31,4	2,4	39,9	3,8	46,0	8,1	38,0	3,0	55,5	9,2
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	53,8	7,7	40,3	3,6	48,6	6,3	52,8	9,4	58,8	14,5	51,9	7,0	73,5	21,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.104.

Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2016.

	Total		14 años		15 años		16 años		17 años		17-18 años		18 años	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
<b>¿HA HECHO BOTELLÓN?</b>														
Ha consumido...														
Tabaco	53,9	13,4	46,1	9,1	55,2	13,8	50,9	14,0	55,7	19,3	52,5	12,7	68,6	27,9
Hipnosedantes	13,9	8,9	12,4	7,6	12,7	8,5	13,9	9,0	14,4	11,7	13,6	8,7	17,5	13,2
Cannabis	42,6	8,3	27,7	4,4	39,4	7,9	41,4	9,5	48,8	14,4	41,2	7,8	57,0	19,2
Cocaína	4,0	0,7	3,2	0,5	4,0	0,7	3,1	1,0	3,9	0,7	3,5	0,7	8,4	1,2
Éxtasis	2,6	0,4	1,7	0,2	2,5	0,4	2,2	0,6	3,2	0,5	2,5	0,4	4,2	1,0
Anfetaminas	1,9	0,3	1,1	0,2	2,0	0,3	1,5	0,2	2,1	0,6	1,7	0,3	3,8	0,7
Alucinógenos	1,6	0,3	0,9	0,2	1,7	0,4	1,3	0,2	1,7	0,6	1,4	0,3	2,8	0,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.105.


Percepción del consumo de alcohol del padre y de la madre que tienen los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.

	Total alumnos
<b>PADRE</b>	
No ha bebido ningún día	23,5
Ha bebido algún día aislado	35,5
Ha bebido solo los fines de semana	23,3
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	16,4
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	1,4
<b>MADRE</b>	
No ha bebido ningún día	38,6
Ha bebido algún día aislado	37,5
Ha bebido solo los fines de semana	16,5
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	7,0
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.106.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



	14 años		15 años		16 años		17 años		18 años	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Bebidas energéticas	50,5	30,8	54,2	35,0	52,5	31,9	52,5	31,7	56,0	38,3
Bebidas energéticas mezcladas con alcohol	9,3	6,8	16,0	12,6	18,3	14,5	21,7	17,5	25,1	21,5

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.107.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2016.


	Ha consumido alcohol	Se ha emborrachado	Ha hecho binge drinking	Ha consumido tabaco	Ha consumido hipnosedantes*	Ha consumido cannabis	Ha consumido cocaína	Ha consumido éxtasis	Ha consumido anfetaminas	Ha consumido alucinógenos
Ha consumido bebidas energéticas	50,7	58,1	57,8	60,9	57,4	65,8	77,2	81,8	78,9	79,8
Ha consumido bebidas energéticas mezcladas con alcohol	22,5	37,9	34,6	32,3	26,0	38,6	58,2	62,6	59,2	58,3

\* Con o sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.108.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5
Últimos 12 meses	-	-	-	-	-	-	34,0	38,1	32,4	35,3	31,4	34,7
Últimos 30 días	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3
Diariamente en últimos 30 días	21,6	23,7	23,1	23,0	21,0	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8
Edad media de inicio consumo	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1
Edad media de inicio consumo diario	-	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.109.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Hombres	17,8	19,0	17,9	19,3	17,7	18,9	12,5	13,3	11,0	12,0	8,7	8,6
Mujeres	25,4	28,1	27,5	27,0	24,2	24,1	16,9	16,4	13,6	13,1	9,1	9,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.110.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que afirman que en sus casas alguna de las personas con las que conviven o comparten casa fuman diariamente. España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
% alumnos que conviven con personas que fuman diariamente en sus hogares	68,2	62,4	63,8	63,0	58,0	55,9	47,7	52,9	50,0	50,0	49,7	47,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.111.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de un paquete diario de tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que puede causar bastantes o muchos problemas) y prevalencia del consumo diario de tabaco. España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Riesgo atribuido a consumir habitualmente	76,9	75,2	78	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7	91,8
Prevalencia de consumo diario	21,6	23,7	23,1	23	21	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.112.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco y el riesgo percibido (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Prevalencia hombres	17,8	19,0	17,9	19,3	17,7	18,9	12,5	13,3	11,0	12,0	8,7	8,6
Prevalencia mujeres	25,4	28,1	27,5	27,0	24,2	24,1	16,9	16,4	13,6	13,1	9,1	9,0
Riesgo hombres	74,7	72,8	75,7	75,1	76,7	78,2	84,9	86,5	88,9	89,6	88,1	91,0
Riesgo mujeres	79,1	77,4	79,9	79,5	80,8	82,3	89,3	91,0	91,7	93,1	91,1	92,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.113.

Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	2,0	6,8	9,3	13,7	20,4
Mujeres	2,4	6,6	10,1	13,3	24,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.114.

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, por edad (%). España, 2016.




	Total	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Consumo de tabaco últimos 30 días	27,3	14,6	26,1	28,3	35,8	48,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.115.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
14 años	44,5	49,8	51,3	45,8	43,8	42,1	28,4	28,4	22,7	27,1	22,3	21,3
15 años	58,3	60,1	58,6	58,5	55,5	54,7	41,5	40,6	34,4	35,4	31,3	36,7
16 años	63,9	69,1	65,7	62,7	63,0	62,3	50,7	47,5	44,8	43,0	43,0	40,6
17 años	68,5	69,9	69,5	68,6	67,2	70,0	55,1	54,2	51,1	50,9	48,8	50,6
18 años	72,7	76,7	76,9	78,6	73,2	77,3	61,8	60,4	52,9	59,1	56,5	62,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.116.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2016.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016
14 años	19,1	23,0	17,5	20,6	18,6	19,8
15 años	30,6	34,5	27,7	28,6	25,5	33,8
16 años	37,6	40,7	36,9	34,7	35,3	36,7
17 años	41,3	47,1	41,8	40,9	39,7	44,5
18 años	47,4	52,1	43,8	48,6	45,3	55,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.117.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
14 años	18,0	18,5	19,0	17,2	13,4	14,0	13,8	18,2	12,3	15,6	15,0	14,6
15 años	28,4	27,7	27,7	28,1	23,6	24,3	24,1	28,8	21,4	23,3	20,5	26,1
16 años	33,9	35,9	33,0	32,2	32,0	29,0	30,6	34,1	29,7	29,1	29,4	28,3
17 años	37,0	36,4	37,8	38,8	37,6	40,4	35,5	40,7	35,6	34,6	32,7	35,8
18 años	44,4	50,3	49,7	51,6	46,4	48,2	42,1	48,3	40,1	43,2	39,1	48,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.118.

Media de cigarrillos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Hombres	9,1	8,3	7,9	7,6	7,8	8,1	5,8	5,1	5,7	6,4	5,8	6,1
Mujeres	7,2	6,9	7,0	6,8	7,3	7,5	5,3	5,0	4,8	6,0	5,4	5,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.119.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Encuestados (nº)	21.094	18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486	35.369
Edad media de inicio de consumo (años)*	13,9	13,3	13,2	13,1	13,1	13,2	13,1	13,3	13,5	13,6	13,9	14,1
Edad media de inicio de consumo diario (años)*	–	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,2	15,1	14,3	14,5	14,6	14,6
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	60,6	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5
Prevalencia (%) últimos 30 días	31,1	32,5	31,9	32,1	29,4	28,7	27,8	32,4	26,2	29,7	25,9	27,3
Prevalencia (%) de consumo diario	21,6	23,7	23,1	23	21	21,5	14,8	14,8	12,3	12,5	8,9	8,8
Cigarrillos diarios consumidos diariamente (nº)												
De 1 a 5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55,9	63,5	60,2
De 6 a 10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32,7	28,5	30,5
Más de 10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,5	8,0	9,3
Media de cigarrillos/día	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	5,6	5,8

\* En fumadores actuales y exfumadores.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.120.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)*	13,7	14,1	13,1	13,5	13,0	13,4	12,9	13,2	13,0	13,1	13,1	13,2	13,0	13,1	13,2	13,4	13,5	13,5	13,5	13,7	13,8	14,0	14,1	14,2
Edad media de inicio de consumo diario (años)*	-	-	14,5	14,6	14,6	14,5	14,4	14,3	14,4	14,3	14,5	14,4	14,3	14,2	14,3	14,3	14,4	14,3	14,6	14,5	14,6	14,5	14,7	14,6
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	56,0	65,1	58,9	69,4	57,4	68,5	57,1	66,7	54,6	64,7	56,6	54,1	42,0	49,8	42,2	47,0	35,6	43,8	41,6	46,1	36,5	40,3	36,3	40,7
Prevalencia (%) últimos 30 días	26,0	36,3	26,2	38,1	25,5	37,6	27,3	37,1	25,0	33,4	25,1	32,4	24,8	30,6	30,9	33,8	23,0	29,3	28,1	31,3	24,5	27,2	25,6	29,0
Prevalencia (%) de consumo diario	17,8	25,4	19,0	28,1	17,9	27,5	19,3	27,0	17,7	24,2	18,9	24,1	12,5	16,9	13,3	16,4	11,0	13,6	12,0	13,1	8,7	9,1	8,6	9,0
Cigarrillos diarios consumidos diariamente (nº)																								
De 1 a 5	37,7	47,3	41,8	50,3	43,8	49,5	44,4	49,0	44,7	46,5	41,6	44,5	61,9	63,0	56,1	58,3	65,0	68,5	54,7	57,0	60,6	66,1	56,6	63,5
De 6 a 10	33,8	36,8	33,9	34,8	35,2	34,9	34,8	35,2	33,5	36,0	35,7	35,5	22,7	27,2	28,0	30,1	23,3	23,9	32,4	32,9	30,7	26,5	32,9	28,3
Más de 10	28,5	15,9	24,3	14,8	20,9	15,6	20,8	15,8	21,8	17,5	22,7	20,0	15,3	9,8	15,9	11,6	11,7	7,6	12,9	10,1	8,7	7,4	10,5	8,1
Media de cigarrillos al día	9,1	7,2	8,3	6,9	7,9	7,0	7,6	6,8	7,8	7,3	8,1	7,5	5,8	5,3	5,1	5,0	5,7	4,8	6,4	6,0	5,8	5,4	6,1	5,5

H = Hombres; M = Mujeres.

\* En fumadores actuales y exfumadores.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.121.

Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Cigarrillos de cajetilla	Cigarrillos de liar	De los 2 tipos
Total	45,6	10,2	44,2
Hombre	37,7	12,6	49,7
Mujer	52,5	8,1	39,3
14 años	54,1	7,2	38,7
15 años	49,0	9,7	41,3
16 años	44,9	9,8	45,2
17 años	42,2	11,0	46,9
14-17 años	46,1	9,8	44,0
18 años	42,2	12,8	45,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.122.

Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo tabaco (porcentajes)	16,3	15,0	17,7	12,6	10,8	14,6	18,6	17,8	19,5	17,4	16,0	18,8	17,5	16,6	18,4	19,9	18,8	21,3	16,1	14,8	17,5

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.123.

Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos\* en miles de estudiantes). España, 2016.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo tabaco (n <sup>os</sup> absolutos)*	184,6	87,7	96,9	44,4	19,2	25,2	46,3	23,1	23,2	51,0	23,8	27,2	33,3	16,3	16,9	9,7	5,3	4,4	174,9	82,4	92,5

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2016. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.124.

Porcentaje de estudiantes que han visto fumar a profesores, a estudiantes o a otras personas dentro del recinto del centro educativo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según titularidad del centro y tipo de estudios (%). España, 2016.

	Profesores	Estudiantes	Otras personas del centro
Total	42,7	65,8	35,7
Centros públicos	46,9	70,2	38,9
Centros privados	33,5	56,1	29,0
ESO	42,3	65,7	35,3
Bachillerato	42,0	64,8	33,7
Formación Profesional Básica	56,5	81,5	59,6
Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional	45,2	66,2	42,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.125.

Porcentaje de estudiantes cuyos padres u otros familiares con los que convive fuman a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según fumen o no (%). España, 2016.

	Total de estudiantes	Estudiantes que han fumado alguna vez en la vida	Estudiantes que han fumado en los últimos 12 meses	Estudiantes que han fumado en los últimos 30 días	Estudiantes que han fumado a diario en los últimos 30 días
Madre fuma a diario	24,9	31,6	32,2	33,0	43,9
Madre fuma pero no a diario	7,2	7,1	7,1	7,4	6,2
Madre fuma (a diario o no)	32,1	38,6	39,3	40,4	50,1
Madre no fuma	67,9	61,4	60,7	59,6	49,9
Padre fuma a diario	26,8	32,7	33,1	34,7	43,2
Padre fuma pero no a diario	7,6	7,7	7,7	7,8	5,8
Padre fuma (a diario o no)	34,5	40,3	40,8	42,5	49,1
Padre no fuma	65,5	59,7	59,2	57,5	50,9
Familiar fuma a diario	28,2	38,3	38,7	40,5	51,3
Familiar fuma pero no a diario	14,3	13,2	13,1	13,6	11,0
Familiar fuma (a diario o no)	42,6	51,5	51,7	54,1	62,3
Familiar no fuma	57,4	48,5	48,3	45,9	37,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.126.


Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia con la que fumen (%). España, 2016.

	Total de estudiantes	Estudiantes que han fumado alguna vez en la vida	Estudiantes que han fumado en los últimos 12 meses	Estudiantes que han fumado en los últimos 30 días	Estudiantes que han fumado a diario en los últimos 30 días
Se han planteado dejar de fumar y lo han intentado	9,6	40,2	40,2	40,2	37,1
Se han planteado dejar de fumar pero no lo han intentado	7,2	30,1	30,1	30,1	43,7
No se han planteado dejar de fumar	7,1	29,7	29,7	29,7	19,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.127.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Total	12,8	21,2	21,4	23,8	26,8
Hombres	14,5	23,7	23,9	26,5	31,9
Mujeres	11,1	18,4	19,0	21,1	21,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.128.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no (%). España, 2016.

	Consumo de tabaco alguna vez en la vida		Consumo de tabaco en los últimos 12 meses		Consumo de tabaco en los últimos 30 días		Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido CE alguna vez en la vida	40,9	7,0	42,2	8,2	46,3	10,2	58,0	15,6
Nunca ha consumido CE	59,1	93,0	57,8	91,8	53,7	89,8	42,0	84,4
Ha consumido CE con nicotina	21,1	1,4	22,5	1,8	26,0	2,6	40,9	5,7
No ha consumido CE con nicotina	78,9	98,6	77,5	98,2	74,0	97,4	59,1	94,3
Ha consumido CE sin nicotina	29,2	5,7	29,9	6,6	32,1	8,2	34,1	12,1
No ha consumido CE sin nicotina	70,8	94,3	70,1	93,4	67,9	91,8	65,9	87,9
Ha consumido CE de los dos tipos	11,0	0,8	11,8	1,0	13,2	1,5	18,3	3,2
No ha consumido CE de los dos tipos	89,0	99,2	88,2	99,0	86,8	98,5	81,7	96,8

CE = Cigarrillos electrónicos

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.129.

Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no (%). España, 2016.

	Consumo de cannabis alguna vez en la vida		Consumo de cannabis en los últimos 12 meses		Consumo de cannabis en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Ha consumido CE alguna vez en la vida	42,1	10,0	44,4	11,1	48,0	13,7
Nunca ha consumido CE	57,9	90,0	55,6	88,9	52,0	86,3

CE = Cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.130.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de cigarrillos electrónicos y de cannabis (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2016.

Problemas de salud o de otro tipo que puede significar...		Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	
		Sí	No
Fumar un paquete de tabaco diario	Muchos/bastantes problemas	88,2	92,8
	Pocos/ningún problema	11,8	7,2
Fumar hachis/marihuana (cannabis) alguna vez	Muchos/bastantes problemas	44,3	56,7
	Pocos/ningún problema	55,7	43,3
Fumar hachis/marihuana (cannabis) habitualmente	Muchos/bastantes problemas	83,6	92,4
	Pocos/ningún problema	16,4	7,6
Fumar cigarrillos electrónicos	Muchos/bastantes problemas	26,1	36,6
	Pocos/ningún problema	73,9	63,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.131.


Disponibilidad percibida del tabaco y del cannabis entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2016.

		Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	
		Sí	No
Disponibilidad percibida del tabaco	Fácilmente disponible (fácil + muy fácil)	95,3	90,3
	Difícilmente disponible (difícil + imposible)	4,7	9,7
Disponibilidad percibida del cannabis	Fácilmente disponible (fácil + muy fácil)	83,3	60,5
	Difícilmente disponible (difícil + imposible)	16,7	39,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.132.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	6,9	7,7	7,7	8,8	8,5	10,0	12,1	17,3	18,0	18,5	16,1	17,9
Últimos 12 meses	-	-	-	-	-	-	7,4	10,1	9,8	11,6	10,8	11,6
Últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	3,6	5,1	5,2	6,6	6,2	5,9
Edad media inicio consumo	-	-	-	-	-	-	13,8	14,0	13,8	14,3	13,9	13,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.133.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	7,9	8,0	8,9	9,8	11,5
Mujeres	10,2	13,6	15,1	17,3	21,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.134.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0
Últimos 12 meses	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4
Últimos 30 días	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6
Edad media inicio consumo	14,1	14,5	14,8	14,5	14,6	14,8	14,4	14,3	14,2	14,6	14,2	14,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.135.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	2,8	3,5	4,4	5,0	6,0
Mujeres	4,3	6,3	7,3	7,9	10,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.136.

Continuidad en el consumo de hipnosedantes sin receta en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida (A)	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0
Últimos 12 meses (B)	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4
Últimos 30 días (C)	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6
B/A*100	72,1	73,8	73,4	72,5	69,2	67,1	63,2	60,6	53,8	65,0	68,6	69,2
C/B*100	59,1	48,9	48,9	50,0	53,3	51,1	50,0	50,9	53,6	59,3	56,1	49,8
C/A*100	42,6	36,1	35,9	36,2	36,9	34,3	31,6	30,9	28,8	38,6	38,5	34,2

B/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado los hipnosedantes alguna vez en la vida y la habían consumido también en los últimos 12 meses.  
 C/B = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado los hipnosedantes en los últimos 12 meses y la habían consumido también en los últimos 30 días.  
 C/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado los hipnosedantes alguna vez en la vida, y la habían consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.137.

Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Encuestados (n°)	21.094	18.966	18.085	20.450	26.576	25.521	26.454	30.183	31.967	27.503	37.486	35.369
Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años)	13,5	13,7	13,8	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	14,6	14,2	14,0
Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida	-	-	-	-	-	-	15,6	17,3	18,0	18,5	16,1	17,9
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7,0	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8,0
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	4,4	4,5	4,7	5,0	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3	5,4
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3,0	3,4	3,0	2,6
Frecuencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días												
Nunca	97,7	97,9	97,6	97,0	97,6	97,6	97,6	97,1	97,0	96,6	97,0	97,4
1 a 2 días	1,5	1,4	1,5	1,8	1,6	1,5	1,6	1,8	1,7	1,9	1,7	-
3 a 5 días	0,4	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9	0,7	-
6 a 9 días	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	-
10 a 19 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	-

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.138.

Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.061	17.649	17.720
Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años)	13,6	14,4	13,9	14,8	14,4	15,0	14,3	14,7	14,4	14,8	14,7	14,9	13,8	14,4	13,9	14,5	13,7	14,4	14,3	14,8	13,8	14,5	13,5	14,2
Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida	5,8	8,1	6,6	9,1	6,4	9,3	7,3	10,2	6,8	9,9	8,1	12,3	9,3	13,6	14,2	20,4	14,9	21,5	14,1	23,0	11,9	20,1	14,4	21,5
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	4,8	7,4	4,5	7,6	4,4	8,2	5,2	8,6	5,0	7,9	5,8	8,1	5,8	9,2	7,7	11,0	8,4	12,3	6,9	11,0	5,8	9,6	6,3	9,8
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	3,2	5,6	3,2	5,8	3,3	5,9	3,5	6,6	3,2	5,7	4,0	5,5	3,7	5,8	4,6	6,8	4,4	6,7	4,4	7,3	3,8	6,8	4,1	6,7
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días	1,9	3,3	1,5	2,9	1,5	3,0	1,7	3,4	1,7	3,1	1,8	3,0	2,0	2,8	2,4	3,3	2,3	3,6	2,6	4,3	2,0	3,9	2,0	3,3
Frecuencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días																								
Nunca	98,1	96,7	98,5	97,1	98,5	97,0	98,3	96,6	98,3	96,9	98,2	97,0	98,0	97,1	97,6	96,6	97,7	96,3	97,4	95,7	98,0	96,1	98,0	96,7
1 a 2 días	1,3	2,1	1,1	1,9	1,0	2,1	1,0	2,2	1,1	2,0	1,0	2,0	1,2	2,0	1,4	2,2	1,2	2,2	1,5	2,3	1,1	2,3	-	-
3 a 5 días	0,3	0,7	0,2	0,7	0,3	0,5	0,4	0,7	0,3	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,6	0,8	0,4	1,4	0,5	1,0	-	-
6 a 9 días	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	-	-
10 a 19 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	-	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.139.

Prevalencias de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.


	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			14-17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Hipnosedantes con o sin receta																					
Alguna vez	17,9	14,4	21,5	14,1	12,6	15,7	17,2	13,6	21,0	17,9	14,3	21,4	20,7	15,8	25,5	17,3	14,0	20,7	25,9	19,8	32,8
Último año	11,6	8,8	14,4	9,0	7,9	10,2	10,7	8,0	13,6	12,1	8,9	15,1	13,6	9,8	17,3	11,3	8,6	14,0	16,2	11,5	21,5
Último mes	5,9	4,4	7,3	4,7	4,4	5,1	5,4	4,0	6,8	6,1	4,3	7,8	6,6	4,5	8,6	5,7	4,3	7,0	8,7	5,8	12,0
Hipnosedantes sin receta																					
Alguna vez	8,0	6,3	9,8	5,7	4,7	6,8	7,8	6,1	9,6	8,3	6,5	10,2	9,4	7,3	11,5	7,8	6,1	9,4	11,6	8,9	14,6
Último año	5,4	4,1	6,7	3,5	2,8	4,3	4,9	3,5	6,3	5,9	4,4	7,3	6,5	5,0	7,9	5,2	3,9	6,4	8,2	6,0	10,8
Último mes	2,6	2,0	3,3	1,6	1,6	1,7	2,5	2,0	3,1	2,8	2,0	3,6	3,2	2,1	4,1	2,5	1,9	3,1	4,4	3,1	5,8

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.140.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) y edad media de inicio del consumo. España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33,0	33,6	29,1	31,1
Últimos 12 meses	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3
Últimos 30 días	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3
Edad media de inicio del consumo	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,7	14,9	14,8	14,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.141.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




		14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Alguna vez en la vida	Hombre	15,2	28,9	36,6	48,0	31,5	56,3
	Mujer	12,6	24,4	30,8	42,5	27,2	54,7
Últimos 12 meses	Hombre	11,8	24,5	31,8	40,7	26,6	47,9
	Mujer	10,5	21,6	26,7	35,6	23,2	41,8
Últimos 30 días	Hombre	9,1	18,4	23,0	29,5	19,5	36,5
	Mujer	7,1	15,0	17,4	22,0	15,1	26,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.142.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Alguna vez en la vida	13,9	26,7	33,7	45,2	29,3	55,6
Últimos 12 meses	11,1	23,1	29,2	38,1	24,9	45,0
Últimos 30 días	8,1	16,7	20,2	25,6	17,3	32,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.143.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días y de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Riesgo atribuido a consumir habitualmente	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8	90,7
Prevalencia de consumo en últimos 30 días	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.144.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Riesgo percibido ante uso habitual	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8	90,7
Disponibilidad percibida	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4	66,3	65,9
Prevalencia de consumo último año	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.145.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Hombres	11,8	24,5	31,8	40,7	26,6	47,9
Mujeres	10,5	21,6	26,7	35,6	23,2	41,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.146.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Hombres	9,1	18,4	23,0	29,5	19,5	36,5
Mujeres	7,1	15,0	17,4	22,0	15,1	26,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.147.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016.


	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	86,2	3,6	2,0	1,6	1,6	1,5	1,5	2,0
Sexo								
Hombres	84,2	3,6	2,1	1,9	1,7	1,8	1,9	2,7
Mujeres	88,2	3,5	2,0	1,3	1,4	1,3	1,1	1,3
Edad								
14 años	94,9	1,5	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4
15 años	88,4	3,1	1,7	1,2	1,3	1,5	1,2	1,6
16 años	84,6	4,3	2,0	1,8	1,6	1,9	1,6	2,3
17 años	79,2	4,8	3,4	2,5	2,4	2,2	2,2	3,4
18 años	73,4	6,6	3,6	3,4	3,4	2,4	3,3	3,9

\* Casos con información en el número de días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.148.

Continuidad en el consumo de cannabis en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Prevalencia alguna vez en la vida (A)	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33	33,6	29,1	31,1
Prevalencia últimos 12 meses (B)	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4	26,3
Prevalencia últimos 30 días (C)	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6	18,3
B/A*100	87,1	88,6	87,1	86,7	87,5	85,7	82,3	86,6	80,0	79,1	87,4	84,4
C/A*100	59,3	59,5	58,3	62,7	60,0	58,8	55,5	57,1	52,1	48,0	63,9	58,9
C/B*100	68,1	67,1	66,9	72,2	68,6	68,6	67,4	65,9	65,2	60,7	73,1	69,8

B/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cannabis alguna vez en la vida y la habían consumido también en los últimos 12 meses.

C/B = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cannabis en los últimos 12 meses y la habían consumido también en los últimos 30 días.

C/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cannabis alguna vez en la vida, y la habían consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.149.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tipo de consumo de cannabis								
Principalmente marihuana (hierba)	51,1	49,3	53,4	55,4	49,4	50,2	51,3	51,8
Principalmente hachís (resina, chocolate)	12,2	11,5	13,2	10,2	12,4	12,8	11,8	13,2
De los 2 tipos	36,7	39,2	33,4	34,4	38,2	37,0	36,9	35,1
Mezcla de cannabis con tabaco								
Sí	82,4	81,1	84,1	65,5	79,8	83,7	86,8	86,9
No	17,6	18,9	15,9	34,5	20,2	16,3	13,2	13,1
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis								
	3,4	3,8	3,0	3,5	3,6	3,4	3,4	3,3

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.150.

Características generales del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.688	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)	15,1	15,2	15,1	15,2	14,9	15,1	14,8	15,0	14,6	14,8	14,6	14,8	14,5	14,6	14,6	14,7	14,6	14,8	14,8	15,0	14,8	14,9	14,8	14,9
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	23,8	18,0	28,8	24,2	31,6	27,6	36,2	30,1	46,6	34,6	45,3	40,2	38,0	34,6	37,8	32,8	34,9	31,1	36,3	30,7	31,5	26,8	33,2	28,9
Prevalencia (%) últimos 12 meses	21,2	15,2	25,9	21,1	28,2	23,5	32,2	25,2	36,2	29,8	39,4	33,7	31,6	28,2	33,5	27,5	26,8	23,3	29,7	23,3	28,0	23,0	28,1	24,4
Prevalencia (%) últimos 30 días	15,1	9,8	18,4	13,2	20,3	14,5	24,5	16,9	25,8	19,6	28,3	22,0	22,3	18,0	23,0	17,2	18,6	14,6	18,9	13,3	21,4	15,8	20,8	15,9
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	84,9	90,2	81,6	86,8	79,7	85,5	75,5	83,1	74,2	80,4	71,7	78,0	77,7	82,0	74,7	82,5	80,3	84,7	81,1	86,7	83,1	87,9	84,2	88,2
1 a 2 días	6,9	5,1	7,3	7,2	8,4	7,4	8,6	8,8	8,6	9,1	9,4	9,8	7,4	7,4	7,9	7,1	6,9	6,8	7,1	6,2	6,5	6,0	5,7	5,5
3 a 5 días	3,0	2,1	4,1	2,7	3,8	3,0	4,7	3,5	4,8	3,8	4,4	4,5	5,3	4,8	5,0	4,6	3,9	3,7	3,9	3,0	3,9	2,8	3,6	2,7
6 a 9 días	2,1	1,4	2,9	1,3	3,2	1,9	3,1	1,9	3,9	2,8	3,5	2,6	2,5	1,8	2,6	1,8	2,2	1,4	2,1	1,3	2,0	1,1	1,8	1,3
10 a 19 días	1,5	0,6	2,0	1,0	2,1	1,3	3,5	1,3	3,0	1,8	3,5	2,3	2,9	1,8	3,6	2,0	2,5	1,6	2,0	1,3	1,9	1,2	1,9	1,1
20 a 29 días	1,5	0,6	2,2	0,9	2,8	1,0	4,7	1,4	5,5	2,1	7,4	2,8	4,2	2,2	4,5	1,9	4,3	1,8	3,8	1,5	2,6	1,0	2,7	1,3

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.151.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2016.

	Total población	No ha fumado cannabis nunca	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Ha fumado cannabis en los últimos 30 días	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4)
Alcohol	75,6	66,2	97,7	97,2	99,3
Tabaco	34,7	15,8	82,5	84,4	95,6
Cannabis	26,3	0,0	100,0	100,0	100,0
Éxtasis	1,6	0,2	5,5	7,2	18,6
Hipnosedantes*	11,6	9,0	18,3	19,2	28,0
Hipnosedantes**	5,4	3,7	9,9	10,6	18,2
Cocaína en polvo	2,1	0,2	7,5	9,8	27,2
Cocaína base	1,2	0,2	4,3	5,8	15,2
Cocaína polvo y/o base	2,5	0,3	8,4	11,1	28,9
Anfetaminas	1,2	0,1	4,0	5,3	17,0
Metanfetamina	1,0	0,1	3,5	4,6	12,8
Alucinógenos	1,0	0,1	3,4	4,5	13,6
Setas mágicas	0,9	0,1	3,3	4,5	12,1
Heroína	0,6	0,1	1,9	2,6	7,2
Inhalables volátiles	0,6	0,2	1,7	2,1	6,4
Esteroides anabolizantes	0,3	0,1	1,0	1,3	4,4
Nuevas sustancias	3,1	0,4	10,7	13,0	26,0

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. \*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.152.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2016.

	Total población	No ha fumado cannabis nunca	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Ha fumado cannabis en los últimos 30 días	Consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4)
Alcohol	67,0	56,0	93,1	94,2	96,2
Tabaco	27,3	10,4	70,3	77,5	92,5
Cannabis	18,3	0,0	70,2	100,0	95,1
Éxtasis	0,6	0,1	2,0	2,8	9,6
Hipnosedantes*	5,9	4,3	9,9	10,6	16,8
Hipnosedantes**	2,6	1,6	5,2	6,0	10,4
Cocaína en polvo	0,8	0,1	2,9	4,1	12,7
Cocaína base	0,5	0,1	1,9	2,7	8,2
Cocaína polvo y/o base	1,0	0,1	3,5	4,8	14,4
Anfetaminas	0,5	0,1	1,8	2,4	8,3
Metanfetamina	0,4	0,1	1,4	2,0	5,9
Alucinógenos	0,4	0,0	1,3	1,8	6,0
Setas mágicas	0,3	0,1	1,2	1,7	4,8
Heroína	0,3	0,0	1,2	1,6	5,1
Inhalables volátiles	0,3	0,1	0,9	1,2	3,8
Esteroides anabolizantes	0,2	0,1	0,7	1,0	2,9
Nuevas sustancias	1,7	0,2	5,9	8,2	14,9

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

\*\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.153.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4), según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Tipo de consumo de cannabis								
Principalmente marihuana (hierba)	30,7	26,6	38,9	36,7	34,9	30,1	27,0	32,5
Principalmente hachís (resina, chocolate)	11,2	11,2	11,0	5,5	8,0	10,9	11,7	16,6
De los 2 tipos	52,9	56,5	45,5	55,8	53,4	53,5	54,5	46,4
Mezcla de cannabis con tabaco								
Sí	90,6	90,2	91,4	86,5	91,5	90,2	90,1	93,5
No	9,4	9,8	8,6	13,5	8,5	9,8	9,9	6,5
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis								
	5,4	5,6	5,0	6,0	5,8	5,4	5,2	4,9

H = Hombres; M = Mujeres.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.154.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis o no (%). España, 2016.

	Total población	Ha fumado cannabis en últimos 30 días	Ha fumado cannabis en últimos 12 meses	Consumidores de cannabis (CAST <4)	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4)
Tipo de consumo de cannabis					
Principalmente marihuana (hierba)	7,9	51,1	33,6	36,7	30,7
Principalmente hachís (resina, chocolate)	1,9	12,2	8,0	8,2	11,2
De los 2 tipos	5,7	36,7	24,1	21,0	52,9
Mezcla de cannabis con tabaco					
Sí	13,3	82,4	55,1	54,9	90,6
No	86,7	17,6	44,9	45,1	9,4
Media de porros consumidos el día que se consume cannabis					
	3,4	3,4	3,4	2,9	5,4

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.155.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
En forma de porro o canuto	97,7	97,4	98,0	93,6	96,7	98,2	98,4	99,3
Usando pipas de agua, bongos, cachimbos, shishas	17,0	19,0	14,2	20,0	18,8	17,4	16,2	12,5
Por vía oral: pasteles, galletas...	5,7	6,3	4,9	7,5	4,7	4,8	6,7	5,4
Usando cigarrillos electrónicos	1,8	2,3	1,1	4,4	2,4	1,5	1,2	1,1

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.156.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST ≥4), según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
En forma de porro o canuto	93,8	93,4	94,6	92,4	96,2	92,7	92,9	95,7
Usando pipas de agua, bongos, cachimbos, shishas	25,4	26,8	22,6	27,3	26,6	25,2	27,0	20,0
Por vía oral: pasteles, galletas...	9,5	10,1	8,5	12,2	12,0	6,6	10,7	8,6
Usando cigarrillos electrónicos	4,1	4,7	2,9	10,9	5,8	2,9	3,2	2,9

H = Hombres; M = Mujeres. CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.157.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis o no (%). España, 2016.

	Total población	Ha fumado cannabis en últimos 30 días	Ha fumado cannabis en últimos 12 meses	Consumidores de cannabis (CAST <4)	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4)
En forma de porro o canuto	16,5	97,7	66,4	66,4	93,8
Usando pipas de agua, bongos, cachimbos, shishas	2,9	17,0	11,5	10,0	25,4
Por vía oral: pasteles, galletas...	1,0	5,7	3,9	2,9	9,5
Usando cigarrillos electrónicos	0,3	1,8	1,2	0,6	4,1

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.158.

Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y 30 días (%). España, 2016.


Total población	No ha fumado cannabis nunca	Ha fumado cannabis en últimos 12 meses	Ha fumado cannabis en últimos 30 días	Consumidores de cannabis (CAST <4)	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4)	
Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días	8,8	1,0	29,7	35,4	26,4	67,4

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.159.

Evolución de la distribución en el orden de las edades de inicio en el consumo de cannabis y tabaco\* (%). España, 2002-2016.




	2002	2006	2010	2014	2016
Se inician antes en el consumo de cannabis	4,6	3,8	3,8	7,4	9,4
Se inician en el mismo año en las 2 sustancias	20,0	24,1	25,7	35,0	39,6
Se inician antes en el consumo de tabaco	75,4	72,1	70,4	57,6	51,0

\* Se debe clasificar a cada una de las personas que han iniciado el consumo de tabaco y cannabis, en función de que: Hayan iniciado primero el cannabis (edad más temprana); Hayan iniciado primero el tabaco (edad más temprana); Hayan iniciado con la misma edad las dos sustancias.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.160.

Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías? Respuesta entre los que no la han probado nunca de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



	Sí	No
Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías?	12,5	87,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.161.

Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana, lo probarían los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.


	TOTAL	SEXO		EDAD				
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
No	60,1	57,8	62,5	76,2	63,5	57,3	47,2	39,8
Sí	8,6	8,7	8,4	9,7	9,5	8,8	7,3	4,4
Ya lo he probado	31,3	33,5	29,1	14,0	27,0	33,9	45,5	55,8

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.162.

Consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la posible legalidad del consumo de hachís o marihuana (%). España, 2016.



	Ha consumido tabaco alguna vez en la vida	Nunca ha consumido tabaco
Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías?		
No	15,7	84,3
Sí	40,2	59,8
Ya lo he probado	81,8	18,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.163.

Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo cannabis (porcentajes)	13,9	14,7	13,1	7,3	7,3	7,3	14,8	15,9	13,7	16,8	18,2	15,5	17,8	19,1	16,7	19,5	20,6	18,4

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.164.

Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos\* en miles de estudiantes). España, 2016.

	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo cannabis																		
(n <sup>os</sup> absolutos)*	170,0	88,9	81,1	26,3	13,1	13,2	40,5	22,0	18,5	54,5	28,4	26,0	37,5	19,1	18,4	11,2	6,3	4,9


T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

\* Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2016. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.165.

Evolución de la prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST  $\geq 4$ ) entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2016.





	2006	2008	2010	2012	2014	2016
% entre los estudiantes de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses	13,3	14,3	15,3	16,1	13,8	13,3
% entre todos los estudiantes de 14-18 años	3,3	3,7	4,6	3,8	2,5	2,8

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.166.

Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2016.



	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Puntuación CAST 0-1	66,0	67,1	64,8	65,2	69,5	69,5
Puntuación CAST 2-3	20,7	18,6	19,9	18,7	16,7	17,2
Puntuación CAST ≥4 (consumo problemático)	13,3	14,3	15,3	16,1	13,8	13,3

Puntuación CAST 0-1: % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación 0-1/los que han contestado el cuestionario CAST).

Puntuación CAST 2-3: % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación 2-3/los que han contestado el cuestionario CAST).

Puntuación CAST ≥ 4 (consumo problemático): % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación ≥ 4/los que han contestado el cuestionario CAST).

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.167.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST  $\geq 4$ ) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2006-2016.




CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.168.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST  $\geq 4$ ) en la población de 14-18 años (% y estimación). España, 2006-2016.




CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.169.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses, binge drinking, intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días y policonsumo en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.



	Consumidores problemáticos de cannabis CAST ≥4	Total población 14-18 años
Botellón últimos 12 meses	92,0	52,0
Binge drinking últimos 30 días	76,6	31,7
Borracheras últimos 30 días	69,8	21,8
3 drogas	51,0	17,5
4 drogas o más	46,9	6,0

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.170.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.

	Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST ≥4	Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST <4
Alcohol	99,6	98,3
Tabaco	97,3	87,3
Cigarrillos electrónicos	63,9	42,3
Hipnosedantes con o sin receta	38,4	25,2
Cocaína (polvo y/o base)	30,8	6,5
Éxtasis	24,9	5,7
Anfetaminas/speed	22,3	3,4
Alucinógenos	19,0	3,3
Nuevas sustancias	31,8	11,7

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.171.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.

	Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST $\geq 4$	Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST $< 4$
Alcohol	99,3	98,1
Borracheras	90,6	82,0
Botellón	92,0	85,5
Tabaco	95,6	83,3
Hipnosedantes con o sin receta	28,0	17,2
Cocaína (polvo y/o base)	28,9	5,4

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.172.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.

	Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST $\geq 4$	Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST $< 4$
Alcohol	96,2	93,6
Borracheras	69,8	50,1
Binge drinking	76,6	63,8
Tabaco	92,5	70,8
Hipnosedantes con o sin receta	16,8	9,0
Cocaína (polvo y/o base)	14,4	1,6

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.173.

Características de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST  $\geq 4$ ) de la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016.


	Total	Hombres	Mujeres
Nº casos consumo problemático cannabis últimos 30 días	956	627	329
Consumo cannabis últimos 30 días			
Principalmente marihuana	32,4	28,2	40,7
Principalmente hachís	11,8	11,9	11,6
De los 2 tipos	55,8	59,9	47,7
Nº casos consumo problemático cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días	869	574	295
Consumo cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días			
Sí	90,6	90,2	91,4
No	9,4	9,8	8,6
Media de porros consumidos al día	5,4	5,6	5,0

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.174.

Características de los consumidores de cannabis y de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST  $\geq 4$ ) de la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2016.



	Consumidores de cannabis últimos 30 días	Consumidores de cannabis CAST <4	Consumidores problemáticos de cannabis (CAST $\geq 4$ )
Cannabis + tabaco	82,4	82,3	95,5
De los 2 tipos	36,7	31,9	55,8
Marihuana	51,1	55,7	32,4
Hachís	12,2	12,4	11,8
Porro	88,3	62,9	92,8
Pipas de agua	15,3	9,5	25,1
Vía oral	5,1	2,8	9,4
Cigarrillos electrónicos	1,6	0,6	4,0


CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

Casos con información (eliminando los no contesta).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.175.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2
Últimos 12 meses	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5
Últimos 30 días	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8	1,0
Edad media de inicio del consumo	15,6	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,4	15,3	14,9	15,5	15,0	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.176.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Total	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2
hombres	3,1	4,0	6,5	8,4	9,0	11,3	6,8	6,3	4,8	4,8	4,2	4,1
mujeres	1,9	2,8	4,4	4,5	6,4	6,8	4,7	3,8	3,0	2,5	2,9	2,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.177.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.




		14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	Hombre	2,3	3,5	3,6	5,3	10,4
	Mujer	1,4	2,4	2,4	2,0	5,0
Últimos 12 meses	Hombre	1,9	2,8	2,8	4,4	8,7
	Mujer	0,8	1,9	1,8	1,4	3,2
Últimos 30 días	Hombre	0,9	1,5	1,2	1,8	3,2
	Mujer	0,4	0,5	0,7	0,3	1,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.178.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	2,3	3,5	3,6	5,3	10,4
Mujeres	1,4	2,4	2,4	2,0	5,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.179.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	1,9	2,8	2,8	4,4	8,7
Mujeres	0,8	1,9	1,8	1,4	3,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.180.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	1,9	3,0	3,0	3,6	7,9
Últimos 12 meses	1,3	2,3	2,3	2,9	6,1
Últimos 30 días	0,7	1,0	0,9	1,0	2,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.181.

Continuidad en el consumo de cocaína polvo y/o base en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida (A)	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9,0	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2
Últimos 12 meses (B)	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5
Últimos 30 días (C)	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2,0	1,5	1,5	1,8	1,0
B/A*100	72,0	79,0	83,0	74,0	81,0	80,0	72,0	71,0	67,0	68,5	80,5	82,7
C/B*100	61,0	59,0	56,0	52,0	52,0	53,0	56,0	56,0	58,0	60,0	68,5	49,1
C/A*100	44,0	47,0	46,0	38,0	42,0	42,0	40,0	39,0	38,0	41,1	54,8	39,0

B/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cocaína alguna vez en la vida y la habían consumido también en los últimos 12 meses.

C/B = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cocaína en los últimos 12 meses y la habían consumido también en los últimos 30 días.

C/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cocaína alguna vez en la vida, y la habían consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.182.

Incidencia del consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.


	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Últimos 12 meses	1,4	1,8	1,0	0,9	1,2	0,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,2	1,6	2,2	0,9	3,3	4,8	1,7	1,3	1,6	1,0

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.183.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante el consumo habitual de cocaína polvo y de la disponibilidad de cocaína polvo percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Riesgo percibido ante consumo habitual	98,5	97,6	97,4	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	97,0	96,9	96,4
Disponibilidad percibida	26,7	30,4	37,9	38,0	43,5	46,7	37,4	32,7	37,2	37,7	32,7	32,8
Prevalencia de consumo último año	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8	2,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.184.

Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo o base) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




	Cocaína polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base
Alguna vez en la vida	2,6	1,7	3,2
Últimos 12 meses	2,1	1,2	2,5
Últimos 30 días	0,8	0,5	1,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.185.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	5,1	4,3	3,2	2,9	2,3	2,6
Últimos 12 meses	3,6	3,1	2,0	2,0	1,8	2,1
Últimos 30 días	2,0	1,6	1,2	1,1	1,2	0,8
Edad media de inicio del consumo	15,4	15,4	15,4	15,6	15,1	15,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.186.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.



	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	2,6	2,4	2,0	2,2	2,7	1,7
Últimos 12 meses	1,9	1,8	1,3	1,6	2,1	1,2
Últimos 30 días	1,1	1,0	0,9	1,1	1,4	0,5
Edad media de inicio del consumo	15,0	15,0	14,6	15,2	14,8	14,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.187.

Características del consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.688	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)	15,7	15,5	15,9	15,9	15,9	15,7	16,0	15,6	15,8	15,6	15,9	15,7	15,4	15,4	15,3	15,2	14,7	15,0	15,5	15,5	14,9	15,1	15,1	15,0
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	3,1	1,9	4,0	2,8	6,5	4,4	8,4	4,5	9,0	6,4	11,3	6,8	6,8	4,7	6,3	3,8	4,8	3,0	4,8	2,5	4,2	2,9	4,1	2,2
Prevalencia (%), últimos 12 meses	2,3	1,2	3,3	2,2	5,4	3,6	6,4	3,1	7,5	5,1	9,4	5,1	5,2	3,1	4,9	2,4	3,3	1,8	3,4	1,6	3,3	2,2	3,3	1,6
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,4	0,7	2,1	1,2	3,2	1,8	3,4	1,5	3,7	2,8	5,1	2,6	3,1	1,6	2,7	1,2	2,1	0,8	2,2	0,8	2,3	1,4	1,5	0,5
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	98,6	99,3	97,9	98,8	96,8	98,2	96,6	98,5	96,3	97,2	94,9	97,4	96,9	98,4	97,2	98,3	98,2	99,3	97,8	99,2	98,4	99,3	98,5	99,5
1 a 2 días	0,9	0,4	1,5	0,8	1,8	1,0	2,5	1,1	2,3	2,1	3,1	1,7	1,6	1,0	1,3	0,6	0,8	0,4	1,0	0,4	0,6	0,4	0,6	0,3
3 a 5 días	0,2	0,2	0,3	0,2	0,6	0,5	0,5	0,2	0,9	0,5	1,0	0,5	0,7	0,3	0,7	0,3	0,3	0,0	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1
6 a 9 días	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,6	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
10 a 19 días	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.188.

Prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016.

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2
Sexo								
Hombres	98,8	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
Mujeres	99,6	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Edad								
14 años	99,5	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
15 años	99,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2
16 años	99,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
17 años	99,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2
18 años	97,8	0,6	0,4	0,4	0,1	0,2	0,1	0,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.189.

Prevalencia de consumo de cocaína base en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016.

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,5	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
Sexo								
Hombres	99,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3
Mujeres	99,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Edad								
14 años	99,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
15 años	99,4	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
16 años	99,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
17 años	99,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2
18 años	98,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.190.


Prevalencia de consumo de cocaína polvo y /o base en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016.

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
Sexo								
Hombres	98,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
Mujeres	99,5	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Edad								
14 años	99,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
15 años	99,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
16 años	99,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
17 años	99,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
18 años	97,6	0,6	0,4	0,4	0,1	0,3	0,1	0,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.191.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	3,6	5,5	3,6	6,2	6,4	5,0	3,3	2,7	2,5	3,0	1,2	2,3
Últimos 12 meses	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6
Últimos 30 días	2,1	2,3	1,6	2,8	1,9	1,5	1,4	1,2	1,0	1,2	0,4	0,6
Edad media de inicio del consumo	15,6	15,7	15,5	15,7	15,4	15,6	15,5	15,2	15,3	15,8	15,2	15,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.192.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,9	2,2	2,2	3,4	5,1
Últimos 12 meses	0,6	1,4	1,6	2,4	3,1
Últimos 30 días	0,3	0,6	0,6	0,7	1,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.193.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,7	1,6	1,9	3,4	4,3
Mujeres	0,6	1,2	1,3	1,4	1,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.194.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombre	2,7	2,0	0,9
Mujer	1,9	1,1	0,3
Total	2,3	1,6	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.195.

Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Hombres	4,7	6,1	4,0	7,6	7,0	6,0	4,2	3,5	3,2	3,9	1,6	2,7
Mujeres	2,5	4,8	3,2	4,8	5,8	3,9	2,5	2,0	1,9	2,0	0,8	1,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.196.


Características generales del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.688	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)	15,7	15,5	15,6	15,7	15,5	15,5	15,9	15,4	15,4	15,3	15,7	15,4	15,4	15,5	15,2	15,2	15,2	15,4	15,9	15,6	15,3	15,0	15,3	15,1
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,7	2,5	6,1	4,8	4,0	3,2	7,6	4,8	7,0	5,8	6,0	3,9	4,2	2,5	3,5	2,0	3,2	1,9	3,9	2,0	1,6	0,8	2,7	1,9
Prevalencia (%), últimos 12 meses	4,2	2,2	4,8	3,5	2,9	2,1	6,4	3,9	4,7	3,8	3,3	1,9	3,2	1,7	2,6	1,3	2,2	1,2	3,0	1,4	1,2	0,6	2,0	1,1
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,4	2,8	1,9	1,9	1,3	3,8	1,7	2,1	1,6	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	0,6	1,3	0,6	1,8	0,6	0,6	0,3	0,9	0,3
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	97,1	98,6	97,2	98,1	98,1	98,7	96,2	98,3	97,9	98,4	98,1	99,0	97,8	99,3	98,4	99,4	98,6	99,4	98,2	99,4	99,4	99,7	99,1	99,7
1 a 2 días	1,6	1,0	1,3	1,2	1,0	0,6	2,2	1,3	1,6	1,1	1,0	0,7	1,4	0,4	0,8	0,4	0,8	0,3	1,1	0,3	-	-	-	-
3 a 5 días	0,6	0,2	0,7	0,4	0,3	0,3	1,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-
6 a 9 días	0,4	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
10 a 19 días	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.197.

Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	4,2	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7
Últimos 12 meses	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2
Últimos 30 días	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	1,8	1,4	1,1	0,9	1,0	0,5	0,5
Edad media de inicio del consumo	15,5	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.198.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,7	1,7	1,5	2,4	4,0
Últimos 12 meses	0,5	1,1	1,0	1,7	2,8
Últimos 30 días	0,3	0,5	0,4	0,6	1,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.199.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,7	1,3	1,2	2,7	4,3
Mujeres	0,3	0,9	0,8	0,7	1,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.200.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombres	2,2	1,6	0,8
Mujeres	1,2	0,7	0,3
Total	1,7	1,2	0,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.201.

Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Hombres	5,3	6,6	5,5	5,7	6,2	6,0	4,2	4,6	3,4	3,2	1,8	2,2
Mujeres	3,1	4,1	3,2	3,3	4,9	3,6	2,7	2,8	1,8	1,5	0,9	1,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.202.

Características generales del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)	15,5	15,4	15,7	15,7	15,7	15,5	15,7	15,3	15,6	15,5	15,8	15,6	15,5	15,4	15,4	15,5	15,6	15,6	15,2	15,1	15,4	15,1	15,0	15,0
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	5,3	3,1	6,6	4,1	5,5	3,2	5,7	3,3	6,2	4,9	6,0	3,6	4,2	2,7	4,6	2,8	3,4	1,8	3,2	1,5	1,8	0,9	2,2	1,2
Prevalencia (%), últimos 12 meses	4,4	2,5	5,5	3,4	4,5	2,5	4,6	2,4	4,8	3,4	4,3	2,3	3,3	2,0	3,0	1,9	2,2	1,0	2,4	1,1	1,3	0,6	1,6	0,7
Prevalencia (%) últimos 30 días	2,9	1,6	3,2	2,0	2,7	1,5	2,5	1,4	2,5	1,5	2,7	1,0	2,0	1,0	1,7	0,7	1,3	0,5	1,4	0,6	0,7	0,2	0,8	0,3
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	44,8	49,8	51,8	52,0	51,1	53,1	55,1	59,1	57,9	66,8	97,3	99,0	98,0	99,0	97,4	99,2	98,6	99,5	98,6	99,4	99,3	99,8	99,2	99,7
1 a 2 días	32,7	33,6	31,5	29,0	29,5	29,9	31,6	27,4	30,1	23,6	1,3	0,6	1,0	0,6	0,8	0,4	0,6	0,3	0,7	0,4	-	-	-	-
3 a 5 días	10,6	8,9	8,8	12,5	8,4	8,9	7,0	9,7	5,9	6,1	0,6	0,2	0,4	0,2	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-
6 a 9 días	7,0	3,7	5,5	4,5	5,3	3,9	0,9	1,9	3,7	2,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
10 a 19 días	3,1	2,3	0,7	0,7	2,8	1,8	4,3	0,5	1,3	1,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
20 a 29 días	1,8	1,6	1,8	1,3	2,9	2,4	1,1	1,3	1,0	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.203.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6
Últimos 12 meses	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0
Últimos 30 días	2,6	2,8	2,0	2,0	1,2	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	0,6	0,4
Edad media de inicio del consumo	15,4	15,6	15,4	15,5	15,5	15,8	15,5	15,4	15,4	15,4	14,0	15,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.204.

Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,7	1,7	1,4	2,3	4,1
Últimos 12 meses	0,4	1,0	0,9	1,4	2,1
Últimos 30 días	0,2	0,4	0,3	0,5	0,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.205.


Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.206.


Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.207.

Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Hombres	6,7	8,0	6,1	7,2	5,6	6,2	5,7	5,6	4,6	4,1	2,3	2,1
Mujeres	3,6	5,6	5,0	4,4	3,4	3,3	2,7	2,6	2,4	2,1	1,2	1,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.208.

Evolución del consumo de alucinógenos y setas mágicas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alucinógenos	5,1	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	1,3	1,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.209.

Evolución del consumo de alucinógenos y setas mágicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,4	0,8	0,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.210.

Características generales del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)	15,4	15,4	15,6	15,6	15,5	15,4	15,6	15,3	15,6	15,4	15,8	15,7	15,5	15,5	15,4	15,2	15,3	15,4	15,5	15,2	14,1	13,8	15,0	15,4
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	6,7	3,6	8,0	5,6	6,1	5,0	7,2	4,4	5,6	3,4	6,2	3,3	5,7	2,7	5,6	2,6	4,6	2,4	4,1	2,1	2,3	1,2	2,1	1,1
Prevalencia (%) últimos 12 meses	5,7	3,1	6,9	4,5	4,8	3,2	5,5	2,9	4,4	2,0	4,4	1,8	4,1	1,6	3,9	1,7	3,0	1,3	2,9	1,1	1,6	0,7	1,4	0,6
Prevalencia (%) últimos 30 días	3,6	1,7	3,8	1,9	2,6	1,5	2,6	1,3	1,8	0,7	2,3	0,7	2,0	0,7	1,7	0,7	1,5	0,6	1,6	0,4	0,9	0,4	0,6	0,2
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	96,4	98,3	96,2	98,1	97,4	98,5	97,4	98,7	98,2	99,3	97,7	99,3	97,9	99,2	97,4	98,9	98,5	99,4	98,4	99,6	99,1	99,6	99,4	99,8
1 a 2 días	2,4	1,2	2,3	1,4	1,7	1,1	1,7	1,1	1,3	0,6	1,5	0,5	1,2	0,5	1,0	0,4	0,8	0,4	0,9	0,2	-	-	-	-
3 a 5 días	0,7	0,3	0,9	0,2	0,5	0,2	0,6	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0	0,3	0,1	-	-	-	-
6 a 9 días	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
10 a 19 días	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.211.

Evolución de la prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2016.




	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	2,1	2,2	1,3	1,4
Últimos 12 meses	1,6	1,4	0,8	0,9
Últimos 30 días	0,7	0,6	0,4	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.212.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8
Últimos 12 meses	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6
Últimos 30 días	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3
Edad media de inicio consumo	14,3	14,7	14,4	15,4	14,9	14,4	14,7	14,3	14,4	14,4	14,0	14,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.213.

Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,6	0,8	0,7	0,8	1,2
Últimos 12 meses	0,5	0,7	0,5	0,5	0,9
Últimos 30 días	0,3	0,3	0,3	0,4	0,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.214.

Prevalencia de consumo de heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,7	0,9	0,6	0,8	1,7
Mujeres	0,2	0,5	0,4	0,2	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.215.

Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Hombres	Mujeres	Total
Alguna vez en la vida	1,0	0,5	0,8
Últimos 12 meses	0,8	0,3	0,6
Últimos 30 días	0,6	0,1	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.216.

Evolución de la percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la percepción de disponibilidad de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Riesgo percibido consumo habitual	98,9	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5	96,4
Disponibilidad	48,0	25,6	29,1	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4	21,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.217.

Características generales del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)	14,4	14,1	14,6	15,1	14,0	15,1	15,5	15,1	14,9	14,8	14,2	15,0	14,5	14,7	14,3	14,2	14,2	14,7	14,7	13,8	14,1	13,8	13,7	14,6
Prevalencia(%) alguna vez en la vida	0,7	0,3	0,8	0,3	1,2	0,7	0,8	0,3	0,6	0,5	1,1	0,3	1,5	0,5	1,4	0,4	1,5	0,6	1,4	0,5	0,9	0,4	1,0	0,5
Prevalencia (%) últimos 12 meses	0,5	0,2	0,6	0,2	0,8	0,5	0,7	0,1	0,4	0,2	0,8	0,1	1,2	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	1,1	0,4	0,7	0,2	0,8	0,3
Prevalencia (%) últimos 30 días	0,4	0,1	0,4	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	0,7	0,1	0,9	0,2	0,9	0,3	0,7	0,3	0,8	0,3	0,5	0,2	0,6	0,1
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	99,6	99,9	99,6	99,9	99,4	99,8	99,5	99,9	99,7	99,8	99,3	99,9	99,0	99,8	98,4	99,5	99,3	99,7	99,2	99,7	99,5	99,8	99,4	99,9
1 a 2 días	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,5	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-
3 a 5 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-
6 a 9 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
10 a 19 días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
20 a 29 días	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	-	-	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.218.

Evolución del consumo de heroína, alucinógenos, éxtasis, anfetaminas e inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Heroína	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6
Alucinógenos	4,4	5,6	4,0	4,2	3,2	3,1	2,8	2,7	2,1	2,0	1,2	1,0
Éxtasis	3,2	4,1	2,5	5,2	4,3	2,6	2,4	1,9	1,7	2,2	0,9	1,6
Anfetaminas	3,5	4,4	3,4	3,5	4,1	3,3	2,6	2,5	1,6	1,7	0,9	1,2
Inhalables volátiles	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.219.

Evolución del consumo de heroína e inhalables volátiles alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.220.

Evolución del consumo de heroína e inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Heroína	0,5	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,8
Inhalables volátiles	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.221.

Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	3,1	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3,0	2,7	2,3	1,9	0,9	1,0
Últimos 12 meses	1,9	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	1,8	1,6	1,2	1,2	0,7	0,6
Últimos 30 días	1,1	1,2	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,4	0,3
Edad media de inicio consumo	13,3	13,6	13,4	13,9	14,3	14,0	13,6	13,8	13,2	13,4	13,9	13,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.222.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,9	1,1	1,0	0,9	1,7
Últimos 12 meses	0,5	0,6	0,6	0,5	1,4
Últimos 30 días	0,3	0,3	0,3	0,2	0,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.223.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.



	Hombres	Mujeres	Total
Alguna vez en la vida	1,2	0,9	1,0
Últimos 12 meses	0,8	0,4	0,6
Últimos 30 días	0,5	0,2	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.224.

Características generales del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.


	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Edad media de inicio de consumo (años)	13,8	12,4	13,9	13,3	13,7	13,0	14,0	13,7	14,3	14,2	13,9	14,1	13,8	13,4	13,6	14,2	13,1	13,2	13,8	12,6	13,9	14,0	13,9	13,7
Prevalencia (%) alguna vez en la vida	4,1	2,1	4,2	2,5	5,1	3,4	5,7	3,0	4,8	2,7	5,2	2,9	4,2	2,0	3,6	1,8	3,0	1,7	2,4	1,3	1,3	0,6	1,2	0,9
Prevalencia (%) últimos 12 meses	2,5	1,3	2,4	1,7	3,3	2,0	3,3	1,8	3,0	1,5	3,0	1,4	2,7	1,1	2,3	1,0	1,7	0,8	1,6	0,8	0,9	0,4	0,8	0,4
Prevalencia (%) últimos 30 días	1,5	0,8	1,5	1,0	2,2	1,5	1,8	1,1	1,5	0,8	1,6	0,7	1,7	0,6	1,4	0,5	1,2	0,5	1,0	0,6	0,6	0,3	0,5	0,2
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días																								
Nunca	98,5	99,2	98,5	99,0	97,8	98,5	98,2	98,9	98,5	99,2	98,4	99,3	98,2	99,4	97,7	99,1	98,8	99,5	99,0	99,4	99,4	99,7	99,5	99,8
1 a 2 días	0,8	0,5	0,9	0,8	1,1	1,0	1,3	0,7	1,0	0,5	0,8	0,4	0,8	0,3	0,8	0,3	0,6	0,2	0,4	0,4	-	-	-	-
3 a 5 días	0,2	0,1	0,3	0,1	0,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	-	-	-	-
6 a 9 días	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-
10 a 19 días	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
20 a 29 días	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.225.

Evolución de la prevalencia de consumo de GHB y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	1,2	1,1	1,2	1,3	1,0	0,6
Últimos 12 meses	0,8	0,8	0,7	1,0	0,7	0,4
Últimos 30 días	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,2
Edad media de inicio del consumo	15,0	15,0	14,6	15,1	14,8	14,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.226.

Evolución de la prevalencia de consumo de metanfetaminas y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2016.




	2010	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	0,8	0,9	0,8	1,4
Últimos 12 meses	0,6	0,7	0,5	1,0
Últimos 30 días	0,4	0,4	0,3	0,4
Edad media de inicio del consumo	-	-	-	15,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.227.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,6	1,2	1,4	1,8	3,2
Últimos 12 meses	0,4	0,7	1,1	1,3	2,4
Últimos 30 días	0,3	0,3	0,4	0,5	0,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.228.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,7	0,8	1,4	1,9	3,5
Mujeres	0,2	0,6	0,9	0,8	1,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.229.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Hombres	Mujeres	Total
Alguna vez en la vida	1,7	1,0	1,4
Últimos 12 meses	1,3	0,7	1,0
Últimos 30 días	0,6	0,2	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.230.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2010-2016.




	2010	2012	2014	2016
Hombres	1,2	1,3	1,1	1,7
Mujeres	0,5	0,6	0,4	1,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.231.

Evolución de la prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016.




	2012	2014	2016
Alguna vez en la vida	0,7	0,6	0,5
Últimos 12 meses	0,5	0,4	0,3
Últimos 30 días	0,3	0,3	0,2
Edad media inicio consumo	-	-	14,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.232.

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.



	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Alguna vez en la vida	0,4	0,4	0,5	0,5	1,1
Últimos 12 meses	0,2	0,3	0,3	0,3	0,7
Últimos 30 días	0,1	0,2	0,2	0,2	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.233.

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años
Hombres	0,4	0,4	0,4	0,5	1,3
Mujeres	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.234.

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.



	Hombres	Mujeres	Total
Alguna vez en la vida	0,8	0,2	0,5
Últimos 12 meses	0,5	0,1	0,3
Últimos 30 días	0,4	0,1	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.235.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.


	Total			14 años			15 años			16 años			17 años			18 años			14-17 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Número de casos	9.476	5.178	4.298	1.903	1.077	826	1.996	1.101	896	2.519	1.333	1.186	2.206	1.191	1.015	852	477	376	8.624	4.702	3.922
Sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio	27,2	29,5	24,9	21,6	24,1	19,0	27,6	29,6	25,6	27,3	29,2	25,4	30,6	33,5	27,8	36,0	37,8	34,0	26,6	28,8	24,3

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.236.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




	%
Bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster...)	21,3
Otras	3,2
Complejos vitamínicos (Berocca, Memovit, Pharmaton, Supradyn...)	2,5
Productos que contienen: Ginkgo Biloba, Guaraná, Ácidos grasos Omega 3, Jalea real, Acetil L-carnitina (ALC), fosfatidilserina...	2,4
Cocaína	1,1
Metilfenidato (Concerta, Rubifen, Medikinet, Equasym, Medicebran, Ritalín)	0,8
Anfetaminas o speed (anfetas, metanfetamina, ice)	0,7
Piracetam (Nootropil, Ciclofalina, Anacervix), Aniracetam	0,5
Durvitan	0,4
Elvanse, Adderall	0,3
Modafinilo (Modiodal, Provigil)	0,3
Donepezilo (Aricept, Donebrain)	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.237.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido estas sustancias (%). España, 2016.



	%
Bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster...)	82,6
Otras	12,3
Complejos vitamínicos (Berocca, Memovit, Pharmaton, Supradyn...)	9,5
Productos que contienen: Ginkgo Biloba, Guaraná, Ácidos grasos Omega 3, Jalea real, Acetil L-carnitina (ALC), fosfatidilserina...	9,2
Cocaína	4,2
Metilfenidato (Concerta, Rubifen, Medikinet, Equasym, Medicebran, Ritalín)	3,1
Anfetaminas o speed (anfetas, metanfetamina, ice)	2,7
Piracetam (Nootropil, Ciclofalina, Anacervix), Aniracetam	1,9
Durvitan	1,4
Elvanse, Adderall	1,3
Modafinilo (Modiodal, Provigil)	1,3
Donepezilo (Aricept, Donebrain)	1,2

Porcentaje calculado sobre los estudiantes que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.238.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras), binge drinking, tabaco, cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida (%). España, 2016.

	Total alumnos	Borracheras últimos 12 meses		Binge drinking últimos 30 días		Tabaco últimos 12 meses		Cannabis últimos 12 meses		Cannabis (consumo problemático)*	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Nº casos	9.476	5.220	3.858	4.345	5.047	4.868	4.597	3.942	5.452	577	2.778
Sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio	27,2	57,5	42,5	46,3	53,7	51,4	48,6	42,0	58,0	17,2	82,8


\* Consumo problemático (CAST ≥4). CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

Se lee: entre los que han consumido sustancias Estimulantes para estudiar un X% se han emborrachado.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.239.


Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes que han consumido dichas sustancias (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.240.


Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.241.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




	Spice	Ketamina	Salvia	Mefedrona
Hombres	0,9	0,4	0,4	0,5
Mujeres	0,4	0,2	0,3	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.242.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.



	Spice	Ketamina	Salvia	Mefedrona
14 años	0,5	0,4	0,4	0,4
15 años	0,9	0,7	0,5	0,5
16 años	1,1	0,6	0,7	0,5
17 años	1,1	0,6	0,5	0,4
14-17 años	0,9	0,5	0,5	0,5
18 años	1,5	1,0	0,9	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.243.


Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.244.

Desconocimiento de los problemas de salud que conlleva el consumo de nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alguna vez en la vida alguna de las siguientes nuevas sustancias (%). España, 2016.




Se excluyen de la base los casos que no contestan y no han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.245.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.246.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la hora de regreso a casa en la última salida (%). España, 2016.




Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.247.

Prevalencia de sustancias psicoactivas (nuevas sustancias frente a legales e ilegales) consumidas alguna vez en la vida, según la hora de regreso a casa en la última salida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

Sustancias legales: alcohol, tabaco, hipnosedantes con y o sin receta e inhalables volátiles.

Sustancias ilegales: cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.248.


Evolución de las prevalencias de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2016.

	Prevalencia de consumo alguna vez en la vida				Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses				Prevalencia de consumo en los últimos 30 días			
	2010	2012	2014	2016	2010	2012	2016	2014	2010	2012	2014	2016
Ketamina	1,1	1,1	0,7	0,6	0,8	0,7	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2
Spice	1,1	1,4	0,8	0,9	0,8	1,0	0,6	0,7	0,5	0,6	0,3	0,3
Piperazinas	0,4	0,4	-	-	0,3	0,3	-	-	0,2	0,2	-	-
Mefedrona	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2
Nexus	0,5	0,5	-	-	0,3	0,4	-	-	0,2	0,3	-	-
Metanfetamina	0,8	0,9	0,8	-	0,6	0,7	0,5	-	0,4	0,4	0,3	-
Setas mágicas	2,1	2,2	1,3	-	1,6	1,4	0,8	-	0,7	0,6	0,4	-
Research Chemicals	0,4	0,4	-	-	0,3	0,3	-	-	0,2	0,2	-	-
Legal Highs	0,7	0,4	-	-	0,6	0,3	-	-	0,5	0,2	-	-
Salvia	-	0,8	0,7	0,6	-	0,5	0,4	0,4	-	0,3	0,3	0,2
Esteroides anabolizantes	-	0,7	0,6	-	-	0,5	0,4	-	-	0,3	0,3	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.249.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016.




	Sí consumidor de nuevas sustancias	No consumidor de nuevas sustancias
Alcohol	88,8	66,3
Borracheras últimos 30 días	55,1	21,1
Binge drinking	67,5	30,8
Tabaco	72,8	26,0
Hipnosedantes con o sin receta	24,6	5,5
Cannabis	70,5	17,1
Cocaína polvo y/o base	25,2	0,6
Éxtasis	18,9	0,3
Anfetaminas	17,9	0,2
Alucinógenos	14,6	0,1
Heroína	14,2	0,1
Inhalables volátiles	9,6	0,2
GHB	10,0	0,1

Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.250.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016.




	Sí consumidor de nuevas sustancias	No consumidor de nuevas sustancias
Alcohol	93,3	75,0
Borracheras últimos 12 meses	75,9	41,7
Botellón	78,1	51,4
Tabaco	76,7	33,5
Hipnosedantes con o sin receta	37,7	11,1
Cannabis	79,4	25,0
Cocaína polvo y/o base	40,6	1,7
Éxtasis	32,4	1,0
Anfetaminas	30,0	0,6
Alucinógenos	27,6	0,5
Heroína	18,5	0,2
Inhalables volátiles	15,8	0,3
GHB	15,3	0,1

Nuevas sustancias psicoactivas: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.251.

Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016.



	Sustancias legales (alcohol y/o tabaco)	Sustancias ilegales	Ninguna sustancia legal e ilegal
Sí consumidor de nuevas sustancias	90,8	72,7	6,0
No consumidor de nuevas sustancias	68,0	17,5	29,6


Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.252.

Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias. España, 2016.



	Sustancias legales (alcohol y/o tabaco)	Sustancias ilegales
Sí consumidor de nuevas sustancias	94,3	80,5
No consumidor de nuevas sustancias	76,0	25,7


Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.253.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis (puntuación CAST  $\geq 4$ ) o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida o no (%). España, 2016.



CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.254.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez\* de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), por sexo y edad (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Consumir ketamina alguna vez	77,2	72,0	82,7	69,8	74,6	77,6	81,7	76,3	86,7
Consumir spice alguna vez	77,7	71,8	83,8	69,9	75,0	78,8	81,5	76,8	87,9
Consumir mefedrona alguna vez	75,9	70,5	82,2	68,3	73,6	76,8	80,7	75,0	87,2
Consumir salvia alguna vez	71,5	67,2	76,5	65,0	70,2	72,4	74,8	70,8	80,9

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

H = Hombres; M = Mujeres.

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.255.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez\* de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2016.

	SÍ consumen esa sustancia	NO consumen esa sustancia
Consumir ketamina alguna vez	46,3	77,7
Consumir spice alguna vez	46,0	78,7
Consumir mefedrona alguna vez	55,3	76,3
Consumir salvia alguna vez	54,8	76,2

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia y se considera consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.256.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2010-2016.

	2010	2012	2014	2016
Consumir ketamina alguna vez	50,5	53,2	47,2	35,0
Consumir spice alguna vez	47,0	50,1	47,6	35,7
Consumir mefedrona alguna vez	43,2	41,1	43,1	30,7
Consumir metanfetamina alguna vez	46,7	54,0	54,1	-
Consumir setas mágicas alguna vez	48,2	54,4	51,2	-
Consumir salvia alguna vez	-	39,6	39,6	28,2
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	-	52,3	50,2	-
Consumir piperazinas habitualmente	43,6	41,4	-	-
Consumir nexus habitualmente	42,7	41,2	-	-
Consumir research chemicals habitualmente	41,4	39,6	-	-
Consumir legal highs habitualmente	41,3	40,7	-	-

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente. Habitualmente: una vez por semana o más frecuentemente.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.257.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2010-2016.

	2012	2014	2016
Consumir ketamina alguna vez	68,2	82,2	77,2
Consumir spice alguna vez	72,4	82,7	77,7
Consumir mefedrona alguna vez	74,8	83,0	75,9
Consumir metanfetamina alguna vez	75,4	87,4	-
Consumir setas mágicas alguna vez	65,3	77,6	-
Consumir salvia alguna vez	71,2	78,8	71,5
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	65,3	81,1	-

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente. Habitualmente: una vez por semana o más frecuentemente.

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia.

Entre los que han contestado la pregunta, eliminando los casos de NS/NC, blancos y que nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.258.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de las siguientes nuevas sustancias psicoactivas, según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2016.

No saben los problemas de salud que pueden causar			
	Todos	Sí consumen esa sustancia	NO consumen esa sustancia
Consumir salvia alguna vez	49,7	23,9	50,1
Consumir mefedrona alguna vez	48,4	41,8	48,4
Consumir ketamina alguna vez	44,4	32,5	44,5
Consumir spice alguna vez	43,8	30,4	44,1

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia y se considera consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.259.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga). España, 2010-2016.

	2010	2012	2014	2016
Ketamina	40,2	41,9	38,8	51,5
Spice	39,8	42,6	41,4	53,7
Piperazinas	31,5	34,4	-	-
Mefedrona	30,9	33,9	35,4	46,0
Nexus	30,5	34,8	-	-
Metanfetamina	39,8	43,8	42,9	-
Setas mágicas	50,3	52,0	49,0	-
Research chemicals	30,6	34,4	-	-
Legal highs	32,8	35,4	-	-
Salvia	-	37,5	37,7	48,5
Esteroides anabolizantes	-	54,0	51,6	-

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.260.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (%). España, 2010-2016.


	Todos				Sí consumen esa sustancia				NO consumen esa sustancia			
	2010	2012	2014	2016	2010	2012	2016	2014	2010	2012	2014	2016
Ketamina	40,2	41,8	38,8	51,5	83,6	74,4	76,8	75,0	39,4	41,0	38,2	51,0
Spice	39,8	42,5	41,4	53,7	79,1	73,4	78,9	86,5	39	41,4	40,6	52,6
Piperazinas	31,5	34,2	-	-	75,6	66,2	-	-	31,2	33,8	-	-
Mefedrona	30,9	34,2	35,4	46,0	78,2	66,2	69,7	73,7	30,5	33,8	35,0	45,6
Nexus	30,5	34,6	-	-	73,4	66,2	-	-	30,1	34,1	-	-
Metanfetamina	39,8	43,6	42,9	-	80,5	74,7	78,7	-	39,2	43,0	42,2	-
Setas mágicas	50,3	52,0	49,0	-	84,7	84,2	84,3	-	48,9	50,4	48,0	-
Research chemicals	30,6	34,2	-	-	67	75,6	-	-	30,3	33,8	-	-
Legal highs	32,8	35,1	-	-	79,3	73,9	-	-	32,2	34,7	-	-
Salvia	-	37,3	37,7	48,5	-	75,4	78,4	86,4	-	36,4	36,9	47,6
E. anabolizantes	-	53,9	51,6	-	-	72,7	81,4	-	-	53,7	51,3	-

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia y se eliminan los casos sin información.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.261.

Formas de conseguir nuevas sustancias en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2016.




	2014	2016
Me la ofreció un amigo	55,0	53,7
A través de un vendedor (camello)	45,0	34,5
Me la ofrecieron en una fiesta, en un pub, en un bar	23,1	27,3
Las compré en una tienda especializada (smart shop o head shop)	8,0	6,4
Otros sitios	15,9	5,8
A través de internet	6,2	5,3

Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.262.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




\* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.263.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



\* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.264.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	18,9	21,7	30,0
Una sola sustancia	32,9	36,7	39,2
Dos sustancias	19,4	18,1	16,3
Tres sustancias	19,5	17,5	12,3
Cuatro o más sustancias	9,3	6,0	2,2

\* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.265.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M
Ninguna sustancia	20,3	17,6	23,3	20,1	31,5	28,5
Una sola sustancia	33,6	32,3	37,1	36,2	39,0	39,4
Dos sustancias	17,7	21,0	16,1	20,1	14,3	18,3
Tres sustancias	19,6	19,4	17,6	17,4	13,0	11,7
Cuatro sustancias	5,4	7,3	3,5	4,8	1,4	1,7
Cinco o más sustancias	3,4	2,5	2,3	1,4	0,9	0,4

\* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.266.

Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016.

	2012	2014	2016
Ninguna sustancia	16,8	21,0	21,7
Una sola sustancia	38,9	39,1	36,7
Dos sustancias	20,1	17,7	18,1
Tres sustancias	17,5	16,7	17,5
Cuatro sustancias	3,9	3,7	4,2
Cinco o más sustancias	2,8	1,8	1,9

\* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.267.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la edad (%). España, 2016.

	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Ninguna sustancia	40,7	23,0	15,8	9,7	22,8	6,7
Una sola sustancia	35,9	37,9	39,2	35,7	37,2	29,0
Dos sustancias	13,5	18,3	19,2	21,0	17,8	21,7
Tres sustancias	7,5	15,7	19,7	25,2	16,7	28,3
Cuatro sustancias	1,7	3,3	4,4	5,7	3,7	10,2
Cinco o más sustancias	0,8	1,8	1,7	2,7	1,7	4,1

\* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.268.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)\* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ninguna sustancia	68,3	73,8	82,2
Una sola sustancia	27,4	23,2	16,8
Dos sustancias	2,2	1,4	0,4
Tres sustancias	0,8	0,6	0,3
Cuatro sustancias	0,5	0,4	0,1
Cinco o más sustancias	0,8	0,6	0,2

\* Sustancias ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.269.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016.

	2012	2014	2016
Ninguna sustancia	73,2	74,1	73,8
Una sola sustancia	22,7	22,9	23,2
Dos sustancias	1,6	1,5	1,4
Tres sustancias	0,8	0,7	0,6
Cuatro sustancias	0,6	0,2	0,4
Cinco o más sustancias	1,1	0,6	0,6

\* Sustancias ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.270.

Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína polvo y/o base, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila)\*. España, 2016.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Hipnosedantes**	Hipnosedantes***	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Éxtasis	Heroína	Inhalables volátiles	GHB
Alcohol	100,0	44,7	34,1	6,3	13,1	2,8	1,6	3,2	1,5	1,3	2,0	0,7	0,7	0,4
Tabaco	97,0	100,0	62,8	8,6	16,9	5,2	3,1	5,9	2,8	2,4	3,9	1,2	1,2	0,8
Cannabis	97,7	82,5	100,0	9,9	18,3	7,5	4,3	8,4	4,0	3,4	5,5	1,9	1,7	1,2
Hipnosedantes**	88,1	55,6	48,1	100,0	100,0	9,7	6,6	10,9	5,7	6,5	7,3	3,7	4,1	3,1
Hipnosedantes***	85,4	50,2	41,3	47,1	100,0	6,8	4,3	7,6	3,8	3,8	4,9	2,3	2,4	1,8
Cocaína en polvo	98,7	84,4	91,7	24,9	37,7	100,0	44,5	100,0	37,9	28,2	42,0	19,8	14,4	12,4
Cocaína base	96,1	84,4	89,7	29,1	40,6	76,8	100,0	100,0	39,2	32,9	45,0	30,3	21,8	21,7
Cocaína polvo y/o base	97,4	83,0	89,3	24,3	36,3	88,5	52,1	100,0	34,8	26,0	38,6	19,4	13,8	12,0
Anfetaminas/speed	96,3	83,5	91,2	26,7	38,7	68,5	41,6	71,7	100,0	48,1	62,8	31,5	25,5	23,8
Alucinógenos	96,2	84,0	92,6	35,8	46,3	61,1	41,8	64,1	57,5	100,0	61,3	36,2	30,7	28,3
Éxtasis	97,5	84,5	90,7	25,4	37,1	55,5	34,8	58,0	46,0	37,8	100,0	23,7	19,3	16,8
Heroína	93,8	73,7	88,8	36,1	49,6	78,0	66,6	83,9	67,0	63,8	68,7	100,0	48,4	43,8
Inhalables volátiles	92,5	70,2	73,4	35,8	45,7	50,2	44,4	54,1	49,2	49,4	50,9	43,0	100,0	36,3
GHB	92,1	77,4	88,2	44,3	55,2	74,7	72,6	79,0	74,2	75,1	73,7	65,8	60,2	100,0

\* Porcentaje de consumidores de la sustancia (fila) que también consumen la sustancia (columna).

\*\* Hipnosedantes (sin receta).

\*\*\* Hipnosedantes (con o sin receta).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.271.

Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína polvo y/o base, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila)\*. España, 2016.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Hipnosedantes**	Hipnosedantes***	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Éxtasis	Heroína	Inhalables volátiles	GHB
Alcohol	100,0	38,3	25,9	3,2	6,8	1,2	0,8	1,4	0,7	0,5	0,8	0,5	0,4	0,3
Tabaco	93,7	100,0	52,1	4,7	9,6	2,4	1,7	2,9	1,5	1,1	1,7	0,9	0,8	0,6
Cannabis	94,2	77,5	100,0	6,0	10,6	4,1	2,7	4,8	2,4	1,8	2,8	1,6	1,2	1,0
Hipnosedantes**	81,8	48,3	41,1	100,0	100,0	6,9	5,8	8,1	5,5	4,9	6,0	4,8	4,2	4,0
Hipnosedantes***	77,7	44,4	32,9	45,9	100,0	4,4	3,5	5,2	3,2	2,9	3,8	2,7	2,5	2,1
Cocaína en polvo	96,1	77,4	88,3	22,5	31,6	100,0	49,8	100,0	38,3	22,7	38,1	26,3	19,1	16,0
Cocaína base	96,4	81,6	88,4	28,9	38,8	77,2	100,0	100,0	39,9	30,9	44,6	39,4	26,7	22,7
Cocaína polvo y/o base	95,5	77,6	86,8	22,1	31,7	88,1	58,7	100,0	34,5	21,2	35,4	25,4	17,1	14,6
Anfetaminas/speed	91,5	75,4	84,2	27,1	36,5	65,3	45,1	70,6	100,0	48,1	62,8	44,4	36,6	35,2
Alucinógenos	91,4	77,2	85,3	33,9	46,0	57,4	51,6	63,3	66,1	100,0	68,6	56,8	44,3	48,3
Éxtasis	92,9	76,2	86,2	26,6	37,8	57,1	44,5	62,1	56,0	43,6	100,0	39,9	29,0	30,4
Heroína	93,4	72,5	87,3	37,2	46,5	73,2	66,9	81,1	69,6	63,4	69,7	100,0	55,5	52,0
Inhalables volátiles	83,9	64,6	65,7	32,7	43,4	50,8	46,6	53,7	57,2	50,1	50,5	51,9	100,0	45,1
GHB	86,8	72,5	77,3	44,1	53,3	65,6	62,4	72,7	78,5	76,3	75,4	72,3	65,5	100,0

\* Porcentaje de consumidores de la sustancia (fila) que también consumen la sustancia (columna).

\*\* Hipnosedantes (sin receta). \*\*\* Hipnosedantes (con o sin receta).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.272.

Prevalencia de consumo de una, dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2016.


	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Alcohol	45,3	23,6	23,2	8,0
Tabaco	2,0	31,3	49,5	17,1
Cannabis	1,2	14,4	61,6	22,9
Hipnosedantes sin receta	10,3	30,4	16,4	42,9
Hipnosedantes con o sin receta	13,3	32,9	17,6	36,2
Cocaína en polvo	0,6	2,9	3,3	93,3
Cocaína base	1,6	3,9	3,7	90,8
Cocaína polvo y/o base	1,3	4,5	4,6	89,6
Éxtasis	0,7	3,2	4,8	91,3
Anfetaminas/speed	0,5	1,1	4,6	93,7
Alucinógenos	0,4	2,7	2,4	94,5
Heroína	0,0	5,6	2,6	91,8
Inhalables volátiles	5,1	11,1	4,4	79,4
GHB	2,1	2,0	1,0	94,8

Nota: policonsumo de drogas legales e ilegales = alcohol, tabaco, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.273.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2016.




	Cannabis	Cocaína polvo y/o base	Éxtasis	Anfetaminas o speed	Alucinógenos	Heroína	I. volátiles	GHB
Ha hecho binge drinking últimos 30 días	39,1	2,5	1,4	1,3	0,9	0,8	0,7	0,5
No ha hecho binge drinking últimos 30 días	8,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1

Se lee: entre los que han hecho binge drinking un X% ha consumido cannabis.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.274.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2016.




	Cannabis	Cocaína polvo y/o base	Éxtasis	Anfetaminas o speed	Alucinógenos	Heroína	I. volátiles	GHB
Se ha emborrachado últimos 30 días	45,3	2,8	1,6	1,4	1,0	0,8	0,7	0,4
No se ha emborrachado últimos 30 días	10,0	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Se lee: entre los que se han emborrachado un X% ha consumido cannabis.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.275.

Prevalencia de consumo conjunto\* de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016.




	2008	2010	2012	2014	2016
Total	24,9	22,9	19,6	17,3	15,2
Sexo					
Hombres	28,0	24,8	22,7	19,5	16,5
Mujeres	21,8	21,0	16,5	15,2	13,9
Edad					
14 años	11,4	9,1	6,8	6,3	5,0
15 años	21,0	17,3	12,9	12,5	12,4
16 años	27,3	26,2	19,6	20,7	17,1
17 años	33,2	33,4	25,8	25,5	24,1
14-17 años	-	-	-	-	14,3
18 años	38,1	35,9	29,7	25,8	27,9

\* Consumo de alcohol y cannabis sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.276.

Prevalencia de consumo conjunto\* de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016.




	2008	2010	2012	2014	2016
Total	4,1	3,0	1,6	1,2	1,2
Sexo					
Hombres	5,1	3,7	2,2	1,5	1,6
Mujeres	3,1	2,3	1,0	0,8	0,8
Edad					
14 años	2,6	1,8	0,5	0,7	0,5
15 años	3,4	2,0	0,8	1,0	0,9
16 años	4,0	2,7	1,4	1,1	1,1
17 años	4,9	4,4	1,9	1,4	1,5
14-17 años	–	–	–	–	1,0
18 años	8,1	6,1	3,5	2,1	4,2

\* Consumo de alcohol y cocaína sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.277.

Prevalencia de consumo conjunto\* de tabaco y cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2012-2016.




	2012	2014	2016
Total	20,9	19,7	21,5
Sexo			
Hombres	22,2	20,7	22,1
Mujeres	19,5	18,7	20,9
Edad			
14 años	8,1	8,5	8,8
15 años	15,4	14,9	19,1
16 años	20,6	23,1	23,8
17 años	26,5	27,4	30,7
14-17 años	-	-	20,2
18 años	30,7	29,9	39,1

\* Se obtiene de cruzar a las personas que han consumido ambas sustancias en el mismo periodo.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.278.

Prevalencia de consumo conjunto de tabaco diario y cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2012-2016.




	2012	2014	2016
Total	6,8	5,9	6,1
Sexo			
Hombres	7,1	6,3	6,5
Mujeres	6,4	5,4	5,7
Edad			
14 años	1,5	1,5	1,7
15 años	4,0	3,7	5,0
16 años	6,2	7,2	6,9
17 años	9,1	8,6	9,2
14-17 años	-	-	5,6
18 años	12,0	11,6	13,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.279.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2016.




■ Heroína   
 ■ Cocaína en polvo   
 ■ Éxtasis   
 ■ Hipnosedantes   
 ■ Cannabis   
 ■ Tabaco (un paquete diario)  
■ Tomar 5 o 6 cañas/copas en fin de semana   
■ Tomar 1 o 2 cañas/copas diariamente

	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Heroína	98,9	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	97,0	96,2	96,3	96,9	97,5	96,4
Cocaína en polvo	98,5	97,6	97,4	96,9	97,4	97,8	96,8	96,0	96,2	96,6	96,9	96,4
Éxtasis	97,2	97,1	97,0	95,5	96,7	97,2	97,0	96,1	95,9	96,5	96,9	96,2
Hipnosedantes	90,6	88,6	88,5	87,4	88,7	89,7	87,5	86,6	85,5	89,5	88,6	87,7
Cannabis	91,9	87,7	85,9	82,8	81,7	83,7	89,0	88,3	88,7	88,1	88,8	90,7
Tabaco (un paquete diario)	76,9	75,2	78,0	77,3	78,9	80,3	87,3	88,8	90,4	91,4	89,7	91,8
Tomar 5 o 6 cañas/copas en fin de semana	43,8	45,2	44,8	44,9	44,8	41,2	51,3	47,2	47,0	47,5	55,3	56,1
Tomar 1 o 2 cañas/copas diariamente	50,2	48,5	45,9	44,0	43,6	41,4	57,4	57,9	59,8	59,7	57,8	52,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.280.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de distintas drogas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2008-2016.



	2008	2012	2016
Consumir alcohol (5 o 6 cañas/copas en fin de semana)	56,1	47,5	47,2
Consumir alcohol (1 o 2 cañas/copas cada día)	52,9	59,7	57,9
Consumir hipnosedantes habitualmente	87,7	89,5	86,6
Consumir cannabis habitualmente	90,7	88,1	88,3
Consumir un paquete tabaco/día	91,8	91,4	88,8
Consumir éxtasis habitualmente	96,2	96,5	96,1
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,4	96,6	96
Consumir heroína habitualmente	96,4	96,9	96,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.281.

Evolución del riesgo percibido del consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

	1994		1996		1998		2000		2002		2004		2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número de encuestados	10.415	10.374	8.867	9.668	8.224	9.341	10.147	9.777	12.964	13.946	12.864	13.076	12.598	13.856	14.951	15.232	15.595	16.372	13.769	13.734	18.405	19.081	17.649	17.720
Fumar un paquete de tabaco diario	74,7	79,1	72,8	77,4	75,7	79,9	75,1	79,5	76,7	80,8	78,2	82,3	84,9	89,3	86,5	91,0	88,9	91,7	89,6	93,1	88,1	91,1	91,0	92,7
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	39,8	47,7	40,6	49,4	40,3	48,7	41,5	48,3	41,1	48,1	36,8	45,7	48,7	53,6	45,1	49,2	44,2	49,5	44,7	50,3	52,6	57,7	55,7	56,5
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario	46,3	54,6	43,7	52,9	41,7	49,4	39,4	48,4	38,7	47,9	36,8	45,7	52,3	61,9	52,7	62,9	56,7	62,6	55,1	64,1	53,3	62,0	48,7	56,9
Fumar cannabis habitualmente	89,8	93,9	84,9	90,2	82,4	88,8	79,4	86,1	77,5	85,4	81,1	86,2	85,7	91,7	84,5	91,8	85,5	91,6	84,3	91,7	85,4	91,9	88,0	93,2
Tomar hipnosedantes habitualmente	89,9	91,3	87,8	89,4	87,5	89,2	86,9	87,9	88,3	89,1	89,8	89,6	86,1	88,6	84,6	88,4	83,8	87,0	88,7	90,3	88,3	89,0	87,2	88,1
Consumir éxtasis habitualmente	96,6	97,9	96,2	97,9	96,3	97,5	95,0	95,9	96,4	97,1	97,1	97,3	95,8	98,0	94,1	97,8	94,6	97,1	95,2	97,8	95,9	97,8	95,5	97,0
Consumir cocaína en polvo habitualmente	98,1	99,0	96,9	98,3	96,7	98,0	96,3	97,5	96,9	97,8	97,5	98,1	95,6	97,9	94,0	97,8	95,0	97,3	95,4	97,9	96,0	97,7	95,7	97,1
Consumir heroína habitualmente	98,4	99,3	97,4	98,8	97,5	98,7	97,6	98,8	98,4	98,8	98,5	99,1	95,8	98,1	94,3	98,0	95,0	97,5	95,7	98,0	96,4	98,4	95,6	97,1

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.282.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Fumar cannabis alguna vez	54,1	53,0	55,2	64,9	57,0	50,6	45,9	54,5	49,3
Consumir cocaína en polvo alguna vez	78,1	79,5	76,7	75,8	77,6	78,0	79,8	77,8	82,5
Consumir cocaína base alguna vez	82,8	83,9	81,8	79,9	81,5	82,7	85,6	82,4	88,0
Consumir éxtasis alguna vez	80,3	81,5	79,1	78,7	79,3	79,8	82,0	79,9	85,1
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	80,4	81,5	79,2	77,5	80,0	80,3	82,2	80,0	85,0
Consumir alucinógenos alguna vez	80,3	80,7	79,9	79,1	79,8	79,4	81,8	80,0	84,4
Consumir heroína alguna vez	82,3	83,6	81,1	79,2	81,4	82,0	85,2	81,9	87,5
Inyectarse drogas alguna vez	88,7	89,3	88,1	86,9	87,3	89,1	90,8	88,5	90,6
Consumir GHB alguna vez	88,1	88,7	87,6	85,8	86,8	88,8	90,3	88,0	90,3
Consumir metanfetamina alguna vez	85,9	86,4	85,3	83,8	84,9	86,1	88,0	85,7	88,3
Consumir setas mágicas alguna vez	83,0	82,7	83,2	83,9	82,8	83,2	82,2	83,0	81,9
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	84,7	84,9	84,5	83,2	84,0	84,6	86,3	84,6	86,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.283.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Fumar un paquete de tabaco diario	91,8	91,0	92,7	91,2	90,9	92,3	93,0	91,9	91,4
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	68,2	67,1	69,3	71,7	67,3	68,7	67,0	68,8	61,0
Fumar cigarrillos electrónicos	34,2	32,8	35,6	36,1	32,4	33,3	34,2	34,0	37,3
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	56,1	55,7	56,5	65,4	58,5	53,5	49,1	56,6	49,7
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	52,9	48,7	56,9	55,5	51,9	52,5	52,0	53,0	51,8
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	90,5	89,0	91,9	91,5	89,6	90,4	91,1	90,7	88,2
Tomar hipnosedantes habitualmente	87,7	87,2	88,1	86,3	86,7	89,0	88,1	87,6	88,6
Fumar cannabis habitualmente	90,7	88,0	93,2	93,2	91,3	90,0	89,4	90,9	86,9
Consumir cocaína polvo habitualmente	96,4	95,7	97,1	95,8	95,9	96,6	97,3	96,4	96,0
Consumir éxtasis habitualmente	96,2	95,5	97,0	95,4	95,3	96,7	97,4	96,2	96,1
Consumir anfetaminas o speed habitualmente	96,0	95,2	96,9	95,0	95,4	96,4	97,3	96,1	96,0
Consumir alucinógenos habitualmente	95,8	94,8	96,8	95,0	94,9	96,3	96,9	95,8	95,9
Consumir heroína habitualmente	96,4	95,6	97,1	95,7	95,7	96,8	97,3	96,4	96,2

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.284.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal\* (%). España, 2016.

	Ha consumido alguna droga ilegal en los últimos 12 meses	
	Sí	No
Fumar un paquete de tabaco diario	88,9	93,1
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	56,0	72,8
Fumar cigarrillos electrónicos	30,4	35,6
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	46,1	59,9
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	48,5	54,5
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	87,4	91,8
Tomar hipnosedantes habitualmente	86,8	88,0
Fumar cannabis habitualmente	80,3	94,7
Consumir cocaína en polvo habitualmente	95,8	96,7
Consumir éxtasis habitualmente	95,8	96,5
Consumir anfetaminas o speed habitualmente	95,7	96,3
Consumir alucinógenos habitualmente	95,0	96,2
Consumir heroína habitualmente	96,1	96,6

Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con receta, ni inhalables volátiles. Incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.285.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal\* (%). España, 2016.

	Ha consumido alguna droga ilegal en los últimos 12 meses	
	Sí	No
Fumar cannabis alguna vez	31,3	62,9
Consumir cocaína en polvo alguna vez	79,1	77,6
Consumir cocaína base alguna vez	85,3	81,8
Consumir éxtasis alguna vez	80,1	80,3
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	80,6	80,2
Consumir alucinógenos alguna vez	78,3	81,1
Consumir heroína alguna vez	84,7	81,3
Inyectarse drogas alguna vez	90,1	88,2
Consumir GHB alguna vez	89,4	87,7
Consumir metanfetamina alguna vez	86,4	85,7
Consumir setas mágicas alguna vez	78,4	84,7
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	85,3	84,5

Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con receta, ni inhalables volátiles. Incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.286.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de hipnosedantes (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses (%). España, 2016.

	Consumo de hipnosedantes en los últimos 12 meses	
	Sí	No
Tomar hipnosedantes habitualmente	77,4	89,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.287.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, o el consumo esporádico, una vez por al mes o menos frecuentemente puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan hecho binge drinking o se hayan emborrachado en los últimos 30 días y según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.

	Total estudiantes E. Secundarias de 14-18 años	Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	Se ha emborrachado en los últimos 30 días	CAST ≥4 (consumo problemático de cannabis)
Fumar un paquete de tabaco diario	91,8	89,4	89,8	79,6
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	68,2	58,2	58,0	40,0
Fumar cigarrillos electrónicos	34,2	30,4	29,2	31,4
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	56,1	41,9	41,4	40,3
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	52,9	46,6	47,7	45,8
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	90,5	86,3	87,1	82,6
Tomar hipnosedantes habitualmente	87,7	87,9	87,8	83,1
Fumar cannabis habitualmente	90,7	85,9	84,6	61,3
Consumir cocaína en polvo habitualmente	96,4	96,0	96,5	93,6
Consumir éxtasis habitualmente	96,2	96,0	96,4	93,5
Consumir anfetaminas o speed habitualmente	96,0	95,9	96,3	92,9
Consumir alucinógenos habitualmente	95,8	95,6	95,9	91,2
Consumir heroína habitualmente	96,4	96,3	96,6	93,5
Fumar cannabis alguna vez	54,1	45,1	40,9	24,1
Consumir cocaína en polvo alguna vez	78,1	79,6	79,6	73,4
Consumir cocaína base alguna vez	82,8	85,0	85,5	85,1
Consumir éxtasis alguna vez	80,3	81,1	80,9	75,4
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	80,4	81,5	81,6	75,2
Consumir alucinógenos alguna vez	80,3	80,6	80,3	72,8
Consumir heroína alguna vez	82,3	84,3	84,9	83,9
Inyectarse drogas alguna vez	88,7	89,3	90,2	88,5
Consumir GHB alguna vez	88,1	89,6	90,0	87,6
Consumir metanfetamina alguna vez	85,9	86,6	87,1	83,6
Consumir setas mágicas alguna vez	83,0	81,7	80,8	69,9
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	84,7	85,7	85,8	83,2

CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)

## 1.2.288.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2016.

	Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días		Consumo de alcohol en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No
Fumar un paquete de tabaco diario	83,7	89,8	91,1	93,4
Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios	34,7	57,9	64,3	76,3
Fumar cigarrillos electrónicos	30,2	29,9	32,4	38,3
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana	41,9	47,0	49,9	69,3
Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	46,8	49,4	50,3	58,5
Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día	85,3	87,9	89,0	93,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)..

## 1.2.289.


Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan consumido alguna vez cada sustancia o no (%). España, 2016.

	Ha consumido la sustancia alguna vez en la vida	
	Sí	No
Fumar cannabis alguna vez	34,4	63,5
Consumir cocaína en polvo alguna vez	59,6	78,5
Consumir cocaína base alguna vez	70,9	83,0
Consumir éxtasis alguna vez	57,7	80,8
Consumir anfetaminas o speed alguna vez	57,4	80,7
Consumir alucinógenos alguna vez	58,6	80,7
Consumir heroína alguna vez	59,3	82,4
Consumir GHB alguna vez	67,5	88,2
Consumir metanfetaminas alguna vez	66,5	86,2
Consumir setas mágicas alguna vez	51,4	83,4
Consumir esteroides anabolizantes alguna vez	50,8	84,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)..

1.2.290.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2016.



	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Tabaco	-	-	-	-	-	-	91,7	90,9	93,6	92,8	90,8	91,4
Alcohol	93,8	89,0	90,5	91,2	92,0	93,8	91,2	90,8	93,3	92,9	91,4	93,0
Hipnosedantes	55,9	65,9	65,9	67,2	67,6	67,3	58,9	55,6	64,0	53,3	49,1	47,5
Cannabis	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4	66,3	65,9
Cocaína polvo	26,7	30,4	37,9	38,0	43,5	46,7	37,4	32,7	37,2	33,8	28,9	32,3
Heroína	48,0	25,6	29,1	28,1	32,0	30,7	26,1	23,2	27,8	24,8	21,4	21,2
Anfetaminas	43,9	40,1	39,7	40,2	45,4	41,7	32,1	28,1	32,5	28,7	24,2	23,4
Éxtasis	46,3	42,6	39,8	43,8	50,0	45,1	31,2	26,6	29,9	26,2	21,8	21,8
Alucinógenos	26,2	40,1	39,2	41,4	45,3	41,9	33,7	28,6	35,8	30,9	26,2	22,8
GHB	-	-	-	-	-	-	25,5	22,4	25,8	22,3	18,7	14,2
Inhalables volátiles	61,4	54,8	54,2	51,6	54,1	51,1	-	-	-	-	-	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.291.

Evolución de la disponibilidad de cocaína polvo y/o base percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Disponibilidad percibida	26,70	30,40	37,90	38,00	43,50	46,70	37,40	32,70	37,20	37,66	32,69	32,78
Precio (euros/gramo)	-	-	-	57,16	58,30	61,85	60,28	60,03	59,98	58,95	57,57	58,15

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.292.

Evolución de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2016.




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Disponibilidad percibida de cannabis	30,8	53,9	60,4	59,7	67,9	71,8	66,8	63,6	71,1	69,4	66,3	65,9
Resina de hachís (euros/gramo)	-	-	-	3,87	4,08	4,39	4,63	4,78	5,2	5,85	5,54	6,19
Grifa/marihuana (euros/gramo)	-	-	-	2,49	2,86	2,86	2,99	3,09	4,1	5,02	4,68	4,96

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.293.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (%). España, 2008-2016.




	Heroína	Anfetaminas	Alucinógenos	Éxtasis	Cocaína	Hipnosedantes	Cannabis	Alcohol
2008	23,2	28,1	28,6	26,6	32,7	55,6	63,6	90,8
2012	24,8	28,7	30,9	26,2	37,7	53,3	69,4	92,9
2016	21,2	23,4	22,8	21,8	32,8	47,5	65,9	93,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.294.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas (%). España, 2016.




	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas
A través de un familiar/amigo/conocido	13,8	1,3	0,5	0,6	1,0
A través de un vendedor (camello)	10,8	1,4	0,8	0,8	1,0
En una zona de ocio (festival, concierto...)	3,1	0,6	0,3	0,4	0,5
A través de una tienda especializada (smart shop, herbolario...)	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2
A través de internet	0,6	0,2	0,3	0,2	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.295.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas entre los estudiantes que han consumido estas drogas alguna vez (%). España, 2016.



	Cannabis	Cocaína	Anfetaminas	Éxtasis	Setas mágicas
A través de un familiar/amigo/conocido	74,4	54,8	41,1	41,5	51,6
A través de un vendedor (camello)	58,2	59,1	59,1	61,6	56,1
En una zona de ocio (festival, concierto...)	16,6	22,8	24,3	25,5	19,6
A través de una tienda especializada (smart shop, herbolario...)	6,7	7,6	15,8	6,2	10,7
A través de internet	2,6	7,9	14,1	10,7	10,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.296.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Tabaco	91,4	91,2	91,6	83,7	89,7	93,6	96,2	91,0	96,1
Bebidas alcohólicas	93,0	92,7	93,2	85,5	91,6	95,3	97,2	92,6	97,2
Hipnosedantes	47,5	46,0	48,9	33,8	40,2	52,0	58,7	46,1	64,3
Cannabis	65,9	68,3	63,4	42,5	60,1	71,9	79,7	64,4	83,4
Cocaína en polvo	32,3	35,1	29,3	19,2	26,9	35,6	42,0	30,7	51,3
Cocaína base	22,9	26,1	19,6	13,7	19,1	25,2	29,9	21,7	38,5
Éxtasis	21,8	25,2	18,1	12,5	18,1	23,2	28,9	20,4	38,9
Anfetaminas o speed	23,4	27,5	19,0	12,4	18,7	25,1	31,6	21,7	44,2
Alucinógenos	22,8	27,0	18,4	13,3	18,8	24,2	30,4	21,4	39,9
Heroína	21,2	23,5	18,8	14,6	19,4	22,2	25,1	20,1	35,4
GHB	14,2	17,0	11,2	9,8	12,3	14,9	17,4	13,4	23,8
Metanfetamina	18,4	22,1	14,5	11,7	16,0	19,5	23,3	17,4	31,4
Setas mágicas	23,3	27,8	18,4	13,7	19,3	24,4	31,4	21,9	40,1
Esteroides anabolizantes	22,3	27,8	16,4	13,46	18,2	24,4	30,0	21,3	35,5

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.297.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) y % de respuesta Ns/Nc entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2016.

	TOTAL*	TOTAL	SEXO		EDAD (% fácil/muy fácil)					
	(% fácil/muy fácil)	(% NS/NC)	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Bebidas alcohólicas	74,6	19,8	71,7	77,5	60,4	70,5	80,1	85,4	73,8	85,0
Tabaco	72,0	21,3	69,2	74,8	57,6	67,5	77,1	83,4	71,0	84,4
Cannabis	40,6	38,3	41,7	39,5	22,7	35,2	46,1	55,0	39,3	58,9
Hipnosedantes	21,2	55,3	20,2	22,2	14,8	17,5	22,9	27,4	20,5	30,8
Cocaína en polvo	15,5	52,0	16,9	14,0	9,0	12,8	16,9	20,6	14,7	26,6
Cocaína base	10,2	55,7	11,7	8,6	6,1	8,5	10,9	13,2	9,6	17,9
Anfetaminas o speed	10,0	57,1	12,1	8,0	5,3	8,0	10,6	13,7	9,3	20,7
Setas mágicas	9,8	57,9	12,0	7,6	5,7	8,1	10,1	13,4	9,2	18,7
Alucinógenos	9,8	57,3	11,8	7,6	5,6	8,0	10,1	13,1	9,1	18,8
Éxtasis	9,4	56,7	11,0	7,8	5,4	7,8	9,8	12,6	8,8	17,9
Heroína	9,2	56,7	10,3	8,0	6,4	8,5	9,3	10,7	8,7	16,2
Esteroides anabolizantes	9,1	59,3	11,6	6,5	5,5	7,4	9,8	12,2	8,6	15,5
Metanfetamina	7,6	58,8	9,3	5,8	4,9	6,6	7,9	9,6	7,2	13,5
GHB	5,7	60,0	6,9	4,4	4,0	5,0	5,8	6,8	5,4	9,9

H = Hombres; M = Mujeres.

\* Datos de percepción de disponibilidad teniendo en cuenta todas las respuestas, incluidos Ns/Nc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.298.


Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según edad y sexo (%). España, 2016.

	¿Te sientes suficientemente informado con respecto al tema de las drogas?			
	Sí, perfectamente	No, estoy mal informado	Sí, lo suficiente	Sólo a medias
Total	31,3	7,5	39,9	21,3
Hombre	37,1	7,3	39,1	16,6
Mujer	25,5	7,6	40,7	26,1
14 años	30,2	9,5	38,2	22,0
15 años	33,3	7,9	39,6	19,2
16 años	30,6	6,9	40,3	22,2
17 años	31,0	5,5	41,0	22,4
18 años	33,2	6,4	41,9	18,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.299.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según edad y sexo (%). España, 2016.



	Perfectamente informado		Mal informado	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
14 años	30,2	36,1	9,5	9,8
15 años	33,3	37,7	7,9	7,8
16 años	30,6	35,6	6,9	6,9
17 años	31,0	38,1	5,5	4,6
14-17 años	31,2	36,8	7,5	7,4
18 años	33,2	41,5	6,4	5,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.300.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal\* y según edad (%). España, 2016.

	Han consumido alguna sustancia ilegal en los últimos 12 meses		No han consumido ninguna sustancia ilegal en los últimos 12 meses	
	Perfectamente informado	Mal informado	Perfectamente informado	Mal informado
Total	38,5	28,6	4,1	8,5
Hombre	44,8	34,0	3,8	8,4
Mujer	31,3	23,5	4,4	8,7
14 años	37,9	29,2	5,7	9,8
15 años	42,4	30,4	4,8	8,8
16 años	39,2	26,9	3,7	8,0
17 años	36,0	27,8	3,0	7,0
14-17 años	38,6	28,6	3,9	8,6
18 años	37,8	28,5	5,1	7,8

\* Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes, ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Si incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.301.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no cannabis y según edad (%). España, 2016.

		No han consumido cannabis en el último año	Han consumido cannabis en el último año (CAST <4)	Han consumido cannabis en el último año (Consumo problemático CAST ≥4)
Perfectamente informado	Total	28,7	37,7	48,9
	Hombre	34,2	44,9	50,6
	Mujer	23,5	30,1	45,7
	14 años	29,2	38,3	47,6
	15 años	30,6	42,2	51,6
	16 años	27,0	38,3	53,4
	17 años	27,9	35,5	43,7
	14-17 años	28,7	38,1	48,8
	18 años	29,4	34,4	49,5
	Mal informado	Total	8,6	4,0
Hombre		8,4	3,7	2,5
Mujer		8,7	4,2	0,8
14 años		9,9	5,2	4,9
15 años		8,7	4,2	1,8
16 años		8,0	3,4	2,1
17 años		7,1	3,1	1,6
14-17 años		8,6	3,6	2,2
18 años		7,7	6,4	0,4

CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.302.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han recibido formación en su centro educativo o en su familia sobre el consumo de drogas y los problemas asociados, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
He recibido información en centro educativo	84,9	83,7	86,0	86,9	88,8	84,5	82,9	85,8	72,5
He recibido información en mi familia	68,4	67,1	69,6	65,2	67,0	69,5	71,3	68,2	70,9

H = Hombres; M = Mujeres .

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.303.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y otras adicciones, según el tipo de información recibida y según edad y sexo. (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes)	71,1	69,8	72,4	69,0	75,2	72,8	70,8	71,9	60,2
Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías (móviles, internet, redes sociales, ciberbullying...)	68,9	66,5	71,4	73,1	71,7	68,9	66,0	70,0	54,8
Efectos y problemas asociados a drogas ilegales (hachis/marihuana, cocaína, drogas de síntesis...)	65,7	65,8	65,6	61,2	70,0	68,3	66,3	66,3	56,4
Efectos y problemas asociados al juego online, apuestas	26,9	29,4	24,4	32,2	29,2	24,9	22,8	27,3	21,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.304.

Prevalencia de consumo de sustancias legales e ilegales alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la formación que han recibido en su centro educativo sobre el consumo de drogas y otras adicciones (%). España, 2016.

	Legales*	Ilegales**
Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes)	80,2	30,9
Efectos y problemas asociados a drogas ilegales (hachis/marihuana, cocaína, drogas de síntesis...)	80,7	31,2
Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías (móviles, internet, redes sociales, ciberbullying...)	79,0	28,7
Efectos y problemas asociados al juego online, apuestas	79,3	29,8

\* Sustancias psicoactivas legales: alcohol, tabaco e hipnosedantes.

\*\* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.305.


Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad y sexo (%). España, 2012-2016.

		2012	2014	2016	
Legalización del cannabis	Total	37,7	40,3	36,4	
	Sexo	Hombre	39,3	40,9	36,7
		Mujer	35,9	39,8	36,1
	Edad	14 años	35,8	40,2	35,7
		15 años	36,3	39,2	35,5
		16 años	36,9	41,4	35,5
		17 años	38,4	39,7	36,8
		14-17 años	37,0	40,1	35,9
		18 años	41,1	42,7	43,1
Legalización de todas las drogas	Total	27,0	29,6	26,8	
	Sexo	Hombre	25,7	27,5	25,3
		Mujer	28,4	31,8	28,4
	Edad	14 años	32,7	36,8	32,7
		15 años	28,9	31,5	28,7
		16 años	26,0	28,8	24,3
		17 años	24,4	24,1	22,1
		14-17 años	27,2	29,8	26,9
		18 años	25,7	27,0	26,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.306.

Evolución de la valoración\* de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016.




\* Algo importante o muy importante.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.307.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




	Nada importante	Algo importante	Muy importante	NS/NC
No han consumido cannabis en el último año	33,6	9,9	19,5	37,0
Han consumido cannabis en el último año (CAST<4)	17,1	19,6	34,9	28,5
Han consumido cannabis en el último año (CAST ≥4)*	10,0	16,2	48,2	25,6

\* CAST= Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático = CAST ≥4.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.308.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal\* en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




	Nada importante	Algo importante	Muy importante	NS/NC
No han consumido alguna droga ilegal en el último año	41,5	5,7	17,4	35,4
Han consumido alguna droga ilegal en el último año	37,7	11,2	17,4	33,7

\* Algunas drogas ilegales: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Sí incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.309.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (%). España, 2006-2016.




	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína en polvo	Hipnosedantes
2006	54,9	33,2	14,7	1,6	0,7
2008	58,8	35,5	14,4	1,6	1,0
2010	58,5	34,6	12,2	1,6	1,5
2012	58,0	30,6	11,9	1,8	1,7
2014	48,8	24,8	9,4	0,9	1,0
2016	43,6	20,4	7,3	1,0	1,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.310.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016.




	Todos/la mayoría de mis amigos consumen cannabis	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen cannabis
No consumen cannabis	31,5	85,7
Sí consumen cannabis	68,5	14,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.311.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016.




	Todos/la mayoría de mis amigos consumen alcohol	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen alcohol
No consumen alcohol	12,7	48,9
Sí consumen alcohol	87,3	51,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.312.

Prevalencia de consumo de cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016.




	Todos/la mayoría de mis amigos consumen cocaína	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen cocaína
No consumen cocaína	74,6	99,3
Sí consumen cocaína	25,4	0,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.313.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016.




	Todos/la mayoría de mis amigos consumen tabaco	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen tabaco
No consumen tabaco	35,1	82,5
Sí consumen tabaco	64,9	17,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.314.

Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales se emborrachan (últimos 30 días) (%). España, 2016.




	Todos/la mayoría de mis amigos se emborrachan	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos se emborrachan
No se emborrachan	43,7	87,1
Sí se emborrachan	56,3	12,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.315.

Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales hacen botellón (últimos 30 días) (%). España, 2016.




	Todos/la mayoría de mis amigos hacen botellón	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos hacen botellón
No hacen botellón	46,6	88,3
Sí hacen botellón	53,4	11,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.316.

Prevalencia de sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen este tipo de sustancias (alguna vez en la vida) (%). España, 2016.



	Todos/la mayoría de mis amigos consumen sustancias estimulantes*	Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen sustancias estimulantes*
No consumen sustancias estimulantes*	45,2	73,1
Sí consumen sustancias estimulantes*	54,8	26,9

\* Sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.317.

Permisividad de los padres frente al consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
<b>MADRE</b>									
Permisiva frente al consumo de tabaco	10,8	10,7	10,9	2,5	7,0	10,6	18,7	9,2	34,3
Permisiva frente al consumo de bebidas alcohólicas	37,3	36,3	38,2	13,2	24,9	42,6	59,9	34,9	69,6
Permisiva frente al consumo de cannabis	1,6	2,0	1,2	0,5	1,3	1,6	2,4	1,4	4,8
<b>PADRE</b>									
Permisivo frente al consumo de tabaco	10,1	10,6	9,5	2,7	6,7	9,7	17,4	8,7	31,7
Permisivo frente al consumo de bebidas alcohólicas	36,5	37,7	35,3	13,7	25,3	41,2	58,8	34,2	68,2
Permisivo frente al consumo de cannabis	1,8	2,2	1,4	0,7	1,5	1,8	2,8	1,6	4,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.318.

Permisividad de los padres frente al consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de tabaco que los estudiantes tengan (%). España, 2016.

	Total alumnos	Tabaco últimos 12 meses		Tabaco diariamente últimos 30 días		Cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No
<b>MADRE</b>							
Permisiva frente al consumo de tabaco	10,8	24,8	3,9	60,2	6,3	24,3	7,6
<b>PADRE</b>							
Permisivo frente al consumo de tabaco	10,1	22,2	4,1	53,1	6,1	21,1	7,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.319.

Permisividad de los padres frente al consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de bebidas alcohólicas que los estudiantes tengan (%). España, 2016.

	Total alumnos	Alcohol últimos 30 d		Borracheras últimos 30 d		Borracheras últimos 12 m		Botellón últimos 12 m		Binge drinking de cannabis*		Bebidas energéticas + alcohol últimos 30 d	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
<b>MADRE</b>													
Permisiva frente al consumo de bebidas alcohólicas													
	37,3	49,7	12,9	63,8	29,4	57,8	21,6	53,4	19,5	60,7	26,2	58,2	33,7
<b>PADRE</b>													
Permisivo frente al consumo de bebidas alcohólicas													
	36,5	48,4	13,3	60,7	29,4	55,5	22,1	51,6	19,8	58,6	26,2	56,6	33,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.320.

Permisividad de los padres frente al consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan (%). España, 2016.

	Total alumnos	Cannabis últimos 12 meses		Cannabis últimos 30 días		Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4)	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No
<b>MADRE</b>							
Permisiva frente al consumo de cannabis							
	1,6	4,8	0,5	6,6	0,6	17,1	3,4
<b>PADRE</b>							
Permisivo frente al consumo de cannabis							
	1,8	5,1	0,7	6,7	0,8	17,1	3,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.321.

Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016.

	Total estudiantes 14-18 años	Consumidores tabaco últimos 30 días	Consumidores diarios de tabaco últimos 30 días	Consumidores de cigarrillos electrónicos	Consumidores bebidas alcohólicas últimos 30 días	Hombres consumidores bebidas alcohólicas últimos 30 días	Mujeres consumidoras bebidas alcohólicas últimos 30 días	Estudiantes que se han emborrachado en los últimos 30 días	Estudiantes que han hecho binge drinking en los últimos 30 días	Estudiantes que han hecho botellón en los últimos 12 meses	Consumidores de bebidas energéticas en los últimos 30 días	Consumidores de bebidas energéticas con alcohol en los últimos 30 días
Permisividad padres												
Padres permiten fumar	12,3	30,4	60,4	26,0	16,2	16,4	15,9	26,0	22,8	17,6	17,5	27,4
Padres permiten beber	36,8	56,3	69,9	50,8	48,3	48,1	48,4	62,7	59,0	51,8	42,2	56,7
Padre permiten consumir cannabis	2,4	5,6	10,4	5,1	3,1	3,8	2,5	5,2	4,3	3,3	3,8	6,1
Relaciones padres												
Bastante malas o muy malas	5,4	8,9	10,6	8,3	6,1	5,1	7,2	7,4	7,0	6,1	6,8	8,7
Regulares	21,6	29,6	31,1	27,4	23,8	20,2	27,3	26,1	25,4	23,4	24,3	26,7
Bastante buenas o muy buenas	72,7	61,1	57,6	63,9	69,8	74,3	65,3	66,0	67,4	70,2	68,5	64,1
Normas en casa y/o fuera de casa												
Siempre o casi siempre	75,5	73,4	71,4	74,2	74,9	74,7	75,1	72,9	73,5	74,3	74,5	72,2
Algunas veces, raramente o nunca	24,5	26,6	28,6	25,8	25,1	25,3	24,9	27,1	26,5	25,7	25,5	27,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.322.

Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016.

	Total estudiantes 14-18 años	Consumidores hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida	Consumidores hipnosedantes con o sin receta últimos 12 meses	Consumidores hipnosedantes con o sin receta últimos 30 días	Consumidores hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida	Consumidores hipnosedantes sin receta últimos 12 meses	Consumidores hipnosedantes sin receta últimos 30 días	Consumidores cannabis últimos 12 meses	Consumidores cannabis últimos 30 días	Consumidores problemáticos cannabis (CAST ≥ 4) últimos 12 meses	Consumidores cocaína polvo y/o base últimos 12 meses	Consumidores cocaína polvo y/o base últimos 30 días
Permisividad padres												
Padres permiten fumar	12,3	20,7	21,6	22,2	23,8	24,4	22,9	29,3	33,0	53,9	45,6	42,7
Padres permiten beber	36,8	46,8	48,7	48,0	51,1	53,8	52,0	59,0	60,0	68,2	64,2	62,5
Padre permiten consumir cannabis	2,4	4,9	5,2	6,8	6,2	6,8	9,1	6,7	8,8	20,0	23,0	25,7
Relaciones padres												
Bastante malas o muy malas	5,4	9,3	10,4	12,1	10,2	11,2	14,5	8,5	9,3	13,4	15,0	17,5
Regulares	21,6	28,3	29,9	32,3	29,5	31,8	30,6	28,5	29,4	36,1	26,7	23,3
Bastante buenas o muy buenas	72,7	62,0	59,3	54,9	59,6	56,3	53,6	62,5	60,8	48,8	55,6	54,5
Normas en casa y/o fuera de casa												
Siempre o casi siempre	75,5	74,4	74,9	74,9	73,2	74,2	74,0	72,1	72,0	67,5	69,1	67,1
Algunas veces, raramente o nunca	24,5	25,6	25,1	25,1	26,8	25,8	26,0	27,9	28,0	32,5	30,9	32,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.323.

Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016.

	Total estudiantes 4-18 años	Consumidores drogas legales alguna vez en la vida	Consumidores drogas legales últimos 12 meses	Consumidores drogas legales últimos 30 días	Consumidores drogas ilegales alguna vez en la vida	Consumidores drogas ilegales últimos 12 meses	Consumidores drogas ilegales últimos 30 días	Consumidores nuevas sustancias alguna vez en la vida	Consumidores nuevas sustancias últimos 12 meses	Consumidores nuevas sustancias últimos 30 días	Consumidores sust. estimulantes para mejorar estudio alguna vez en la vida
Permisividad padres											
Padres permiten fumar	12,3	14,7	15,0	16,2	27,1	29,0	32,9	34,8	38,8	41,3	19,7
Padres permiten beber	36,8	43,8	44,7	47,2	56,0	58,7	60,0	57,0	60,8	60,7	46,9
Padre permiten consumir cannabis	2,4	2,9	3,0	3,2	6,2	6,8	8,8	12,0	14,5	17,2	4,3
Relaciones padres											
Bastante malas o muy malas	5,4	6,0	6,1	6,3	8,5	8,5	9,3	13,2	14,7	15,2	7,9
Regulares	21,6	23,3	23,5	23,9	27,5	28,5	29,2	28,2	29,1	28,8	26,7
Bastante buenas o muy buenas	72,7	70,4	70,2	69,5	63,4	62,6	60,8	57,1	54,3	52,8	65,0
Normas en casa y/o fuera de casa											
Siempre o casi siempre	75,5	75,0	75,1	74,9	72,3	72,2	72,0	72,5	72,7	69,4	75,2
Algunas veces, raramente o nunca	24,5	25,0	24,9	25,1	27,7	27,8	28,0	27,5	27,3	30,6	24,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.324.


Percepción de tolerancia parental para consumir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido alcohol, se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking en los últimos 30 días o botellón en los últimos 12 meses (%). España, 2016.

	Consumo de alcohol últimos 30 días		Borracheras últimos 30 días		Binge drinking últimos 30 días		Botellón últimos 12 meses	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
MADRE								
Sí me lo permitiría (o me lo permite)	49,7	12,9	63,8	29,4	60,7	26,2	53,4	19,5
No me lo permitiría (o no me lo permite)	50,3	87,1	36,2	70,6	39,3	73,8	46,6	80,5
PADRE								
Sí me lo permitiría (o me lo permite)	48,4	13,3	60,7	29,4	58,6	26,2	51,6	19,8
No me lo permitiría (o no me lo permite)	51,6	86,7	39,3	70,6	41,4	73,8	48,4	80,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.325.

Prevalencia de las intoxicaciones étlicas agudas en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




	MADRE		PADRE	
	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	63,8	36,2	60,7	39,3
No se ha emborrachado en los últimos 30 días	29,4	70,6	29,4	70,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.326.

Prevalencia del consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




	MADRE		PADRE	
	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría
Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	60,2	39,8	53,1	46,9
No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días	6,3	93,7	6,1	93,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.327.

Prevalencia del consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



	MADRE		PADRE	
	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría	Sí me lo permitiría	No me lo permitiría
Ha consumido cannabis en los últimos 30 días	6,6	93,4	6,7	93,3
No ha consumido cannabis en los últimos 30 días	0,6	99,4	0,8	99,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.328.

Percepción de tolerancia parental para cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan (%). España, 2016.

	Consumo cannabis últimos 12 meses		Consumo cannabis últimos 30 días		Clasificación CAST consumidores cannabis últimos 12 meses		
	Sí	No	Sí	No	CAST 0-1	CAST 2-3	CAST ≥4
<b>MADRE</b>							
Sí me lo permitiría (o me lo permite)	1,6	4,8	0,5	6,6	0,6	17,1	3,4
No me lo permitiría (o no me lo permite)	98,4	95,2	99,5	93,4	99,4	82,9	96,6
<b>PADRE</b>							
Sí me lo permitiría (o me lo permite)	1,8	5,1	0,7	6,7	0,8	17,1	3,7
No me lo permitiría (o no me lo permite)	98,2	94,9	99,3	93,3	99,2	82,9	96,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.329.


Frecuencia de uso de tablet como herramienta de trabajo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Nº casos	5.014	2.508	2.507	1.396	1.272	1.128	863	4.659	355
Usan tablet como herramienta de trabajo	14,3	14,2	14,4	15,8	17,5	12,1	11,9	14,3	14,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.330.

Frecuencia de uso de internet\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Nº casos	35.369	17.880	17.489	8.946	7.338	9.373	7.300	32.957	2.412
Juego dinero en internet	6,4	10,2	2,5	5,3	6,7	6,1	6,8	6,2	8,6
Juego dinero fuera de internet	13,6	21,6	5,4	8,6	11,6	13,5	17,4	12,6	26,8
Visito páginas sólo para adultos	39,7	65,5	13,8	30,2	38,0	42,9	46,6	39,2	46,8
Participo en juegos de realidad virtual	58,3	82,9	33,4	61,7	59,6	57,8	54,6	58,5	55,3
Juego a juegos de habilidad	66,9	72,7	61,1	70,7	67,4	66,1	64,4	67,3	61,9
Compró ropa, juegos, libros, etc.	69,4	67,6	71,3	65,5	67,3	71,0	73,6	69,3	71,2
Uso las redes sociales	97,9	97,4	98,4	96,9	98,0	98,1	98,6	97,9	98,1
Veo o me descargo música, películas, series, etc.	98,5	97,8	99,1	97,8	98,0	98,9	99,1	98,4	98,8
Uso WhatsApp, email, MSN	99,6	99,4	99,7	99,4	99,5	99,6	99,8	99,5	99,7

\* Aquellos que indiquen cualquier tiempo frente a los que marcan nunca.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.331.

Frecuencia (días) de actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL		POR SEXO Y EDAD					
	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia practicas algún deporte, haces ejercicio?								
Nunca	10,2	6,0	14,5	7,1	9,7	10,1	12,2	17,5
De 1 a 3 días al año	5,0	3,0	7,0	3,3	4,2	4,3	7,4	8,4
De 1 a 3 días al mes	14,1	10,4	17,8	11,0	13,2	14,1	17,2	18,3
De 1 a 4 días por semana	54,5	56,8	52,1	60,9	54,9	55,5	48,8	42,9
De 5 a 7 días por semana	16,3	23,7	8,6	17,7	17,9	16,0	14,4	12,9
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia lees libros como diversión?								
Nunca	35,5	45,5	25,3	31,0	36,7	36,9	35,9	41,6
De 1 a 3 días al año	21,1	22,1	20,2	20,9	20,1	20,7	22,5	23,1
De 1 a 3 días al mes	21,0	18,7	23,5	23,0	20,6	20,2	21,3	17,5
De 1 a 4 días por semana	13,2	9,3	17,2	13,7	13,1	13,5	12,7	12,4
De 5 a 7 días por semana	9,1	4,5	13,8	11,4	9,6	8,7	7,5	5,4
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia sales con amigos por las noches a una discoteca, bar, fiesta, café...?								
Nunca	19,6	20,2	19,0	35,3	21,9	13,8	9,3	8,6
De 1 a 3 días al año	16,2	15,9	16,6	19,7	19,0	15,3	12,2	10,7
De 1 a 3 días al mes	38,6	36,8	40,3	27,9	34,5	44,1	47,0	43,3
De 1 a 4 días por semana	23,6	24,7	22,5	16,0	22,4	24,7	29,5	33,7
De 5 a 7 días por semana	2,0	2,3	1,6	1,2	2,2	2,0	2,0	3,7
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia sales con amigos por las tardes de compras, a dar un paseo, vas a un parque para pasar el rato?								
Nunca	3,3	4,4	2,2	3,9	3,9	2,8	3,0	2,3
De 1 a 3 días al año	6,0	6,7	5,2	6,6	5,8	5,6	5,9	6,1
De 1 a 3 días al mes	29,0	28,7	29,4	30,6	27,4	27,8	30,3	29,3
De 1 a 4 días por semana	49,9	47,7	52,1	48,7	49,1	51,8	49,8	49,7
De 5 a 7 días por semana	11,8	12,5	11,1	10,2	13,9	12,0	11,1	12,6
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia realizas otros hobbies?								
Nunca	41,4	44,8	37,9	39,4	42,5	40,9	42,0	45,3
De 1 a 3 días al año	8,7	8,6	8,9	8,1	8,0	8,9	9,9	9,4
De 1 a 3 días al mes	14,4	13,0	15,9	14,2	14,0	14,8	14,5	14,9
De 1 a 4 días por semana	20,7	19,9	21,6	22,5	20,2	20,9	19,8	17,8
De 5 a 7 días por semana	14,7	13,7	15,7	15,8	15,3	14,5	13,8	12,6
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia juegas dinero fuera de internet en máquinas tragaperras, loterías, quinielas, juegos de casino, bingos, apuestas...?								
Nunca	86,4	78,4	94,6	91,4	88,4	86,5	82,6	73,2
De 1 a 3 días al año	6,5	9,4	3,6	4,9	6,1	6,1	7,6	11,7
De 1 a 3 días al mes	4,6	7,9	1,3	2,2	3,5	4,9	6,5	9,6
De 1 a 4 días por semana	2,0	3,5	0,4	1,1	1,5	1,9	2,7	4,4
De 5 a 7 días por semana	0,5	0,9	0,1	0,2	0,5	0,5	0,6	1,1
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia juegas dinero en internet en máquinas tragaperras, loterías, quinielas, juegos de casino, bingos, apuestas...?								
Nunca	93,6	89,8	97,5	94,7	93,3	93,9	93,2	91,4
De 1 a 3 días al año	2,7	4,4	0,9	2,5	2,8	2,6	2,5	3,6
De 1 a 3 días al mes	1,7	3,1	0,3	1,2	1,9	1,4	2,3	2,2
De 1 a 4 días por semana	0,8	1,3	0,2	0,7	0,5	0,9	0,9	1,2
De 5 a 7 días por semana	1,2	1,3	1,1	1,0	1,5	1,2	1,1	1,5

1.2.331. (continuación)

	TOTAL		POR SEXO Y EDAD					
	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usas WhatsApp, e-mail, MSN?								
Nunca	0,4	0,6	0,3	0,6	0,5	0,4	0,2	0,3
De 1 a 3 días al año	0,8	1,0	0,7	1,2	1,0	0,6	0,6	0,7
De 1 a 3 días al mes	1,1	1,3	0,8	1,6	1,1	0,8	0,9	0,7
De 1 a 4 días por semana	5,7	6,9	4,4	8,8	6,2	4,3	3,8	3,1
De 5 a 7 días por semana	92,0	90,3	93,7	87,8	91,2	93,9	94,4	95,2
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usas las redes sociales?								
Nunca	2,1	2,6	1,6	3,1	2,0	1,9	1,4	1,9
De 1 a 3 días al año	1,1	1,4	0,9	1,5	1,2	0,8	1,1	0,7
De 1 a 3 días al mes	2,4	3,2	1,5	2,8	2,7	2,3	1,7	1,8
De 1 a 4 días por semana	10,6	12,8	8,3	13,9	10,8	9,2	8,9	8,3
De 5 a 7 días por semana	83,8	80,0	87,7	78,6	83,4	85,8	86,9	87,3
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, escuchas o descargas música, ves o descargas vídeos musicales, películas, series, etc.?								
Nunca	1,5	2,2	0,9	2,2	2,0	1,1	0,9	1,2
De 1 a 3 días al año	2,5	3,0	2,0	4,0	2,5	1,6	1,8	2,4
De 1 a 3 días al mes	10,6	11,5	9,6	13,8	11,2	8,8	9,0	8,8
De 1 a 4 días por semana	25,8	26,2	25,3	28,7	26,4	24,4	24,4	22,4
De 5 a 7 días por semana	59,6	57,1	62,1	51,2	57,9	64,1	63,9	65,3
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, participas en juegos de realidad virtual?								
Nunca	41,7	17,1	66,6	38,3	40,4	42,2	45,4	44,7
De 1 a 3 días al año	10,0	7,3	12,7	9,5	10,1	10,2	10,4	9,4
De 1 a 3 días al mes	13,8	17,3	10,2	13,6	13,3	14,1	14,4	12,6
De 1 a 4 días por semana	18,0	29,8	6,0	20,7	18,3	17,4	15,7	16,7
De 5 a 7 días por semana	16,5	28,4	4,4	17,9	18,0	16,0	14,1	16,7
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, juegas a juegos de habilidad?								
Nunca	33,1	27,3	38,9	29,3	32,6	33,9	35,6	38,1
De 1 a 3 días al año	16,3	14,7	18,0	16,6	17,1	15,9	16,9	12,8
De 1 a 3 días al mes	22,2	21,7	22,7	22,7	22,2	22,0	21,7	22,2
De 1 a 4 días por semana	17,5	21,0	14,0	19,6	17,3	17,6	15,4	16,6
De 5 a 7 días por semana	10,9	15,3	6,4	11,8	10,8	10,5	10,5	10,2
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, visitas páginas sólo para adultos?								
Nunca	60,3	34,5	86,2	69,8	62,0	57,1	53,4	53,2
De 1 a 3 días al año	8,7	10,7	6,6	7,8	7,9	9,0	9,4	10,8
De 1 a 3 días al mes	11,5	18,9	4,0	8,0	11,0	12,4	14,6	13,1
De 1 a 4 días por semana	12,4	22,5	2,3	8,9	11,8	14,0	14,7	14,6
De 5 a 7 días por semana	7,1	13,3	0,9	5,5	7,3	7,6	7,9	8,2
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, compras ropa, juegos, libros, etc.?								
Nunca	30,6	32,4	28,7	34,5	32,7	29,0	26,4	28,8
De 1 a 3 días al año	34,1	32,4	35,7	32,3	32,6	34,8	36,8	33,7
De 1 a 3 días al mes	28,1	27,6	28,6	26,8	26,9	28,9	29,6	29,6
De 1 a 4 días por semana	5,0	5,2	4,9	4,3	5,3	5,3	5,2	5,7
De 5 a 7 días por semana	2,2	2,3	2,1	2,1	2,5	2,0	2,0	2,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.332.

Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2016.

	Total alumnos	Alcohol últimos 30 días		Borracheras últimos 12 meses		Binge drinking últimos 30 días		Tabaco últimos 12 meses		Cannabis últimos 12 meses		Consumo problemático cannabis*	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Nº casos	35.369	23.581	11.622	14.473	19.645	11.107	23.980	12.269	23.066	9.144	25.676	1.006	6.562
Juego dinero fuera de internet													
Nunca	86,4	83,1	93,2	80,6	91,0	78,0	90,6	80,3	89,7	76,4	90,2	63,7	77,8
De 1 a 3 días al año	6,5	7,9	3,7	8,8	4,7	9,6	5,0	9,1	5,1	10,2	5,1	12,9	10,0
De 1 a 3 días al mes	4,6	5,9	2,0	7,0	2,7	8,1	2,9	6,7	3,5	8,6	3,0	14,2	8,0
De 1 a 4 días por semana	2,0	2,5	0,9	2,9	1,2	3,5	1,2	3,1	1,3	3,7	1,3	6,2	3,5
De 5 a 7 días por semana	0,5	0,6	0,3	0,7	0,4	0,8	0,3	0,8	0,4	1,1	0,3	3,0	0,8
Juego dinero en internet													
Nunca	93,6	92,6	95,9	92,5	94,7	90,8	95,1	91,8	94,6	90,5	94,9	86,6	91,5
De 1 a 3 días al año	2,7	3,1	1,7	3,0	2,3	3,8	2,1	3,3	2,3	4,0	2,2	5,8	3,5
De 1 a 3 días al mes	1,7	2,1	0,9	2,2	1,3	2,7	1,2	2,3	1,4	2,7	1,3	4,0	2,4
De 1 a 4 días por semana	0,8	0,9	0,5	0,9	0,6	1,2	0,6	1,1	0,6	1,3	0,6	1,9	1,1
De 5 a 7 días por semana	1,2	1,3	1,0	1,4	1,0	1,5	1,1	1,5	1,0	1,6	1,1	1,7	1,4
Uso WhatsApp, Email (Gmail, etc.), MSN													
Nunca	0,4	0,2	0,9	0,2	0,6	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,3
De 1 a 3 días al año	0,8	0,7	1,1	0,4	1,1	0,6	1,0	0,8	0,9	0,7	0,9	1,1	0,5
De 1 a 3 días al mes	1,1	0,6	1,9	0,5	1,5	0,7	1,2	0,7	1,3	0,8	1,2	1,5	0,7
De 1 a 4 días por semana	5,7	3,3	10,3	2,2	8,3	2,4	7,2	2,6	7,3	2,6	6,7	2,8	2,1
De 5 a 7 días por semana	92,0	95,1	85,8	96,7	88,5	96,1	90,1	95,5	90,1	95,5	90,8	94,0	96,5
Uso las redes sociales													
Nunca	2,1	0,9	4,4	0,5	3,3	0,5	2,9	0,7	2,8	0,7	2,6	0,1	0,5
De 1 a 3 días al año	1,1	0,8	1,8	0,5	1,5	0,7	1,3	0,8	1,3	1,0	1,1	1,5	0,8
De 1 a 3 días al mes	2,4	1,7	3,8	1,3	3,2	1,5	2,8	1,7	2,7	1,8	2,6	3,5	1,5
De 1 a 4 días por semana	10,6	7,8	16,3	6,1	14,1	5,9	12,8	6,4	12,8	6,6	12,0	7,4	6,2
De 5 a 7 días por semana	83,8	88,8	73,7	91,6	77,9	91,4	80,3	90,4	80,3	89,9	81,7	87,5	91,0

## 1.2.332. (continuación)

	Total alumnos	Alcohol últimos 30 días		Borracheras últimos 12 meses		Binge drinking últimos 30 días		Tabaco últimos 12 meses		Cannabis últimos 12 meses		Consumo problemático cannabis*	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Veo o me descargo música, películas, series, etc.													
Nunca	1,5	0,9	2,7	0,7	2,2	0,9	1,9	1,0	1,8	1,0	1,7	1,2	0,8
De 1 a 3 días al año	2,5	1,8	4,0	1,5	3,3	1,6	2,9	1,7	3,0	1,5	2,8	1,9	1,2
De 1 a 3 días al mes	10,6	8,9	13,9	7,7	12,8	7,7	11,9	7,6	12,2	7,1	11,8	7,3	6,8
De 1 a 4 días por semana	25,8	24,5	28,5	23,2	27,7	22,6	27,2	22,4	27,6	21,7	27,1	18,7	21,9
De 5 a 7 días por semana	59,6	63,9	50,9	66,9	54,1	67,2	56,0	67,4	55,5	68,6	56,5	70,9	69,4
Participo en juegos de realidad virtual													
Nunca	41,7	42,4	40,2	44,0	40,0	42,5	41,3	44,2	40,3	39,6	42,4	35,3	40,4
De 1 a 3 días al año	10,0	10,5	9,0	11,0	9,2	10,9	9,6	10,8	9,6	10,8	9,7	9,8	10,6
De 1 a 3 días al mes	13,8	14,1	13,0	14,5	13,2	14,6	13,4	14,4	13,4	15,9	13,0	17,3	15,7
De 1 a 4 días por semana	18,0	17,1	19,9	15,9	19,7	16,2	18,9	15,4	19,4	16,8	18,5	18,6	16,6
De 5 a 7 días por semana	16,5	15,9	17,9	14,6	17,9	15,8	16,9	15,2	17,3	17,0	16,4	19,0	16,7
Juego a juegos de habilidad													
Nunca	33,1	34,0	31,1	34,6	31,6	35,4	31,9	36,4	31,3	35,3	32,1	39,4	34,8
De 1 a 3 días al año	16,3	16,4	16,3	16,5	16,2	15,7	16,6	16,0	16,5	15,6	16,7	15,4	15,6
De 1 a 3 días al mes	22,2	21,8	23,0	21,8	22,7	20,8	22,9	21,0	22,8	21,1	22,7	18,4	21,5
De 1 a 4 días por semana	17,5	17,1	18,5	16,8	18,2	17,1	17,7	15,8	18,4	16,5	17,9	14,7	16,4
De 5 a 7 días por semana	10,9	10,7	11,2	10,2	11,3	11,0	10,8	10,8	10,9	11,6	10,6	12,1	11,6
Visito páginas sólo para adultos													
Nunca	60,3	55,3	70,3	52,3	66,5	50,1	65,1	53,1	64,1	45,6	65,7	33,2	46,4
De 1 a 3 días al año	8,7	9,6	6,8	9,4	8,0	9,9	8,1	9,9	8,0	10,0	8,1	9,3	10,0
De 1 a 3 días al mes	11,5	12,7	9,1	13,4	10,1	13,7	10,5	12,7	10,8	14,7	10,3	19,2	14,4
De 1 a 4 días por semana	12,4	14,0	9,3	15,6	10,2	15,7	10,9	14,6	11,3	18,0	10,5	21,7	17,8
De 5 a 7 días por semana	7,1	8,4	4,4	9,4	5,2	10,6	5,4	9,7	5,7	11,7	5,4	16,7	11,4
Compro ropa, juegos, libros, etc.													
Nunca	30,6	26,0	39,8	22,6	36,4	22,5	34,3	25,4	33,3	23,3	32,9	27,5	22,5
De 1 a 3 días al año	34,1	34,5	33,3	35,9	33,0	33,0	34,6	33,9	34,2	35,2	33,7	34,4	35,7
De 1 a 3 días al mes	28,1	31,3	21,7	32,8	24,6	33,7	25,6	31,1	26,5	32,3	26,8	27,2	32,9
De 1 a 4 días por semana	5,0	5,8	3,6	6,1	4,2	7,6	3,9	6,5	4,3	6,4	4,6	6,1	6,4
De 5 a 7 días por semana	2,2	2,5	1,6	2,6	1,8	3,2	1,7	3,1	1,7	2,8	1,9	4,8	2,5

\* Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.333.

Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según las relaciones que mantienen los estudiantes con sus padres y las normas que ellos fijan (%). España, 2016.

	Total alumnos	Relaciones con tus padres		Normas en casa		Normas fuera de casa		Recibir cariño padres	
		M	B	M	B	M	B	M	B
Nº casos	35.369	1.821	24.424	22.825	10.881	16.652	16.957	30.129	3.480
Juego dinero fuera de internet									
Nunca	86,4	88,1	86,4	86,5	87,1	88,3	85,1	86,8	85,5
De 1 a 3 días al año	6,5	5,0	6,5	6,5	6,3	5,9	7,0	6,4	7,0
De 1 a 3 días al mes	4,6	4,8	4,7	4,5	4,4	3,8	5,2	4,5	4,8
De 1 a 4 días por semana	2,0	1,3	2,0	2,0	1,8	1,6	2,1	1,9	1,9
De 5 a 7 días por semana	0,5	0,8	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,8
Juego dinero en internet									
Nunca	93,6	92,5	93,9	94,0	93,4	94,4	93,3	94,1	91,3
De 1 a 3 días al año	2,7	1,9	2,6	2,5	2,7	2,4	2,8	2,5	3,6
De 1 a 3 días al mes	1,7	2,5	1,7	1,5	1,8	1,4	1,8	1,6	2,5
De 1 a 4 días por semana	0,8	1,4	0,7	0,7	0,8	0,6	0,8	0,7	0,9
De 5 a 7 días por semana	1,2	1,7	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,8
Uso WhatsApp, Email (Gmail, etc.), MSN									
Nunca	0,4	0,9	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	1,0
De 1 a 3 días al año	0,8	1,1	0,7	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	1,6
De 1 a 3 días al mes	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3	0,8	1,0	1,7
De 1 a 4 días por semana	5,7	5,9	5,7	5,5	5,7	6,3	4,8	5,5	6,0
De 5 a 7 días por semana	92,0	91,2	92,2	92,4	91,9	91,2	93,2	92,5	89,7
Uso las redes sociales									
Nunca	2,1	1,8	2,2	2,0	2,1	2,3	1,7	2,0	2,4
De 1 a 3 días al año	1,1	1,7	1,0	0,9	1,5	1,1	1,0	0,9	2,0
De 1 a 3 días al mes	2,4	2,7	2,4	2,3	2,3	2,4	2,1	2,2	3,0
De 1 a 4 días por semana	10,6	10,3	11,0	10,7	10,3	11,7	9,5	10,5	11,4
De 5 a 7 días por semana	83,8	83,6	83,5	84,2	84,0	82,5	85,7	84,4	81,2

### 1.2.333. (continuación)

	Total alumnos	Relaciones con tus padres		Normas en casa		Normas fuera de casa		Recibir cariño padres	
		M	B	M	B	M	B	M	B
Veo o me descargo música, películas, series, etc.									
Nunca	1,5	0,8	1,6	1,5	1,5	1,7	1,2	1,5	1,8
De 1 a 3 días al año	2,5	2,3	2,5	2,1	2,8	2,5	2,2	2,2	3,6
De 1 a 3 días al mes	10,6	8,6	11,1	10,4	10,7	11,4	9,7	10,5	10,7
De 1 a 4 días por semana	25,8	20,5	27,2	26,1	24,9	26,7	24,9	26,1	22,4
De 5 a 7 días por semana	59,6	67,8	57,6	59,8	60,1	57,7	62,0	59,7	61,5
Participo en juegos de realidad virtual									
Nunca	41,7	43,0	41,5	41,9	41,3	43,2	40,3	42,1	37,9
De 1 a 3 días al año	10,0	10,1	9,5	9,4	10,9	9,9	10,0	9,8	11,1
De 1 a 3 días al mes	13,8	13,4	13,9	13,7	13,8	13,5	13,9	13,7	13,5
De 1 a 4 días por semana	18,0	14,5	18,8	18,7	16,8	17,6	18,4	18,1	17,4
De 5 a 7 días por semana	16,5	19,0	16,3	16,3	17,3	15,9	17,4	16,2	20,1
Juego a juegos de habilidad									
Nunca	33,1	38,5	31,8	32,7	33,6	33,0	32,9	32,5	36,5
De 1 a 3 días al año	16,3	16,7	16,4	16,0	16,7	16,5	16,0	16,4	15,7
De 1 a 3 días al mes	22,2	17,4	22,5	22,1	22,8	22,3	22,4	22,5	21,2
De 1 a 4 días por semana	17,5	15,4	18,3	18,3	16,0	17,8	17,3	17,9	14,3
De 5 a 7 días por semana	10,9	12,0	11,0	10,9	10,9	10,4	11,3	10,7	12,3
Visito páginas sólo para adultos									
Nunca	60,3	57,9	61,4	61,2	59,3	64,4	56,9	61,2	55,2
De 1 a 3 días al año	8,7	7,0	8,3	8,2	9,2	8,1	9,0	8,4	10,1
De 1 a 3 días al mes	11,5	10,7	11,4	11,3	11,6	10,2	12,5	11,5	11,0
De 1 a 4 días por semana	12,4	14,3	12,4	12,3	12,7	10,8	14,1	12,4	13,2
De 5 a 7 días por semana	7,1	10,0	6,5	6,9	7,2	6,4	7,6	6,6	10,4
Compro ropa, juegos, libros, etc.									
Nunca	30,6	31,7	29,9	30,2	30,2	31,7	28,7	29,4	36,9
De 1 a 3 días al año	34,1	32,8	34,3	33,9	35,2	33,7	34,8	34,6	31,0
De 1 a 3 días al mes	28,1	26,5	28,9	28,6	27,6	27,6	29,1	28,9	23,5
De 1 a 4 días por semana	5,0	5,7	5,0	5,3	4,9	4,9	5,3	5,1	5,0
De 5 a 7 días por semana	2,2	3,3	1,8	2,0	2,2	2,0	2,1	1,9	3,6

M = Malas/muy malas; B = Buenas/muy buenas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.334.

Tiempo dedicado, de media al día, en actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.

	TOTAL		POR SEXO Y EDAD					
	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a practicar algún deporte, hacer ejercicio?								
No lo he hecho	10,3	6,1	14,6	7,1	9,8	10,2	12,3	17,9
Media hora o menos al día	13,5	9,1	18,0	12,6	13,4	13,5	14,1	15,2
Alrededor de 1 hora al día	41,3	38,2	44,6	43,1	41,4	41,3	41,0	35,7
De 2 a 3 horas al día	31,1	41,2	20,6	32,8	31,0	31,7	29,4	27,3
4 horas al día o más	3,9	5,4	2,2	4,4	4,4	3,4	3,2	3,9
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a salir con amigos por las tardes de compras, a dar un paseo, ir a un parque para pasar el rato?								
No lo he hecho	3,3	4,5	2,2	4,0	3,9	2,8	3,1	2,3
Media hora o menos al día	7,6	8,8	6,5	8,6	7,7	7,2	7,1	7,3
Alrededor de 1 hora al día	14,4	16,2	12,5	14,6	13,1	13,9	14,9	17,7
De 2 a 3 horas al día	41,8	40,9	42,8	42,0	40,9	41,9	42,8	41,0
4 horas al día o más	32,8	29,6	36,0	30,8	34,4	34,3	32,1	31,7
En últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a jugar dinero fuera de internet en máquinas tragaperras, loterías, quinielas, juegos de casino, apuestas...?								
No lo he hecho	88,1	80,8	95,3	92,7	89,8	88,2	84,4	75,7
Media hora o menos al día	8,6	13,9	3,3	5,3	7,5	8,5	11,5	15,9
Alrededor de 1 hora al día	2,1	3,3	0,9	1,2	1,5	2,0	2,6	5,6
De 2 a 3 horas al día	0,8	1,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0	1,8
4 horas al día o más	0,5	0,7	0,2	0,3	0,5	0,5	0,4	1,0
En últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a jugar dinero en internet en máquinas tragaperras, loterías, quinielas, juegos de casino, apuestas...?								
No lo he hecho	93,3	89,5	97,1	94,6	92,9	93,3	92,7	91,4
Media hora o menos al día	3,6	6,2	0,9	2,9	3,3	3,5	4,2	4,7
Alrededor de 1 hora al día	1,1	1,9	0,4	0,9	1,4	1,1	1,1	1,6
De 2 a 3 horas al día	0,9	1,2	0,6	0,7	1,0	0,8	0,9	1,3
4 horas al día o más	1,1	1,3	1,0	0,9	1,4	1,3	1,1	1,0
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a usar WhatsApp, e-mail, MSN?								
No lo he hecho	0,4	0,6	0,3	0,6	0,5	0,4	0,2	0,3
Media hora o menos al día	8,0	10,6	5,4	11,8	9,2	6,1	5,5	4,8
Alrededor de 1 hora al día	15,7	20,1	11,2	20,6	16,8	14,3	12,4	9,8
De 2 a 3 horas al día	27,3	27,5	27,0	28,8	26,3	28,0	27,4	21,2
4 horas al día o más	48,6	41,2	56,1	38,2	47,1	51,2	54,4	63,9

### 1.2.334. (continuación)

	TOTAL		POR SEXO Y EDAD					
	H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a usar las redes sociales?								
No lo he hecho	2,1	2,6	1,6	3,1	2,0	1,9	1,4	1,9
Media hora o menos al día	8,5	10,5	6,4	10,6	9,3	7,4	7,0	6,9
Alrededor de 1 hora al día	19,5	23,1	15,9	22,8	19,0	19,2	17,6	16,4
De 2 a 3 horas al día	30,3	30,0	30,6	30,8	30,1	29,8	32,0	25,9
4 horas al día o más	39,6	33,7	45,5	32,7	39,7	41,6	42,1	48,9
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado, a través de internet, a escuchar o descargar música, ver o descargar vídeos musicales, películas, series, etc.?								
No lo he hecho	1,6	2,2	0,9	2,3	2,1	1,1	0,9	1,2
Media hora o menos al día	22,4	24,9	19,9	29,0	22,9	20,3	18,4	17,7
Alrededor de 1 hora al día	30,3	30,9	29,8	30,8	29,6	30,4	31,0	29,1
De 2 a 3 horas al día	25,4	23,5	27,4	21,4	24,4	26,5	28,8	28,7
4 horas al día o más	20,2	18,5	22,0	16,6	21,1	21,6	20,9	23,4
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado, a través de internet, a participar en juegos de realidad virtual?								
No lo he hecho	43,9	17,9	70,8	40,5	42,7	44,6	47,5	46,7
Media hora o menos al día	18,0	19,6	16,4	19,4	17,7	18,0	18,0	13,9
Alrededor de 1 hora al día	16,8	25,6	7,7	17,7	16,8	16,4	16,2	16,6
De 2 a 3 horas al día	12,9	22,1	3,3	13,2	13,6	12,5	11,8	13,7
4 horas al día o más	8,4	14,9	1,8	9,1	9,3	8,5	6,5	9,1
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado, a través de internet, a jugar a juegos de habilidad?								
No lo he hecho	35,5	29,2	41,8	31,7	35,0	36,1	38,0	40,2
Media hora o menos al día	40,7	39,0	42,3	43,6	40,9	40,3	38,8	36,0
Alrededor de 1 hora al día	16,0	19,9	12,0	16,7	15,7	15,3	16,2	15,6
De 2 a 3 horas al día	5,1	7,5	2,7	5,6	5,1	5,2	4,5	4,4
4 horas al día o más	2,8	4,4	1,2	2,3	3,2	3,0	2,5	3,8
En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado, a través de internet, a visitar páginas sólo para adultos?								
No lo he hecho	62,2	36,0	88,1	72,2	63,9	58,9	55,1	55,1
Media hora o menos al día	29,2	49,4	9,4	21,3	27,4	32,3	35,6	33,1
Alrededor de 1 hora al día	5,9	10,2	1,6	4,0	5,5	6,4	7,1	8,3
De 2 a 3 horas al día	1,2	1,9	0,5	1,0	1,5	1,0	1,1	2,3
4 horas al día o más	1,4	2,5	0,4	1,4	1,7	1,5	1,1	1,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.335.

Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2016.

	Total alumnos	Borracheras últimos 12 m		Binge drinking últimos 30 d		Tabaco últimos 12 m		Cannabis últimos 12 m		Consumo problemático de cannabis*	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Nº casos	35.369	14.473	19.645	11.107	23.980	12.269	23.066	9.144	25.676	1.006	6.562
Juego dinero fuera de internet											
No lo he hecho	88,1	82,7	92,2	80,3	91,8	82,3	91,1	78,8	91,4	67,7	79,8
Media hora o menos al día	8,6	12,6	5,6	13,8	6,2	12,3	6,6	14,8	6,4	19,2	14,8
Alrededor de 1 hora al día	2,1	3,0	1,3	3,8	1,2	3,4	1,3	4,0	1,4	7,3	3,6
De 2 a 3 horas al día	0,8	1,1	0,6	1,4	0,6	1,1	0,7	1,4	0,6	3,9	1,1
4 horas al día o más	0,5	0,6	0,3	0,8	0,3	0,9	0,2	0,9	0,3	1,9	0,7
Juego dinero en internet											
No lo he hecho	93,3	92,2	94,3	90,5	94,7	91,3	94,3	90,1	94,5	85,1	91,2
Media hora o menos al día	3,6	4,3	2,9	5,4	2,7	4,5	3,1	5,3	2,9	7,6	4,9
Alrededor de 1 hora al día	1,1	1,3	1,0	1,5	1,0	1,5	0,9	1,8	0,9	2,8	1,5
De 2 a 3 horas al día	0,9	1,0	0,7	1,2	0,7	1,1	0,8	1,1	0,8	1,8	1,0
4 horas al día o más	1,1	1,2	1,0	1,4	1,0	1,6	0,9	1,7	0,9	2,7	1,4
Uso WhatsApp, Email (Gmail, etc.), MSN											
No lo he hecho	0,4	0,2	0,6	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,3
Media hora o menos al día	8,0	2,8	12,0	2,7	10,5	3,3	10,5	3,6	9,5	3,0	3,3
Alrededor de 1 hora al día	15,7	10,3	19,9	8,6	19,0	9,3	19,1	10,0	17,8	12,4	9,3
De 2 a 3 horas al día	27,3	26,1	28,4	24,2	28,7	23,1	29,5	23,9	28,6	18,8	24,7
4 horas al día o más	48,6	60,6	39,1	64,2	41,2	64,0	40,4	62,1	43,7	65,3	62,3
Uso las redes sociales											
No lo he hecho	2,1	0,5	3,3	0,5	2,9	0,7	2,9	0,7	2,6	0,1	0,5
Media hora o menos al día	8,5	4,8	11,3	4,5	10,3	5,0	10,3	5,5	9,5	6,0	5,2
Alrededor de 1 hora al día	19,5	15,8	22,4	14,4	21,9	14,4	22,3	15,2	21,1	17,9	14,4
De 2 a 3 horas al día	30,3	30,0	30,9	28,0	31,5	27,5	31,8	28,2	31,1	25,1	29,2
4 horas al día o más	39,6	48,8	32,1	52,6	33,5	52,3	32,8	50,4	35,6	50,8	50,7

1.2.335. (continuación)

	Total alumnos	Borracheras últimos 12 m		Binge drinking últimos 30 d		Tabaco últimos 12 m		Cannabis últimos 12 m		Consumo problemático de cannabis*	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Veo o me descargo música, películas, series, etc.											
No lo he hecho	1,6	0,7	2,2	0,9	1,9	1,0	1,9	1,0	1,8	1,2	0,8
Media hora o menos al día	22,4	18,1	25,7	16,9	25,0	17,2	25,3	16,7	24,5	16,5	16,1
Alrededor de 1 hora al día	30,3	31,1	30,0	29,7	30,7	28,8	31,1	29,4	30,7	28,5	30,0
De 2 a 3 horas al día	25,4	27,3	24,1	27,3	24,5	27,6	24,3	27,1	24,9	26,2	27,6
4 horas al día o más	20,2	22,8	18,0	25,2	17,9	25,3	17,5	25,8	18,1	27,6	25,5
Participo en juegos de realidad virtual											
No lo he hecho	43,9	46,5	42,0	45,0	43,4	46,7	42,4	41,9	44,6	37,0	42,6
Media hora o menos al día	18,0	19,0	17,3	18,7	17,7	18,7	17,6	19,6	17,4	18,7	19,7
Alrededor de 1 hora al día	16,8	16,8	16,8	17,3	16,5	16,4	17,0	18,3	16,2	24,1	17,9
De 2 a 3 horas al día	12,9	11,0	14,3	11,3	13,6	10,6	14,1	11,6	13,3	12,4	11,5
4 horas al día o más	8,4	6,6	9,7	7,8	8,7	7,6	8,9	8,5	8,4	7,8	8,3
Juego a juegos de habilidad											
No lo he hecho	35,5	36,9	34,0	37,7	34,3	38,8	33,7	37,8	34,5	41,8	37,3
Media hora o menos al día	40,7	41,0	41,0	38,2	41,9	38,3	41,9	38,1	41,8	33,3	39,0
Alrededor de 1 hora al día	16,0	15,4	16,4	15,9	16,0	15,0	16,5	15,7	16,1	15,1	15,7
De 2 a 3 horas al día	5,1	4,3	5,7	4,7	5,2	4,9	5,2	5,1	5,1	5,0	4,8
4 horas al día o más	2,8	2,5	2,9	3,4	2,5	3,0	2,7	3,3	2,6	4,8	3,1
Visito páginas sólo para adultos											
No lo he hecho	62,2	54,3	68,4	52,0	67,0	55,3	65,9	47,4	67,6	34,3	48,3
Media hora o menos al día	29,2	35,2	25,0	35,2	26,6	33,3	27,1	39,1	25,7	43,9	39,3
Alrededor de 1 hora al día	5,9	7,5	4,5	8,9	4,5	7,7	4,9	9,2	4,6	13,3	8,9
De 2 a 3 horas al día	1,2	1,4	1,0	1,7	0,9	1,5	1,0	1,7	1,0	3,1	1,5
4 horas al día o más	1,4	1,6	1,2	2,2	1,0	2,2	1,0	2,5	1,0	5,5	2,1

\* Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.336.

Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según las relaciones que mantienen los estudiantes con sus padres y las normas que ellos fijan (%). España, 2016.

	Total alumnos	Relaciones con tus padres		Normas en casa		Normas fuera de casa		Recibir cariño padres	
		M	B	M	B	M	B	M	B
Nº casos	35.369	1.821	24.424	22.825	10.881	16.652	16.957	30.129	3.480
Juego dinero fuera de internet									
No lo he hecho	88,1	89,7	87,9	88,4	88,2	89,9	86,8	88,5	86,6
Media hora o menos al día	8,6	6,8	8,9	8,5	8,3	7,3	9,6	8,4	8,5
Alrededor de 1 hora al día	2,1	1,6	2,0	2,0	2,0	1,8	2,2	2,0	2,5
De 2 a 3 horas al día	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,7	0,9	0,8	1,1
4 horas al día o más	0,5	1,0	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5	0,3	1,2
Juego dinero en internet									
No lo he hecho	93,3	91,9	93,5	93,7	93,0	94,0	92,9	93,7	91,0
Media hora o menos al día	3,6	3,3	3,6	3,3	3,8	2,9	4,0	3,4	4,2
Alrededor de 1 hora al día	1,1	1,7	1,1	1,1	1,2	1,0	1,2	1,1	1,7
De 2 a 3 horas al día	0,9	1,7	0,8	0,9	0,9	1,0	0,8	0,8	1,4
4 horas al día o más	1,1	1,4	1,0	1,1	1,2	1,1	1,1	1,0	1,7
Uso WhatsApp, Email (Gmail, etc.), MSN									
No lo he hecho	0,4	0,9	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	1,0
Media hora o menos al día	8,0	6,9	8,3	7,5	9,0	8,6	7,3	7,8	8,9
Alrededor de 1 hora al día	15,7	12,9	16,8	15,7	15,8	16,8	14,7	15,9	13,7
De 2 a 3 horas al día	27,3	23,3	28,4	28,0	26,1	28,7	26,1	27,9	23,5
4 horas al día o más	48,6	56,0	46,2	48,4	48,9	45,5	51,5	48,1	52,9
Uso las redes sociales									
No lo he hecho	2,1	1,8	2,2	2,0	2,1	2,3	1,7	2,0	2,4
Media hora o menos al día	8,5	9,5	8,7	8,2	8,8	9,2	7,6	8,2	10,0
Alrededor de 1 hora al día	19,5	14,5	20,8	20,0	18,6	20,7	18,5	19,9	16,6
De 2 a 3 horas al día	30,3	25,5	31,2	30,7	30,1	30,6	30,4	31,0	26,0
4 horas al día o más	39,6	48,7	37,0	39,1	40,5	37,2	41,8	38,9	45,0

1.2.336. (continuación)

	Total alumnos	Relaciones con tus padres		Normas en casa		Normas fuera de casa		Recibir cariño padres	
		M	B	M	B	M	B	M	B
Veo o me descargo música, películas, series, etc.									
No lo he hecho	1,6	0,8	1,6	1,5	1,5	1,8	1,3	1,5	1,8
Media hora o menos al día	22,4	18,2	23,7	22,3	22,5	23,7	21,0	22,5	21,2
Alrededor de 1 hora al día	30,3	26,6	31,6	30,8	29,4	30,6	30,1	30,8	26,7
De 2 a 3 horas al día	25,4	25,5	25,2	25,6	25,7	24,9	26,4	25,9	23,6
4 horas al día o más	20,2	29,0	17,9	19,8	20,9	19,0	21,3	19,4	26,7
Participo en juegos de realidad virtual									
No lo he hecho	43,9	45,1	43,6	44,1	43,4	45,5	42,3	44,4	39,6
Media hora o menos al día	18,0	17,1	18,0	17,9	18,2	18,1	17,9	18,0	18,1
Alrededor de 1 hora al día	16,8	16,2	17,2	17,2	15,9	16,5	17,1	16,7	17,5
De 2 a 3 horas al día	12,9	10,9	13,3	12,7	13,4	12,2	13,6	12,8	13,7
4 horas al día o más	8,4	10,8	7,9	8,1	9,1	7,7	9,1	8,1	11,1
Juego a juegos de habilidad									
No lo he hecho	35,5	41,6	34,2	35,1	36,0	35,5	35,1	34,8	39,1
Media hora o menos al día	40,7	33,2	41,9	41,0	40,4	41,1	40,5	41,4	35,9
Alrededor de 1 hora al día	16,0	15,6	16,2	16,1	15,7	15,7	16,3	16,0	15,6
De 2 a 3 horas al día	5,1	4,3	5,1	5,1	5,0	5,2	5,0	5,1	5,1
4 horas al día o más	2,8	5,3	2,5	2,8	2,8	2,5	3,1	2,6	4,2
Visito páginas sólo para adultos									
No lo he hecho	62,2	59,8	63,3	63,1	61,2	66,3	58,8	63,1	57,0
Media hora o menos al día	29,2	26,4	29,3	29,0	29,7	26,6	31,9	29,2	30,1
Alrededor de 1 hora al día	5,9	8,1	5,4	5,6	6,3	4,8	6,7	5,5	8,3
De 2 a 3 horas al día	1,2	2,4	0,9	1,1	1,3	1,0	1,2	1,1	1,8
4 horas al día o más	1,4	3,4	1,2	1,2	1,5	1,3	1,4	1,2	2,8

M = Malas/muy malas; B = Buenas/muy buenas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.337.

Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.


	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Nunca	8,7	8,8	8,7	15,9	9,5	6,4	4,2	9,1	4,3
Menos de una noche al mes	17,6	16,7	18,6	21,2	18,9	16,4	15,0	17,9	14,1
De 1 a 3 noches al mes	28,7	27,0	30,4	23,2	27,2	31,3	32,9	28,7	28,7
Una noche a la semana	17,2	17,9	16,5	15,6	16,3	17,8	18,9	17,1	17,7
Dos noches a la semana	19,3	20,4	18,2	15,9	18,6	19,9	21,2	18,9	25,2
3-4 noches a la semana	5,2	5,6	4,7	4,8	5,5	5,0	5,2	5,1	5,7
Más de 4 noches a la semana	3,3	3,6	3,0	3,3	3,9	3,1	2,6	3,2	4,3

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.338.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína (polvo y/o base)
Nunca	26,7	9,0	4,6	0,3
Menos de una noche al mes	65,9	21,2	15,3	1,0
De una a tres noches al mes	83,0	35,6	26,5	1,8
Una noche a la semana	84,7	39,6	30,5	2,9
Dos noches a la semana	90,2	50,2	38,7	4,0
De tres a cuatro noches a la semana	89,8	53,7	44,7	6,0
Más de cuatro noches a la semana	89,8	56,8	46,6	8,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.339.

Prevalencia de binge drinking, intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (CAST  $\geq 4$ ), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




	Binge drinking	Borracheras últimos 30 días	Botellón últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis (CAST $\geq 4$ )
Nunca	3,4	1,3	3,5	3,9
Menos de una noche al mes	13,8	7,4	32,8	8,7
De una a tres noches al mes	32,7	23,1	59,4	10,6
Una noche a la semana	39,0	28,1	63,3	11,7
Dos noches a la semana	51,1	36,1	73,4	15,0
De tres a cuatro noches a la semana	53,6	39,9	74,1	21,2
Más de cuatro noches a la semana	51,9	34,8	71,9	22,1

CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.340.

Evolución de la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.




	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Nunca	11,8	10,7	11,8	7,2	8,7	8,7
Menos de una noche al mes	11,7	11,0	12,7	15,1	17,7	17,6
De una a tres noches al mes	23,6	22,1	26,2	28,8	30,1	28,7
Una noche a la semana	18,5	17,3	18,4	17,9	17,0	17,2
Dos noches a la semana	24,5	26,7	22,1	19,9	18,6	19,3
De tres a cuatro noches a la semana	5,9	6,8	4,7	4,8	4,7	5,2
Más de cuatro noches a la semana	3,9	5,3	3,6	3,2	3,3	3,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.341.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias\* alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




\* Nuevas sustancias: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.342.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




\* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.343.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.344.

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.345.


Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.346.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.347.


Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.348.

Prevalencia de consumo de cocaína en polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.349.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST  $\geq 4$ ) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.350.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según edad y sexo. (%). España, 2016.


	TOTAL	SEXO		EDAD					
		H	M	14 años	15 años	16 años	17 años	14-17 años	18 años
Antes de las 12 de la noche	20,2	19,8	20,6	38,5	25,1	13,8	8,6	21,3	5,4
Entre las 12 y la 1 de la madrugada	18,0	19,0	17,1	26,5	23,0	17,0	9,3	18,9	6,5
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	12,5	12,9	12,1	11,7	14,0	14,3	11,3	12,9	7,5
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	12,0	12,3	11,6	9,0	12,2	13,5	13,4	12,1	10,6
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	12,7	11,8	13,6	6,7	10,8	15,4	16,7	12,5	15,7
Entre las 4 de la madrugada y las 8	19,0	17,9	20,1	5,8	10,9	19,9	32,3	17,3	42,1
Después de las 8 de la mañana	5,6	6,4	4,9	1,9	4,0	6,1	8,5	5,1	12,2

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.351.

Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.



	2006	2008	2010	2012	2014	2016
Antes de las 12 de la noche	16,1	14,5	16,5	14,6	17,1	20,2
Entre las 12 y la 1 de la madrugada	15,1	15,7	16,4	14,0	17,1	18,0
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	13,9	13,8	13,8	11,3	12,7	12,5
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	13,8	14,6	13,0	11,4	12,3	12,0
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	15,3	15,3	15,6	14,9	14,0	12,7
Entre las 4 y las 8 de la mañana	20,6	20,3	19,6	25,2	21,0	19,0
Después de las 8 de la mañana	5,2	5,9	5,1	8,6	5,8	5,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.352.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Cocaína polvo y/o base
No ha salido	29,0	9,7	4,9	0,4
Antes de las 12 de la noche	54,8	16,8	9,8	0,7
Entre las 12 y la 1 de la madrugada	73,1	26,1	17,1	1,5
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	83,0	33,5	24,0	1,3
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	88,8	40,1	30,3	2,3
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	92,7	45,0	34,2	2,7
Entre las 4 y las 8 de la mañana	96,0	58,0	49,0	4,2
Después de las 8 de la mañana	95,7	64,4	58,1	12,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.353.

Prevalencia de binge drinking, intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (CAST  $\geq 4$ ) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.


	Total estudiantes 14-18 años	Binge drinking últimos 30 días	Borracheras últimos 30 días	Botellón últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis (CAST $\geq 4$ )
Antes de las 12	20,2	10,9	5,4	23,0	7,2
Entre las 12 y la 1	18,0	20,6	11,6	43,8	11,0
Entre la 1 y las 2	12,5	30,6	19,3	59,2	10,5
Entre las 2 y las 3	12,0	36,2	25,4	66,7	12,4
Entre las 3 y las 4	12,7	45,0	31,5	72,6	11,6
Entre las 4 y las 8	19,0	60,0	46,3	82,5	14,0
Después de las 8	5,6	62,6	48,6	79,4	22,6

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.354.

Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.




	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Antes de las 12 de la noche	40,5	38,5	13,7	1,7
Entre las 12 y la 1 de la madrugada	24,5	43,1	16,9	3,2
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	14,9	43,2	20,9	3,9
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	9,7	40,9	22,8	5,4
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	6,6	39,7	22,2	6,6
Entre las 4 y las 8 de la mañana	3,4	28,7	22,9	13,0
Después de las 8 de la mañana	2,7	25,3	18,4	21,9

\* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables, GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.355.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)\* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.



	Legales	Ilegales
Antes de las 12 de la noche	59,7	10,3
Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada	75,9	17,7
Entre la 1 y las 2 de la madrugada	85,0	24,9
Entre las 2 y las 3 de la madrugada	90,5	31,6
Entre las 3 y las 4 de la madrugada	93,5	34,9
Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana	96,7	49,9
Después de las 8 de la mañana	96,9	59,5

\* Sustancias psicoactivas legales: alcohol, tabaco e hipnosedantes. Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.356.

Situaciones conflictivas experimentadas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.

	No ha salido últimos 12 meses	Antes de las 12	Entre las 12 y la 1	Entre la 1 y las 2	Entre las 2 y las 3	Entre las 3 y las 4	Entre las 4 y las 8	Después de las 8
Conducción bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses	0,3	0,3	1,3	1,8	2,1	3,0	5,2	10,0
Conducción bajo los efectos del cannabis en los últimos 12 meses	0,1	0,3	0,8	1,2	1,3	2,1	4,1	8,7
Conducción bajo los efectos de la cocaína en los últimos 12 meses	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,5	2,2
Viajar como pasajero de conductor bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses	4,5	7,0	11,1	14,5	17,6	21,8	33,1	38,9
Viajar como pasajero de conductor bajo los efectos del cannabis en los últimos 12 meses	1,3	2,1	4,1	7,1	8,5	11,0	20,2	29,1
Viajar como pasajero de conductor bajo los efectos de la cocaína en los últimos 12 meses	0,4	0,5	1,0	0,9	1,2	1,6	3,7	8,2
Sufrir un accidente en los últimos 12 meses siendo conductor	0,5	0,7	1,0	1,6	1,8	2,0	3,0	5,6
Sufrir un accidente en los últimos 12 meses habiendo consumido antes alcohol	0,1	0,1	0,4	0,3	0,5	0,5	0,6	2,2
Sufrir un accidente en los últimos 12 meses habiendo consumido antes cannabis	0,0	0,1	0,3	0,1	0,3	0,3	0,4	1,8
Sufrir una pelea o agresión física en los últimos 12 meses	7,1	9,2	11,5	12,9	14,5	15,2	20,7	30,9
Sufrir una pelea en los últimos 12 meses habiendo consumido antes alcohol	0,4	1,3	2,4	3,1	4,5	6,4	11,3	20,5
Sufrir una pelea en los últimos 12 meses habiendo consumido antes cannabis	0,2	0,5	1,2	1,5	2,3	2,8	4,9	12,2
Tener un conflicto o discusión importante con padres o hermanos en los últimos 12 meses	24,7	30,5	33,1	35,9	37,5	39,7	42,7	46,8
No recordar lo sucedido la noche anterior después de haber salido en los últimos 12 meses	2,6	6,4	11,9	17,2	22,6	26,3	37,2	36,8
Tener dificultad para concentrarse en el colegio al día siguiente después de salir en los últimos 12 meses	3,2	7,7	11,7	14,7	17,0	20,1	24,1	30,5
Haber sido expulsado del centro educativo durante un día completo o más en los últimos 12 meses	2,7	3,2	4,0	4,1	4,6	5,0	7,2	12,9
Tener resaca al día siguiente después de salir en los últimos 12 meses	1,7	8,2	18,4	29,2	35,6	44,3	59,9	55,0
Tener relaciones sexuales de las que se arrepiente al día siguiente en los últimos 12 meses	1,6	2,4	3,2	5,3	6,6	7,1	10,2	16,7
Tener relaciones sexuales sin preservativo en los últimos 12 meses	3,5	4,4	7,5	10,9	14,3	17,7	26,7	34,1
Sufrir bullying a través de internet o por otros medios en los últimos 12 meses	10,8	8,5	6,3	6,0	6,8	6,1	6,1	7,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.357.


Dinero disponible (euros) por término medio a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad. España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.358.

Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función del consumo de sustancias psicoactivas. España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

### 1.2.359.

Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de si han faltado a clase y si han repetido curso. España, 2016.

	Total alumnos		Faltar a clase (hacer pellas)		Reptir curso	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Dinero disponible (euros)	18,03	21,58	17,03	21,37	16,76	

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.360.

Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2016.

	Notas saca habitualmente			Repetido curso alguna vez		Expulsión del centro*		Dificultad de concentración**	
	Sobresaliente/notable	Aprobado/bien	Suspense	Sí	No	Sí	No	Sí	No
TOTAL ALUMNOS	42,7	50,5	6,8	27,8	72,2	4,9	95,1	15,1	84,9
Ha consumido alcohol últimos 30 días	38,3	53,9	7,8	32,4	67,6	6,1	93,9	20,5	79,5
No ha consumido alcohol últimos 30 días	51,5	43,6	4,9	18,3	81,7	2,5	97,5	4,4	95,6
Se ha emborrachado últimos 30 días	35,0	55,6	9,4	37,6	62,4	8,6	91,4	32,6	67,4
No se ha emborrachado últimos 30 días	45,8	48,3	5,8	23,9	76,1	3,6	96,4	10,0	90,0
Ha hecho binge drinking últimos 30 días	32,9	58,1	9,0	39,3	60,7	8,3	91,7	28,5	71,5
No ha hecho binge drinking últimos 30 días	47,4	46,8	5,7	22,2	77,8	3,3	96,7	8,9	91,1
Ha hecho botellón último año	39,5	52,8	7,7	31,8	68,2	6,7	93,3	23,0	77,0
No ha hecho botellón último año	46,5	47,7	5,8	23,0	77,0	2,9	97,1	6,4	93,6
Ha consumido tabaco diariamente últimos 30 días	22,8	62,1	15,1	57,0	43,0	16,4	83,6	35,0	65,0
No ha consumido tabaco diariamente últimos 30 días	45,2	48,9	5,9	24,5	75,5	3,8	96,2	12,8	87,2
Ha consumido cannabis últimos 30 días	27,9	59,7	12,4	44,2	55,8	12,1	87,9	30,8	69,2
No ha consumido cannabis últimos 30 días	46,2	48,2	5,6	23,8	76,2	3,3	96,7	11,7	88,3
Consumo problemático de cannabis (CAST $\geq$ 4)	16,6	63,7	19,7	58,6	41,4	24,3	75,7	49,0	51,0
Consumo de cannabis (CAST <4)	31,9	58,8	9,3	38,9	61,1	8,6	91,4	26,0	74,0
Ha consumido cocaína últimos 30 días	27,2	55,7	17,2	53,8	46,2	31,0	69,0	48,5	51,5
No ha consumido cocaína últimos 30 días	43,2	50,2	6,6	27,1	72,9	4,6	95,4	14,6	85,4

\* En los últimos 12 meses ha sido expulsado del centro educativo durante un día completo o más.

\*\* En los últimos 12 meses ha tenido dificultad para concentrarse en el colegio al día siguiente después de salir.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.361.

Conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias psicoactivas y viajar como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

	Total			14	15	16	17	18	14-17
		H	M	años	años	años	años	años	años
He conducido un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol	2,5	3,9	1,1	0,8	1,8	2,6	4,2	5,4	2,3
He conducido un vehículo de motor bajo los efectos de hachís o marihuana	1,8	2,9	0,8	0,6	1,4	2,0	2,9	3,9	1,7
He conducido un vehículo de motor bajo los efectos de cocaína	0,3	0,6	0,1	0,2	0,3	0,2	0,5	0,9	0,3
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol	17,2	16,4	17,9	8,6	13,4	19,0	24,5	30,8	16,2
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de hachís o marihuana	9,1	9,4	8,8	3,0	6,4	9,2	14,7	22,1	8,1
He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de cocaína	1,8	2,1	1,4	0,9	1,3	1,8	2,5	4,4	1,6

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

## 1.2.362.

Situaciones que en los últimos 12 meses han experimentado los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2016.

	Pelea o agresión*	Rel. sexuales y arrepentido*	Rel. sexuales sin preservativo*	No recordar*	Tener resaca*	Discusión familiar*	Sufrir bullying*
TOTAL ALUMNOS	14,1	5,9	13,4	19,0	29,7	35,7	7,2
En los últimos 12 meses							
Ha consumido alcohol	16,7	7,4	17,0	24,8	39,7	40,3	7,1
No ha consumido alcohol	6,3	1,1	2,6	1,6	0,0	21,8	7,3
En los últimos 30 días							
Ha consumido alcohol	17,6	8,1	18,2	26,7	42,9	40,8	7,1
No ha consumido alcohol	7,2	1,5	4,0	3,7	4,0	25,5	7,3
Se ha emborrachado	26,1	13,3	28,7	47,7	77,5	49,3	6,9
No se ha emborrachado	10,5	3,6	8,8	10,7	15,6	31,8	7,2
Ha hecho binge drinking	24,3	12,1	25,9	39,7	62,8	45,3	7,1
No ha hecho binge drinking	9,4	3,0	7,6	9,4	14,8	31,2	7,2
Ha hecho botellón	25,3	12,8	26,2	41,2	64,3	46,0	6,7
No ha hecho botellón	10,5	3,6	9,3	11,9	19,0	32,4	7,3

## 1.2.362. (continuación)

	Pelea o agresión*	Rel. sexuales y arrepentido*	Rel. sexuales sin preservativo*	No recordar*	Tener resaca*	Discusión familiar*	Sufrir bullying*
En los últimos 30 días							
Ha consumido tabaco diariamente	36,5	18,7	42,2	41,4	68,0	55,4	9,5
No ha consumido tabaco diariamente	11,8	4,5	10,5	16,4	25,5	33,4	6,8
En los últimos 12 meses							
Ha consumido hipnosedantes	24,6	11,3	23,1	28,5	40,4	55,1	15,9
No han consumido hipnosedantes	12,6	5,1	12,1	17,8	28,5	33,2	6,0
En los últimos 30 días							
Ha consumido hipnosedantes	25,8	14,0	24,3	28,0	39,3	56,5	19,3
No han consumido hipnosedantes	13,3	5,3	12,7	18,5	29,3	34,4	6,4
En los últimos 12 meses							
Ha consumido cannabis	27,7	13,7	31,1	39,1	60,8	49,1	7,8
No ha consumido cannabis	9,2	3,1	7,2	11,9	19,1	30,9	6,9
En los últimos 30 días							
Ha consumido cannabis	31,3	16,0	34,4	39,8	61,0	50,1	8,4
No ha consumido cannabis	10,3	3,6	8,8	14,4	23,1	32,6	6,9
Consumo de cannabis							
CAST ≥4	54,5	26,0	51,1	49,4	68,9	63,1	10,5
CAST <4	24,6	12,8	29,8	38,9	62,0	48,1	7,5
En los últimos 12 meses							
Ha consumido cocaína**	52,2	30,0	51,9	45,5	59,5	52,8	14,0
No ha consumido cocaína**	13,1	5,3	12,5	18,3	29,1	35,2	7,0
En los últimos 30 días							
Ha consumido cocaína**	57,6	31,9	49,3	47,0	54,8	55,2	15,7
No ha consumido cocaína**	13,5	5,5	12,9	18,6	29,4	35,4	7,0

\* Las definiciones completas son las siguientes: Sufrir una pelea o agresión física en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses ha tenido relaciones sexuales de las que me he arrepentido al día siguiente. En los últimos 12 meses ha tenido relaciones sexuales sin preservativo. En los últimos 12 meses no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior después de haber salido. En los últimos 12 meses has tenido resaca al día siguiente después de salir. En los últimos 12 meses has tenido un conflicto o discusión importante con padres o hermanos. En los últimos 12 meses has sufrido bullying (acoso) a través de internet o por otros medios.

\*\* Cocaína polvo y/o base.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático = puntuación CAST ≥4.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).




Problemas  
relacionados con  
las drogas

## 2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2016

### 2.1.1.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2016.




	Nº de admisiones
1998	54.338
2002	46.744
2004	52.128
2005	50.630
2006	49.283
2007	50.555
2008	53.155
2009	52.549
2010	53.434
2011	50.281
2012	49.678
2013	51.946
2014	48.926
2015	47.308
2016	45.637

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.2.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2016.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	15.277	13.296	–	2004	3.836	15.617	20.532
1992	20.017	15.956	–	2005	3.604	14.005	18.653
1993	18.977	16.703	–	2006	3.318	14.502	18.803
1994	18.770	17.526	–	2007	3.672	14.331	18.904
1995	17.878	20.369	–	2008	3.840	13.616	17.456
1996	16.647	28.382	–	2009	3.412	12.750	16.989
1997	12.993	30.173	–	2010	4.526	12.166	17.325
1998	11.867	30.756	–	2011	2.951	10.391	13.898
1999	10.473	26.031	–	2012	2.555	9.302	12.238
2000	8.151	26.412	–	2013	2.572	8.940	11.756
2001	7.461	24.844	–	2014*	2.356	8.555	10.911
2002	5.051	21.162	–	2015	2.202	7.713	10.978
2003	4.337	17.867	23.225	2016	2.353	7.907	10.807


\* Datos relacionados con la variable tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.3.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1991-2016.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	681	262	–	2004	14.126	6.747	21.646
1992	932	367	–	2005	15.258	7.562	23.746
1993	1.146	431	–	2006	13.463	8.036	22.242
1994	1.265	491	–	2007	13.429	8.753	23.037
1995	1.415	516	–	2008	12.847	10.786	24.680
1996	1.892	932	–	2009	12.142	9.107	23.132
1997	3.129	1.402	–	2010	12.130	9.095	22.087
1998	4.174	1.838	–	2011	10.637	8.889	20.335
1999	6.126	2.576	–	2012	10.142	8.855	19.497
2000	5.499	2.773	–	2013	10.734	8.726	19.848
2001	5.977	3.046	–	2014*	9.683	8.182	17.864
2002	7.125	3.893	11.904	2015	8.445	7.248	17.327
2003	11.851	5.893	18.359	2016	9.052	7.678	17.889


\* Datos relacionados con la variable tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2016.



	Primeros	Con tratamiento	Total		Primeros	Con tratamiento	Total
	tratamientos	previo			tratamientos	previo	
1996	1.300	230	-	2007	4.619	1.114	5.936
1997	1.768	387	-	2008	5.058	2.055	7.419
1998	2.412	407	-	2009	7.273	1.705	9.503
1999	2.335	418	-	2010	8.639	2.101	11.192
2000	2.487	408	-	2011	9.736	2.603	12.873
2001	2.966	540	-	2012	10.982	3.402	14.869
2002	3.972	665	4.772	2013	12.912	3.585	16.914
2003	4.613	871	5.711	2014*	12.968	3.510	16.478
2004	5.319	928	6.500	2015	11.185	3.448	15.676
2005	4.426	844	5.524	2016	9.278	3.208	13.304
2006	4.125	941	5.304				


\* Datos relacionados con la variable tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2016.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	109	77	–	2007	503	261	795
1997	144	111	–	2008	463	352	845
1998	197	143	–	2009	598	312	963
1999	165	147	–	2010	580	323	944
2000	214	154	–	2011	709	386	1.143
2001	299	170	–	2012	648	421	1.083
2002	350	242	–	2013	787	374	1.175
2003	382	225	–	2014*	871	321	1.192
2004	441	224	693	2015	742	256	1.068
2005	383	209	618	2016	772	282	1.105
2006	466	223	717				


\* Datos relacionados con la variable tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.6.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2016.




Año	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anfetaminas	319	323	347	339	288	255	342	266	330	386	426	415	400	461	501	595	512	671	635	636	699
Éxtasis	226	237	154	135	240	335	452	254	236	229	165	172	155	127	93	102	134	201	133	157	89
Alucinógenos	74	85	62	50	64	83	68	63	44	39	37	43	43	69	66	83	107	120	82	77	82

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.7.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2016.




Año	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Admisiones	8	10	22	20	43	46	54	66	70	49	42	54

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.8.

#### Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2016.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
2005	10.096	8.133	18.950
2006	10.172	8.611	19.454
2007	9.898	8.587	19.224
2008	9.395	9.753	26.318
2009	10.924	11.288	27.958
2010	15.126	11.764	28.111
2011	11.612	10.350	29.014
2012	14.816	12.714	28.234
2013	15.121	12.978	28.652
2014*	15.240	12.418	27.658
2015	13.457	11.254	27.469
2016	13.319	11.323	26.655


\* Datos relacionados con la variable tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.9.

Número\* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento). España, 1996-2016.



	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	31.046	24.224
1997	29.419	21.605
1998	28.527	18.910
1999	24.520	15.562
2000	24.941	13.955
2001	19.988	10.898
2002	17.950	9.583
2003	15.806	7.966
2004	13.605	6.516
2005	12.252	5.620
2006	11.601	4.892
2007	12.487	5.055
2008	12.066	5.050
2009	9.637	3.763
2010	9.697	3.549
2011	8.195	3.010
2012	7.580	2.562
2013	7.026	2.237
2014**	6.360	1.664
2015	5.904	2.413
2016	6.117	2.621


\* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

\*\* En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.10.

Número\* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez). España, 1996-2016.



	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	8.801	7.132
1997	7.154	5.488
1998	6.247	4.526
1999	5.315	3.655
2000	5.055	2.793
2001	3.483	2.181
2002	2.765	1.801
2003	2.722	1.583
2004	2.356	1.303
2005	2.283	1.228
2006	1.879	928
2007	2.073	1.060
2008	2.271	1.124
2009	1.687	866
2010	2.196	979
2011	1.635	702
2012	1.393	523
2013	1.457	530
2014**	1.065	261
2015	1.038	367
2016	1.141	416


\* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

\*\* En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.11.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total tratados). España, 1987-2016.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	24,8	19,7
1988	25,4	19,8
1989	25,7	19,8
1990	26,2	20,0
1991	26,4	20,3
1992	26,6	20,3
1993	27,2	20,3
1994	27,8	20,6
1995	28,5	20,6
1996	29,3	20,6
1997	30,0	20,7
1998	30,7	20,6
1999	31,3	20,8
2000	32,0	20,6
2001	32,0	20,8
2002	33,6	20,9
2003	33,9	20,7
2004	35,4	20,8
2005	35,6	20,6
2006	36,4	20,3
2007	36,8	21,0
2008	37,5	21,1
2009	37,9	20,9
2010	38,4	21,4
2011	39,3	20,8
2012	40,4	20,7
2013	40,8	20,9
2014	40,9	21,1
2015	41,3	21,5
2016	41,6	21,1

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.12.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2016.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	25,7	20,6
1992	26,0	20,6
1993	26,4	20,7
1994	27,3	21,0
1995	27,9	21,2
1996	28,6	21,3
1997	29,2	21,4
1998	29,9	21,2
1999	30,3	21,8
2000	30,9	22,1
2001	31,4	22,3
2002	31,8	22,6
2003	31,9	22,3
2004	33,0	22,8
2005	33,0	22,0
2006	33,0	21,5
2007	34,1	23,3
2008	35,0	22,9
2009	34,5	22,8
2010	35,0	23,5
2011	36,7	22,6
2012	38,1	22,4
2013	38,2	22,3
2014	37,9	23,5
2015	38,0	23,8
2016	38,2	23,5

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.13.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (total tratados). España, 1987-2016.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	25,4	20,9
1988	26,1	21,3
1989	26,2	21,2
1990	26,5	21,4
1991	27,0	21,9
1992	27,6	22,1
1993	27,9	22,0
1994	28,5	22,0
1995	29,1	22,5
1996	29,3	22,3
1997	29,1	22,2
1998	29,1	22,1
1999	28,6	21,7
2000	29,1	21,5
2001	29,8	21,6
2002	29,8	21,9
2003	29,8	21,3
2004	30,0	21,3
2005	30,4	20,9
2006	31,2	20,7
2007	31,6	21,2
2008	32,1	21,0
2009	32,5	20,7
2010	33,3	20,8
2011	33,8	20,6
2012	34,4	20,7
2013	35,0	20,6
2014	35,3	20,6
2015	35,9	20,7
2016	35,9	20,4

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.14.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2016.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	26,6	21,9
1992	27,2	22,3
1993	27,6	22,3
1994	28,2	22,2
1995	28,6	22,6
1996	28,8	22,4
1997	28,6	22,4
1998	28,4	22,2
1999	27,8	21,9
2000	28,2	21,6
2001	29,0	21,8
2002	28,8	21,7
2003	28,8	21,5
2004	29,1	21,4
2005	30,0	21,1
2006	30,4	20,9
2007	30,8	21,5
2008	31,2	21,1
2009	31,6	20,9
2010	32,4	21,2
2011	33,0	21,1
2012	33,4	21,1
2013	33,9	21,0
2014	34,1	20,8
2015	34,8	21,1
2016	34,8	21,1

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.15.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	6.188	7.164	822
1992	9.585	8.232	1.219
1993	10.493	7.129	995
1994	10.873	6.435	978
1995	11.161	5.033	1.028
1996	10.934	4.488	696
1997	8.487	3.011	887
1998	7.884	2.518	910
1999	7.033	1.969	968
2000	5.917	1.414	532
2001	5.461	1.276	471
2002	3.540	894	399
2003	2.805	748	386
2004	2.690	648	358
2005	2.487	544	350
2006	2.320	486	303
2007	2.842	470	327
2008	2.891	455	285
2009	2.719	386	256
2010	3.589	465	258
2011	2.211	365	201
2012	1.870	276	159
2013	2.047	283	175
2014	1.670	154	125
2015	1.831	167	145
2016	1.982	186	146

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.16.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	43,4	50,3	5,8
1992	50,0	42,9	6,4
1993	56,1	38,1	5,3
1994	59,2	35,0	5,3
1995	64,5	29,1	5,9
1996	67,0	27,5	4,3
1997	67,2	23,8	7,0
1998	68,3	21,8	7,9
1999	69,3	19,4	9,5
2000	74,1	17,7	6,7
2001	74,9	17,5	6,5
2002	71,8	18,1	8,1
2003	69,3	18,5	9,5
2004	68,0	16,4	9,0
2005	69,0	15,1	9,7
2006	73,8	15,5	9,6
2007	77,4	12,8	8,9
2008	78,5	12,4	7,7
2009	79,7	11,3	7,5
2010	82,0	10,6	5,9
2011	77,7	12,8	7,1
2012	78,3	11,6	6,7
2013	79,6	11,0	6,8
2014	80,6	7,4	6,0
2015	83,7	7,6	6,6
2016	84,7	7,9	6,2

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.17.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	315	139	109
1992	547	196	121
1993	611	278	108
1994	714	238	97
1995	739	287	74
1996	1.307	413	82
1997	2.172	741	100
1998	3.073	856	128
1999	4.777	1.048	128
2000	4.067	1.172	105
2001	4.413	1.284	91
2002	5.613	1.403	156
2003	9.228	1.242	485
2004	11.140	1.837	693
2005	12.298	1.755	793
2006	11.155	1.617	103
2007	11.393	1.295	130
2008	10.391	1.276	117
2009	10.272	1.139	136
2010	9.952	1.203	166
2011	8.787	1.205	97
2012	8.346	781	95
2013	8.995	1.320	129
2014	6.798	986	56
2015	7.005	1.078	30
2016	7.564	1.107	33

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.18.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (en general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	55,4	24,4	19,2
1992	62,7	22,5	13,9
1993	60,8	27,7	10,7
1994	67,4	22,5	9,2
1995	66,5	25,8	6,7
1996	71,7	22,6	4,5
1997	71,0	24,2	3,3
1998	74,8	20,8	3,3
1999	79,5	17,4	2,1
2000	75,2	21,7	1,9
2001	75,2	21,9	1,6
2002	77,0	19,2	2,1
2003	83,0	11,2	4,4
2004	80,9	13,3	4,8
2005	80,6	11,5	5,2
2006	86,0	12,5	0,8
2007	88,0	10,0	1,0
2008	86,9	10,7	1,0
2009	87,7	9,7	1,2
2010	86,8	10,5	1,4
2011	85,5	11,7	0,9
2012	88,3	8,3	1,0
2013	83,8	12,3	1,2
2014	82,6	12,0	0,7
2015	83,5	12,9	0,4
2016	83,9	12,3	0,4

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.


2.1.19.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2016.



## 2.1.20.

Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2016.




	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Opiáceos	Estimulantes	Alucinógenos
2005	57,4	42,7	8,9	10,9	5,9	0,6
2006	58,7	44,1	9,0	11,8	5,2	0,9
2007	58,0	43,3	8,5	12,3	4,6	0,8
2008	66,1	49,1	10,6	11,8	4,3	1,2
2009	61,5	50,9	9,8	5,9	3,9	0,9
2010	63,4	52,0	9,9	6,6	4,3	1,3
2011	63,7	51,6	9,3	6,5	4,9	1,5
2012	62,1	52,9	10,1	7,1	4,6	1,2
2013	60,8	53,5	9,1	6,7	4,8	1,2
2014*	56,7	48,3	8,1	4,5	2,8	0,4
2015	60,3	51,4	8,2	5,3	4,4	0,5
2016	62,3	51,1	7,3	4,4	4,1	0,3

\* El 76,6% de los admitidos a tratamiento por alcohol sólo han consumido alcohol (30 días previos a la admisión a tratamiento). Los porcentajes de esta tabla están calculados sobre el 23,4% restante (n= 6.428) que ha consumido otras sustancias (30 días previos a la admisión a tratamiento).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.21.

Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2016.




	Hombre	Mujer	Total
1996	35,9	43,4	37,1
1997	32,4	41,0	33,7
1998	32,4	39,7	33,6
1999	31,9	40,2	33,0
2000	32,7	37,9	33,5
2001	32,7	40,2	33,7
2002	30,9	38,9	32,0
2003	31,5	39,3	32,6
2004	27,7	38,3	29,3
2005	31,5	39,5	32,7
2006	32,7	37,4	33,4
2007	30,0	36,2	30,9
2008	26,7	33,3	27,6
2009	26,0	32,2	26,9
2010	29,8	31,7	30,2
2011	28,5	30,0	28,7
2012	28,2	30,0	28,4
2013	24,2	26,1	24,4
2014	26,3	24,4	26,0
2015	33,4	35,4	33,7
2016	33,9	39,0	34,6

Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014, 29,1% en 2015 y 30% en 2016.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.22.

Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2016.



	<25 años	25-34 años	>34 años
1996	20,3	39,3	48,9
1997	17,5	34,0	46,4
1998	15,1	33,4	45,8
1999	15,2	32,0	44,0
2000	13,1	30,5	45,5
2001	14,0	29,1	44,4
2002	12,1	26,7	42,8
2003	9,2	25,5	43,8
2004	7,1	20,9	39,4
2005	9,7	23,1	41,9
2006	7,2	21,4	42,2
2007	3,2	18,7	40,3
2008	3,2	16,9	35,6
2009	2,2	15,2	34,7
2010	8,1	14,8	38,0
2011	9,9	14,5	35,6
2012	8,6	11,7	35,4
2013	4,7	8,9	30,4
2014	5,9	12,0	31,2
2015	11,5	12,1	38,4
2016	3,1	16,0	39,3

Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014, 29,1% en 2015 y 30% en 2016.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.23.


Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2016.

Droga principal por la que es admitido a tratamiento	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	17.889	24,7
Cocaína polvo	17.098	23,7
Cocaína base	785	1,1
Opioides	12.235	16,9
Heroína	10.807	14,9
Metadona (mal uso)	509	0,7
Otros opioides	919	1,3
Cannabis	13.304	18,4
Hipnosedantes	1.105	1,5
Estimulantes	931	1,3
Anfetaminas	699	1,0
Éxtasis y derivados	89	0,1
Otros estimulantes	143	0,2
Alucinógenos	82	0,1
Inhalantes volátiles	28	0,0
Otras drogas ilegales	63	0,1
Alcohol	26.655	36,9
<b>Total drogas ilegales</b>	<b>45.637</b>	<b>63,1</b>
<b>Total drogas ilegales y alcohol</b>	<b>72.292</b>	<b>-</b>

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas

2.1.24.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años\* y nacidos fuera de España) (%). España, 2016.



	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores 18 años*	Nacidos fuera de España
Opioides	16,9	8,4	0,4	17,8
Cocaína	24,7	25,1	1,7	19,1
Cannabis	18,4	25,7	94,3	19,9
Otros estimulantes	1,3	1,5	0,3	1,1
Alcohol	36,9	36,9	2,4	41,0
Número de admisiones	72.292	36.135	2.702	7.122


\* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.25.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años\* y nacidos fuera de España) (%). España, 2016.



	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores de 18 años*	Nacidos fuera de España
Opioides	26,8	13,3	0,5	30,1
Cocaína	39,2	39,7	1,7	32,4
Cannabis	29,2	40,7	96,6	33,7
Otros estimulantes	2,0	2,4	0,3	1,8
Otras sustancias	2,8	3,9	0,9	2,0
Número de admisiones	45.637	22.816	2.637	4.201


\* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.26.

Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016.



	TASAS	NÚMERO DE CASOS
	(España 98,02/100.000 habitantes)	(Total 45.637)
Canarias	3.011	143,25
Andalucía	11.437	136,35
Extremadura	1.438	132,20
Comunidad Valenciana	6.179	124,58
Baleares	1.268	114,52
Melilla	93	108,11
Galicia	2.753	101,27
Ceuta	82	97,02
Cataluña	7.109	94,50
Madrid	5.183	80,15
Murcia	1.147	78,30
La Rioja	241	76,32
Castilla - La Mancha	1.486	72,78
Cantabria	417	71,62
País Vasco	1.391	63,53
Aragón	738	56,40
Castilla y León	1.303	53,24
Navarra	145	22,63
Asturias	216	20,72

Tasas brutas. Población de cada CCAA a 1 de enero de 2015 (Datos INE).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.27.

Características sociodemográficas y del consumo del total de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales y según hayan tenido tratamiento previo y según sexo (%). España, 2016.

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Total	45.637	20.124	22.816	38.127	7.454
Tratamiento previo (%)					
Sí	46,9	100	0,0	48,0	41,1
No	53,1	0,0	100	52,0	58,9
Edad media (años)	35,0	38,2	32,0	35,0	35,2
Sexo (%)					
Hombre	83,6	85,8	82,0	100	0,0
Mujer	16,4	14,2	18,0	0,0	100
Máximo nivel de estudios (%)					
Sin estudios	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Primaria	55,6	57,6	54,6	56,8	49,5
Secundaria	38,8	37,4	39,5	38,2	42,1
Ha finalizado estudios superiores	4,7	4,1	5,0	4,1	7,5
Situación laboral (%)					
Trabajo	31,3	28,6	33,4	32,3	26,4
Parado no habiendo trabajado antes	7,3	6,8	7,7	7,0	8,4
Parado habiendo trabajado antes	41,3	46,8	36,4	41,2	41,5
Otras	20,2	17,8	22,4	19,5	23,7
Fuente de referencia principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	6,9	11,9	2,5	6,7	8,3
Médico general, Atención Primaria de Salud	10,4	7,0	13,5	10,1	11,8
Hospitales u otros servicios de salud	9,8	9,0	10,5	9,0	13,9
Servicios Sociales	3,1	2,1	4,0	2,4	6,3
Prisión, centro de reforma o internamiento para menores	5,7	7,8	4,2	6,2	3,2
Servicios legales o policiales	8,1	6,5	9,7	8,5	5,8
Empresas o empleador	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Familiares y amigos	11,9	7,4	16,1	12,1	10,6
Iniciativa propia	41,0	45,5	36,4	41,9	36,4
Servicios de educación	0,4	0,1	0,7	0,4	0,5
Otra	2,6	2,6	2,4	2,5	3,0
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	13,7	16,3	11,4	14,0	12,3
Únicamente con pareja	10,8	11,2	10,3	10,0	15,0
Únicamente con hijos/as	2,5	2,6	2,5	1,6	7,3
Con la pareja e hijos/as	16,3	15,3	17,1	16,3	16,1
Con padres o familia de origen	43,4	38,2	48,0	44,3	38,6
Con amigos/as	3,2	3,6	2,8	3,2	3,3
Detenido (ej. centro penitenciario, centro inserción social)	5,5	6,5	4,8	6,1	2,4
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,6	3,2	2,1	2,4	3,2
Otros	2,0	3,1	1,0	2,1	1,8

## 2.1.27. (continuación)

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	80,9	76,2	84,8	80,6	82,2
Prisión, centro de reforma o internamiento para menores	6,6	8,2	5,4	7,3	2,9
Otras instituciones	6,7	7,0	6,6	6,4	8,2
Pensiones, hoteles, hostales	0,4	0,6	0,2	0,4	0,4
Alojamiento inestable/precario	5,1	7,6	3,0	5,0	6,0
Otros lugares	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3
Español o extranjero (%)					
Español	90,4	91,6	89,1	90,4	90,0
Extranjero	9,6	8,4	10,9	9,6	10,0
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	26,8	42,6	13,3	27,1	25,5
Heroína	23,7	39,3	10,3	24,2	20,8
Metadona	1,1	1,2	1,1	1,1	1,4
Otros opioides	2,0	2,1	1,9	1,8	3,2
Cocaína	39,2	38,2	39,7	40,0	32,9
CLH Cocaína	37,5	36,6	37,7	38,7	31,1
Cocaína otras	1,7	1,6	2,0	1,7	1,8
Estimulantes sin cocaína	2,0	1,7	2,4	2,0	2,5
Anfetaminas	1,5	1,4	1,7	1,5	1,9
MDMA y derivados	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2
Otros estimulantes	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Hipnosedantes	2,4	1,4	3,4	1,6	6,5
Alucinógenos	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Cannabis	29,2	15,9	40,7	28,6	32,1
Otras sustancias	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	19,6	19,4	19,8	19,2	21,6
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	47,4	43,4	51,1	46,6	51,5
4-6 días/semana	7,8	6,8	8,8	8,1	6,4
2-3 días/semana	13,8	11,8	15,5	14,0	12,5
1 día/semana	5,1	4,6	5,5	5,2	4,7
Menos de 1 día/semana	6,9	7,3	6,5	7,1	6,2
No consumió	18,9	26,1	12,8	19	18,7

## 2.1.27. (continuación)

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	6,3	4,6	7,8	5,2	11,8
Pulmonar o fumada	52,9	51,9	54,3	52,8	53,0
Intranasal o esnifada	35,7	34,9	35,9	36,8	30,2
Inyectada o parenteral	4,3	7,8	1,2	4,4	4,0
Otras	0,8	0,8	0,7	0,7	1,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida	15,6	26,7	5,5	16,0	13,9
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses	6,7	11,6	2,0	6,8	6,2
Prevalencia mínima VIH**	4,1	6,9	1,7	4,0	4,7
Prevalencia mínima Hepatitis C**	8,2	14,8	2,4	8,3	7,5
Prevalencia mínima Hepatitis B (portador crónico)**	3,2	4,0	2,0	3,3	2,8
Prevalencia mínima Hepatitis B (portador crónico)***	0,7	1,2	0,4	0,7	0,6

\* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

\*\* Positivos entre el total (prevalencia mínima).

\*\*\* Dejando desconocidos.

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación\*

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.28.

Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España 2013-2016.

	2013		2014		2015		2016	
	N absoluto	%						
Han consumido sólo alcohol	21.264	74,2	21.264	76,9	21.041	76,6	20.251	76,0
Han consumido alcohol y otras drogas	7.388	25,8	6.394	23,1	6.428	23,4	6.404	24,0
Una droga más	5.134	17,9	4.725	17,1	4.729	17,2	4.733	17,8
Dos drogas más	1.781	6,2	1.379	5,0	1.424	5,2	1.411	5,3
Tres o más drogas	473	1,7	290	1,0	275	1,0	260	0,9

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.29.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2016.

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombre	Mujer
Nº de casos	26.655	11.323	13.319	20.490	6.137
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	46,0	0,0	100	46,3	44,9
Edad media (años)	46,1	47,0	45,5	45,9	46,8
Mujeres (%)	23,0	22,4	23,4	0,0	100
Máximo nivel de estudios completado (%)*					
Sin estudios	0,9	0,8	1,1	0,9	0,9
Enseñanza primaria	49,6	50,5	49,4	52,2	41,2
Enseñanzas secundarias	40,7	40,4	40,5	39,6	44,3
Estudios universitarios	8,7	8,3	9,0	7,3	13,7
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	39,8	35,6	42,8	40,7	36,8
Parado no habiendo trabajado	2,9	3,1	2,8	2,7	3,8
Parado habiendo trabajado	37,1	39,7	34,7	36,9	37,9
Otras	20,1	21,6	19,7	19,7	21,5
Nacidos fuera de España (%)	11,5	9,6	13,5	10,6	14,5
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	4,2	6,5	2,3	4,1	4,7
Médicos generales, atención primaria de salud	23,0	17,4	28,2	23,0	22,6
Hospitales u otros servicios de salud	17,4	17,1	17,7	16,5	20,4
Servicios sociales	4,8	4,4	5,1	4,2	6,8
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	1,4	1,6	1,4	1,7	0,4
Servicios legales o policiales	3,7	3,7	4,0	4,0	3,0
Empresas o empleadores	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
Familiares o amigos/as	11,4	9,5	13,3	11,9	9,8
Iniciativa propia	31,5	37,8	25,0	32,0	30,1
Otras	2,3	1,9	2,6	2,4	2,0
Servicios de educación	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	20,6	22,9	18,8	21,0	19,1
Únicamente con pareja	15,4	14,2	16,2	14,8	17,4
Únicamente con hijos	4,3	4,0	4,7	1,9	13,4
Con pareja e hijos/as	26,6	23,8	29,0	27,0	25,1
Con padres o familia de origen	24,4	24,5	24,1	26,2	18,0
Con amigos	2,7	2,9	2,5	2,6	3,3
Otros	0,5	0,5	0,4	0,4	0,7
Detenido (centro penitenciario, centro inserción social)	2,0	2,3	1,7	2,4	0,8
En instituciones no detenido (albergue)	3,5	4,7	2,5	3,7	2,7

## 2.1.29. (continuación)

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombre	Mujer
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	82,1	79,1	84,0	81,7	83,5
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	2,2	2,3	2,1	2,6	1,0
Otras instituciones	9,5	10,2	9,6	9,3	10,1
Pensiones, hoteles, hostales	0,4	0,6	0,3	0,5	0,3
Alojamientos inestables/precarios	5,5	7,5	3,8	5,7	5,0
Otros lugares	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1
Otras sustancias consumidas en los últimos 30 días (%)					
Opioides	4,4	5,5	2,8	4,4	4,0
Cocaína	62,3	62,1	61,6	64,2	52,7
Estimulantes sin cocaína	4,1	3,6	4,5	4,0	4,7
Hipnosedantes	7,3	7,9	6,3	5,7	15,5
Alucinógenos	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2
Inhalables volátiles	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
Cannabis	51,1	49,9	52,7	51,9	47,2
Otras sustancias	0,4	0,2	0,4	0,4	0,5
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	24,6	24,6	23,9	23,6	28,0
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	58,5	55,4	61,2	59,5	55,5
4-6 días/semana	6,9	6,5	7,2	6,6	7,8
2-3 días/semana	11,2	10,0	12,4	11,0	12,0
1 día/semana	4,2	4,0	4,3	4,0	4,8
Menos de 1 día/semana	5,0	5,7	4,5	4,8	5,8
No consumió	14,1	18,5	10,4	14,1	14,2
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	4,1	5,3	3,0	4,5	2,8
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	0,6	0,8	0,4	0,7	0,3
Se inyectó drogas en los últimos 30 días (%)	0,4	0,5	0,3	0,4	0,2
Prevalencia mínima VIH** (positivo)	1,1	1,3	0,9	1,2	2,4
Prevalencia de mínima Hepatitis C** (positivo)	2,9	3,8	2,0	3,0	2,3
Prevalencia mínima Hepatitis B (portador crónico)**	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5
Prevalencia de VIH entre casos con información (positivo)***	3,3	3,3	3,2	3,5	2,4
Prevalencia de Hepatitis C entre casos con información (positivo)***	8,5	9,4	7,0	9,0	6,8
Situación Hepatitis B (portador crónico)	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9

\* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

\*\* Positivos entre el total (prevalencia mínima).

\*\*\* Eliminando los casos desconocidos.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.30.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2016.

	Alcohol	Cocaína	Cannabis	Opioides	Hipnosedantes	Estimulantes	Alucinógenos	Otras sustancias psicoactivas	Sustancias volátiles
Nº de casos	26.655	17.889	13.304	12.235	1.105	931	82	63	28
Tratamiento previo (%)									
Sí	54,0	45,9	25,7	73,8	26,8	38,1	34,6	23,3	11,1
No	46,0	54,1	74,3	26,2	73,2	61,9	65,4	76,7	88,9
Sexo (%)									
Hombre	67,0	86,3	82,0	84,4	56,1	80,1	86,3	58,7	85,7
Mujer	23,0	13,7	18,0	15,6	43,9	19,9	13,8	41,3	14,3
Edad media (años)	46,1	36,0	26,9	41,9	43,5	33,9	29,3	40,6	26,9
Máximo nivel de estudios (%)									
Sin estudios	0,9	0,7	0,5	1,6	1,8	0,2	0,0	0,0	3,8
Primaria	49,6	51,8	56,0	62,6	49,0	43,5	42,3	41,7	69,2
Secundaria	40,7	42,0	39,6	32,7	37,4	45,8	47,4	41,7	23,1
Ha finalizado estudios superiores	8,7	5,5	3,9	3,1	11,8	10,5	10,3	16,7	3,8
Situación laboral (%)									
Trabajo	39,8	43,3	24,8	20,6	26,3	39,6	32,9	33,9	23,1
Parado no habiendo trabajado antes	2,9	4,6	10,9	7,3	6,8	5,6	15,2	6,8	19,2
Parado habiendo trabajado antes	37,1	40,9	31,1	53,1	41,2	42,4	40,5	28,8	26,9
Otras	20,1	11,2	33,3	19,1	25,7	12,4	11,4	30,5	30,8
Español o extranjero (%)									
Español	88,5	92,1	88,9	89,0	94,6	91,3	92,5	93,1	37,0
Extranjero	11,5	7,9	11,1	11,0	5,4	8,7	7,5	6,9	63,0
Fuente de referencia principal que lo ha referido a tratamiento (%)									
Otros servicios de tto. drogodependencias	4,2	4,9	2,6	14,7	4,4	6,9	11,3	1,7	4,0
Médico general, Atención Primaria de Salud	23,0	11,2	11,7	6,3	23,7	12,7	7,5	23,3	20,0
Hospitales u otros servicios de salud	17,4	9,1	12,3	7,0	20,4	13,7	7,5	13,3	32,0
Servicios Sociales	4,8	2,0	6,0	1,5	2,5	3,2	0,0	1,7	16,0
Prisión, centro reforma o intern. menores	1,4	4,7	5,3	8,2	3,0	3,5	1,3	5,0	8,0
Servicios legales o policiales	3,7	6,9	14,1	3,3	4,5	11,5	11,3	0,0	0,0
Empresas o empleador	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
Familiares y amigos	11,4	13,2	15,7	5,8	8,6	14,8	18,8	16,7	4,0
Iniciativa propia	31,5	46,0	27,8	49,8	30,5	31,4	41,3	33,3	16,0
Servicios de educación	0,1	0,1	1,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
Otra	2,3	1,7	3,2	3,3	2,2	1,7	1,3	5,0	0,0
Número de hijos	1,3	1,0	0,4	1,0	1,3	0,5	0,3	1,0	0,4

## 2.1.30. (continuación)

	Alcohol	Cocaína	Cannabis	Opioides	Hipnosedantes	Estimulantes	Alucinógenos	Otras sustancias psicoactivas	Sustancias volátiles
Nº de casos	26.655	17.889	13.304	12.235	1.105	931	82	63	28
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Solo/a	20,6	12,9	9,4	18,9	17,6	18,4	11,7	21,7	15,4
Únicamente con pareja	15,4	12,4	7,0	12,5	12,4	9,3	10,4	11,7	11,5
Únicamente con hijos/as	4,3	2,7	2,0	2,4	6,3	1,9	3,9	1,7	0,0
Con la pareja e hijos/as	26,3	22,7	10,0	13,9	20,5	9,6	7,8	20,0	3,8
Con padres o familia de origen	24,4	38,2	60,0	33,1	32,1	47,0	58,4	35,0	34,6
Con amigos/as	2,7	2,4	2,8	4,5	2,7	6,5	3,9	1,7	7,7
Detenido (ej. centro penitenciario o inser. social)	2,0	5,6	4,1	7,1	4,9	3,7	1,3	5,0	7,7
En instituciones no detenido (ej. albergue)	3,5	1,5	3,4	3,3	2,0	2,6	1,3	0,0	7,7
Otros	0,5	1,4	1,2	3,9	1,5	0,7	0,0	3,3	11,5
Con pareja y/o hijos y otros familiares	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	1,3	0,0	0,0
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Casas, pisos, apartamentos	82,1	82,9	84,6	73,3	82,0	84,8	86,3	90,2	46,4
Prisiones, centros de internamiento menores	2,2	6,5	4,9	9,0	5,5	3,6	1,3	3,3	10,7
Otras instituciones	9,5	6,2	7,5	6,5	7,0	6,6	5,0	3,3	28,6
Pensiones, hoteles, hostales	0,4	0,3	0,2	0,7	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Alojamientos inestables/precarios	5,5	3,8	2,7	9,8	4,9	4,4	6,3	3,3	10,7
Otros lugares	0,2	0,3	0,1	0,6	0,3	0,2	1,3	0,0	3,6
Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días (%)									
Opioides	4,4	6,2	2,2	10,9	9,6	1,8	2,2	14,3	0,0
Cocaína	62,3	0,6	36,9	44,9	34,1	29,9	53,3	35,7	16,7
Estimulantes	4,1	5,7	10,6	2,1	6,0	7,3	15,6	14,3	8,3
Hipnosedantes	7,3	6,6	5,4	15,1	0,0	5,1	6,7	0,0	0,0
Alucinógenos	0,3	0,9	1,4	0,5	0,8	3,8	0,0	14,3	0,0
Sustancias volátiles	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cannabis	51,1	49,9	0,0	50,8	50,5	54,2	64,4	42,9	58,3
Alcohol	0,0	69,8	74,8	34,0	51,8	53,3	33,3	42,9	50,0
Otras sustancias psicoactivas	0,4	0,4	0,4	0,2	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0
Edad inicio del consumo droga principal (años)	17,8	20,4	15,5	21,9	29,9	20,8	19,2	27,7	24,8

## 2.1.30. (continuación)

	Alcohol	Cocaína	Cannabis	Opioides	Hipnosedantes	Estimulantes	Alucinógenos	Otras sustancias psicoactivas	Sustancias volátiles
Frecuencia de consumo de la droga principal (%)									
Todos los días	58,5	24,4	68,1	57,1	84,2	26,3	27,6	57,9	40,0
4-6 días a la semana	6,9	12,1	5,3	4,5	2,3	12,8	14,5	5,3	12,0
2-3 días a la semana	11,2	23,8	7,9	5,8	3,2	21,1	19,7	12,3	24,0
1 día a la semana	4,2	9,2	2,4	2,0	1,4	8,6	5,3	3,5	0,0
Menos de 1 día a la semana	5,0	11,8	3,7	3,6	1,3	10,0	14,5	5,3	12,0
No consumió	14,1	18,7	12,7	27,1	7,6	21,2	18,4	15,8	12,0
Vía de administración droga principal (%)									
Oral	99,6	2,6	1,4	7,0	97,1	24,7	36,3	56,7	3,6
Pulmonar o fumada	0,2	13,4	97,9	70,4	1,2	6,3	6,3	11,7	39,3
Intranasal o esnifada	0,1	82,5	0,4	6,3	1,3	66,7	56,3	5,0	42,9
Inyectada o parenteral	0,0	0,8	0,1	14,9	0,4	2,1	0,0	3,3	0,0
Otras	0,1	0,7	0,2	1,4	0,1	0,2	1,3	23,3	14,3
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	4,1	5,4	2,8	45,1	8,5	8,7	8,5	11,5	4,8
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	0,6	1,9	0,5	20,8	1,8	4,4	1,7	7,7	4,8
Se inyectó drogas en los últimos 30 días (%)	0,4	1,3	0,3	11,6	0,9	2,9	1,7	3,8	0,0
Prevalencia de VIH entre los casos con información									
Positivo	3,3	4,6	3,4	18,7	6,9	11,5	5,3	15,0	12,5
Prevalencia de Hepatitis C entre los casos con información									
Positivo	8,5	6,9	6,1	41,4	14,5	12,0	6,1	13,6	0,0
Prevalencia de Hepatitis B entre los casos con información									
Portador crónico	3,0	1,5	1,8	5,9	4,1	0,5	4,3	0,0	0,0
Inmune o no inmune	97,0	98,5	98,2	94,1	95,9	99,5	95,7	100,0	100,0
Prevalencia mínima de VIH** (positivo)	1,1	1,9	0,9	11,0	2,5	4,8	2,4	4,8	3,6
Prevalencia mínima Hepatitis C** (positivo)	2,9	2,8	1,6	23,8	5,2	4,6	2,4	4,8	0,0
Prevalencia mínima Hepatitis B** (portador crónico)	0,6	0,3	0,3	1,7	0,9	0,1	1,2	0,0	0,0

\* En 2014, se aplicó el cambio de protocolo para adaptarse a los cambios en el sistema educativo nacional. Los estudios de 3º y 4º de la ESO del sistema educativo actual, en el sistema educativo anterior se correspondían con 2 cursos de BUP, eso hace que, lo que antes se clasificaba como estudios secundarios a partir del 2014 se clasifica como estudios primarios, se debe tener este dato en cuenta a la hora de interpretar la serie histórica.

\*\* Positivos entre el total (prevalencia mínima).

Notas:


- En alcohol, los porcentajes de la variable "Convivencia en los últimos 30 días" se calculan eliminando los casos de Cataluña que, en 2016, mostraron un error de codificación.
- El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables
- Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2016

### 2.2.1.

Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según el tipo de droga. España\*, 1996-2016.



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cocaína	19,9	25,0	31,6	39,4	40,9	40,5	44,7	50,0	55,5	51,1	53,8	55,1	51,1	49,5	45,2	46,0	44,9	43,7	43,4	42,5
Alcohol**	12,4	15,2	22,2	20,0	26,8	29,0	35,4	30,7	32,3	36,0	35,7	37,3	40,2	36,3	40,4	39,0	38,7	38,7	39,7	43,9
Cannabis	6,2	6,6	8,9	9,3	12,8	16,9	19,9	19,3	21,7	23,9	22,9	24,7	29,5	30,5	33,3	33,0	34,6	35,5	42,1	40,1
Hipnosed.	23,6	18,9	24,3	23,8	28,9	29,2	30,1	22,3	17,0	21,0	15,8	15,6	16,5	16,7	18,9	18,3	17,8	18,5	18,0	20,5
Heroína	56,1	50,9	38,7	33,0	35,3	29,2	21,4	17,5	19,0	16,9	16,9	17,2	17,1	17,8	14,2	13,0	11,9	10,3	11,2	8,6
Anfetaminas	2,2	2,9	3,0	9,8	2,2	4,2	3,4	2,3	4,2	4,7	4,2	4,4	4,6	5,5	9,2	8,9	9,0	8,6	8,0	7,5
Otros opioid.	13,5	17,4	16,8	18,9	18,0	17,4	13,1	9,1	8,3	8,5	8,1	7,5	7,6	6,7	6,2	6,1	5,7	7,6	7,4	7,7
MDMA y der.	1,3	2,2	2,2	2,4	4,5	4,4	5,3	3,2	4,7	6,4	5,0	4,2	2,4	2,9	3,9	4,6	4,8	4,5	3,7	3,2
Alucinógenos	2,1	1,8	2,4	1,7	2,7	1,9	1,3	0,8	1,7	1,7	2,0	1,6	2,6	1,7	2,1	2,5	2,6	2,50	1,60	1,50
I. volátiles	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,9	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4	0,30	0,30	0,30

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

\*\* El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

## 2.2.2.

Número total de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje de urgencias en el que aparece cada sustancia. España\*, 1996-2016.

	Nº de episodios	Cocaína	Alcohol**	Cannabis	Hipnóticos y sedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	MDMA y derivados	Alucinógenos	Sustancias volátiles
1996	2.585	19,9	12,4	6,2	23,6	56,1	2,2	13,5	1,3	2,1	0,2
1997	1.932	25,0	15,2	6,6	18,9	50,9	2,9	17,4	2,2	1,8	0,1
1998	2.099	31,6	22,2	8,9	24,3	38,7	3,0	16,8	2,2	2,4	0,3
1999	2.141	39,4	20,0	9,3	23,8	33,0	9,8	18,9	2,4	1,7	0,1
2000	2.328	40,9	26,8	12,8	28,9	35,3	2,2	18,0	4,5	2,7	0,3
2001	2.145	40,5	29,0	16,9	29,2	29,2	4,2	17,4	4,4	1,9	0,9
2002	2.673	44,7	35,4	19,9	30,1	21,4	3,4	13,1	5,3	1,3	0,2
2004	5.828	50,0	30,7	19,3	22,3	17,5	2,3	9,1	3,2	0,8	0,6
2005	7.089	55,5	32,3	21,7	17,0	19,0	4,2	8,3	4,7	1,7	0,5
2006	7.042	51,1	36,0	23,9	21,0	16,9	4,7	8,5	6,4	1,7	0,4
2007	7.822	53,8	35,7	22,9	15,8	16,9	4,2	8,1	5,0	2,0	0,5
2008	6.431	55,1	37,3	24,7	15,6	17,2	4,4	7,5	4,2	1,6	0,5
2009	5.567	51,1	40,2	29,5	16,5	17,1	4,6	7,6	2,4	2,6	0,5
2010	5.626	49,5	36,3	30,5	16,7	17,8	5,5	6,7	2,9	1,7	0,4
2011	5.279	45,2	40,4	33,3	18,9	14,2	9,2	6,2	3,9	2,1	0,3
2012	5.999	46,0	39,0	33,0	18,3	13,0	8,9	6,1	4,6	2,5	0,5
2013	5.715	44,9	38,7	34,6	17,8	11,9	9,0	5,7	4,8	2,5	0,4
2014	6.441	43,7	38,7	35,5	18,5	10,3	8,6	7,6	4,5	2,5	0,3
2015	5.238	43,5	39,8	42,2	18,2	11,2	8,0	7,4	3,7	1,6	0,3
2016	4.565	42,5	43,9	40,1	20,5	8,6	7,5	7,7	3,2	1,5	0,3

\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

\*\* El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

### 2.2.3.

Evolución de las características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España\*, 1996-2016.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Número de episodios	2.585	1.932	2.099	2.141	2.328	2.145	2.673	5.828	7.089	7.042	7.822	6.431	5.567	5.626	5.279	5.999	5.715	6.441	5.238	4.565	
Edad media (años)	27,8	28,1	29,1	29,4	30,3	29,8	29,8	31,0	30,7	31,6	32,0	32,4	33	32,6	32,7	32,8	33,0	33,2	34,1	34,5	
Sexo (%) mujeres	21,4	20,8	23,1	23,5	27,4	27,1	27,4	28,0	25,0	26,1	23,4	22,7	21,6	26,3	24,7	26,1	26,1	24,5	22,6	22,6	
Detenidos (%)	14,4	22,4	11,7	9,4	6,4	5,7	5,2	4,1	4,9	3,7	3,8	4,4	4,9	4,2	3,7	4,1	3,8	4,3	2,7	3,7	
Resolución de la urgencia (%)																					
Alta médica	80,5	82,0	81,2	80,9	78,7	79,1	82,1	81,4	79,1	76,2	79,1	80,0	80,9	79,6	75,4	75,9	72,8	69,8	72,2	71,6	
Alta voluntaria	7,0	6,7	8,8	8,6	8,5	7,5	7,4	5,3	6,7	8,6	7,8	8,5	8,2	7,0	8,5	8,2	9,4	9,9	8,2	8,2	
Ingreso hospitalario	7,6	7,2	6,0	6,5	8,3	7,8	6,3	8,0	8,4	8,8	9,0	7,8	8,1	10,2	12,5	12,5	14,8	15,9	16,0	17,0	
Muerte en urgencias	0,1	0,1	0,0	0,2	0,7	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	
Traslado a otro centro	4,8	4,1	3,9	3,9	3,7	5,4	4,0	5,3	5,7	6,3	4,1	3,7	2,8	3,2	3,6	3,3	2,9	4,2	3,6	3,1	

\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

### 2.2.4.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. Total, según sexo y según droga. España\*, 2016.


	Total	Según sexo		Según droga									
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y der.	Alucinogenos	I. volátiles
Número de episodios	4.565	3.460	1.098	1.874	1.934	1.769	902	378	330	338	140	64	12
Edad media (años)	34,3	34,7	32,8	35,5	35	31,4	36,7	38,4	31,7	40,7	28,5	28,9	33,1
Sexo (%) mujeres	24,1	100,0	0,0	22,3	22,5	22,2	28,6	21,2	26,4	26,6	30,0	20,3	8,3
Detenidos (%)	3,7	4,3	1,7	7,1	3,0	4,1	5,1	6,7	2,4	7,1	2,2	6,3	8,3
Resolución de la urgencia (%)													
Alta médica	71,6	71,3	72,8	72,0	73,6	70,1	65,3	65,6	67,4	67,4	75,6	80,7	71,4
Alta voluntaria	8,2	8,3	8,1	9,2	9,2	5,7	8,5	8,6	10,6	9,6	15,4	7,0	28,6
Ingreso hospitalario	17,0	17,5	15,6	15,5	14,6	20,9	21,3	23,9	18,1	19,3	7,3	12,3	0,0
Muerte en urgencias	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro	3,1	2,9	3,5	3,3	2,6	3,4	4,9	1,6	3,9	3,7	1,6	0,0	0,0

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

### 2.2.5.

Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias. España\*, 2016.



	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	MDMA y der.	Alucinógenos
Oral	3,3	5,1	99,5	2,2	65,9	91,3	98,1	82,8
Pulmonar o fumada	17,9	94,8	0,3	50,0	4,8	1,7	0,0	3,4
Intranasal o esnifada	73,5	0,1	0,0	6,7	27,8	0,4	1,9	13,8
Inyectada o parenteral	8,6	0,0	0,1	41,1	1,6	6,1	0,0	0,0
Otra vía	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0

\*\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

### 2.2.6.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas ilegales, según sexo. España, 2016.

	Total	Hombres	Mujeres
Cocaína	42,7	43,6	39,7
Alcohol	44,0	44,9	41,2
Cannabis	40,2	41,1	37,2
Hipnosedantes	20,5	19,3	24,5
Heroína	8,6	9,0	7,6
Anfetaminas	7,5	7,3	8,3
Otros opiáceos	7,7	7,5	8,6
MDMA y derivados	3,2	2,9	4,0
Otras sustancias	2,7	1,9	5,3
Alucinógenos	1,5	1,5	1,2
I. volátiles	0,3	0,3	0,1

\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.


\*\* El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

## 2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2016. Mortalidad relacionada con drogas

### 2.3.1.

Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2016.



Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad, CCAA que notifican. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad, 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

## 2.3.2.

## Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2016.

	Estimación nacional	Reg. Específico Mortalidad (CCAA)	Reg. Específico Mortalidad (6 ciudades)
1983	266	-	82
1984	440	-	139
1985	453	-	143
1986	516	-	163
1987	741	-	234
1988	1.067	-	337
1989	1.440	-	455
1990	1.440	-	455
1991	1.833	-	579
1992	1.760	-	558
1993	1.399	-	444
1994	1.067	-	388
1995	1.051	-	395
1996	1.310	-	421
1997	1.127	-	339
1998	1.049	-	306
1999	972	-	291
2000	1.012	444	284
2001	923	496	268
2002	1.079	496	229
2003	900	493	270
2004	796	468	212
2005	1.004	455	242
2006	820	428	218
2007	703	475	188
2008	773	424	139
2009	739	438	181
2010	706	517	182
2011	736	408	181
2012	707	519	195
2013	727	489	196
2014	767	556	172
2015	936	600	171
2016	866	613	194

Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad, CCAA que notifican. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad, 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

### 2.3.3.

#### Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España\*, 2003-2016.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Número de fallecidos	493	468	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600	613
Casos analizados	490	466	455	428	475	424	427	517	408	478	437	520	518	501
Sexo (%)														
Varones	85,3	83,9	86,3	84,3	87,4	85,6	84,5	83,9	82,1	85,7	80,7	80,9	80,6	83,4
Mujeres	14,7	16,1	13,7	15,7	12,6	14,4	15,5	16,1	17,9	14,3	19,3	19,1	19,4	16,6
Edad media (años)	35,3	37,0	36,1	37,2	38,2	38,1	38,3	39,8	40,2	42,0	42,7	44,3	43,6	44,1
Grupo de edad (años)														
15-19	0,8	1,3	1,4	0,9	0,6	1,9	0,7	0,4	1,2	0,4	0,2	0,7	0,8	0,5
20-24	6,7	4,1	6,2	4,2	4,3	6,1	6,4	2,5	5,0	2,9	1,4	1,5	2,7	1,8
25-29	14,6	11,9	11,2	12,9	9,7	10,6	8,0	7,9	6,0	6,7	7,6	4,7	4,7	5,4
30-34	22,6	20,5	20,0	18,0	17,6	16,3	17,4	12,4	12,2	11,6	13,1	10,4	9,3	8,3
35-39	28,2	27,9	28,9	23,8	24,1	22,2	18,9	25,5	19,9	15,8	15,7	13,8	18,3	14,0
40-44	16,9	19,2	20,7	21,3	22,2	19,8	24,9	24,8	21,4	22,4	19,6	17,7	16,5	19,4
≥45	10,2	15,1	11,6	18,9	21,5	23,1	23,7	26,5	34,0	40,3	42,3	51,2	47,7	50,6
Estado civil (%)														
Soltero	69,4	68,9	68,7	72,0	62,8	61,4	67,3	61,0	63,6	65,4	61,3	59,3	64,8	64,2
Casado	19,0	15,6	16,4	12,2	19,1	16,8	15,4	21,6	18,2	20,7	18,9	14,5	17,8	17,8
Separado/Divorciado	10,5	14,4	13,7	13,6	17,4	18,9	15,0	15,9	16,2	12,8	18,9	23,1	16,5	15,6
Viudo	1,0	1,1	1,1	2,2	0,7	2,9	2,3	1,5	2,0	1,1	1,0	3,1	0,9	2,5
Procedencia del cadáver (%)														
Domicilio	54,5	55,2	58,1	52,3	60,6	60,0	61,9	64,3	68,6	69,6	71,7	74,4	72,6	68,5
Hotel-Pensión	5,3	5,1	6,2	5,8	4,6	3,9	5,9	4,3	2,8	2,0	2,1	2,4	3,3	3,8
Calle	18,5	17,4	13,5	20,1	13,1	15,8	11,8	14,0	11,1	12,3	9,1	10,1	8,2	8,2
Local público	1,8	1,3	2,5	4,8	2,4	1,7	2,8	2,6	2,6	1,2	2,5	0,9	2,1	2,1
Hospital	10,6	9,5	6,4	7,7	5,7	6,8	6,1	3,9	5,1	5,6	5,6	5,5	5,9	8,4
Cárcel	1,1	3,5	4,8	3,9	3,7	4,9	4,0	3,7	4,9	4,0	3,1	1,5	3,1	3,3
Otra	8,2	8,1	8,5	5,3	9,8	7,0	7,3	7,1	4,9	5,4	6,0	5,1	4,7	5,6
Evidencias de consumo reciente (%)														
Sí	85,6	92,6	94,4	92,4	85,3	89,0	90,4	77,4	89,9	76,6	85,8	81,8	84,9	82,0
No	14,4	7,4	5,6	7,6	14,7	11,0	9,6	22,6	10,1	23,4	14,2	18,2	15,1	18,0
Evidencia de suicidio (%)														
Sí	12,1	8,8	5,7	10,8	8,8	9,0	8,5	9,7	12,4	8,1	11,1	20,3	26,4	20,6
No	87,9	91,2	94,3	89,2	91,2	91,0	91,5	90,3	87,6	91,9	88,9	79,7	73,6	79,4
Signos recientes venopunción (%)														
Sí	53,3	43,0	51,7	40,6	35,2	35,4	39,2	29,6	16,3	14,9	16,2	12,5	13,5	13,0
No	46,7	57,0	48,3	59,4	64,8	64,6	60,8	70,4	83,7	85,1	83,8	87,5	86,5	87,0
Muerte causada por patología previa agravada por el consumo de sustancias psicoactivas (%)														
Sí	35,4	32,6	35,5	28,6	20,4	26,6	30,9	31,4	37,2	37,4	36,0	35,4	27,0	31,5
No	64,6	67,4	64,5	71,4	79,6	73,4	69,1	68,6	62,8	62,6	64,0	64,6	73,0	68,5
Anticuerpos anti-VIH (%)														
Positivo	42,7	40,6	42,8	36,9	37,4	40,7	41,1	34,4	39,2	37,8	31,5	27,2	26,2	21,4
Negativo	57,3	59,4	57,2	63,1	62,6	59,3	58,9	65,6	60,8	62,2	68,5	72,8	73,8	78,6


\* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

En 2011, 45 casos de Galicia sin información.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.4.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España\*, 1983-2016.



	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Opioides	98,0	98,8	93,9	100,0	92,4	96,6	94,8	96,0	93,1	94,9	92,8	92,9	93,4	90,4	89,8	90,1	88,0
Cocaína	2,0	12,5	11,0	11,5	19,3	18,4	29,6	24,8	21,6	26,0	30,9	28,8	24,7	32,7	41,4	51,2	63,3
Hipnosedantes	13,7	22,5	41,5	46,0	33,8	40,2	43,8	47,4	37,2	37,9	37,4	48,4	54,8	47,7	58,6	47,4	48,8
Anfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,9	3,8	3,2	4,3	4,9	4,0	8,6	2,8	4,5
Cannabis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	12,2	11,3	14,3
MDMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,5	0,0	1,8
Alcohol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,7	28,6	26,2	30,5
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Opioides	89,4	86,8	83,8	76,7	74,9	78,2	78,7	72,8	77,7	79,8	79,1	77,9	76,6	77,3	64,0	64,7	63,9
Cocaína	54,4	51,7	54,2	62,2	60,1	69,2	60,0	67,0	60,2	59,1	57,3	52,2	58,6	54,1	51,7	48,8	53,7
Hipnosedantes	58,5	55,2	54,0	48,0	48,7	54,1	50,7	46,9	45,1	42,2	58,4	65,0	63,2	62,8	65,8	68,0	67,3
Anfetaminas	6,9	3,4	2,9	3,1	2,6	2,6	3,6	3,6	2,2	3,5	1,5	4,7	3,8	6,2	7,9	4,4	6,2
Cannabis	15,2	18,7	20,0	16,7	16,7	20,9	16,8	14,6	15,6	22,8	23,8	24,5	22,4	21,6	16,5	23,4	23,4
MDMA	1,6	1,5	2,5	1,6	1,9	0,4	1,7	1,1	1,4	1,1	0,8	1,7	1,7	1,1	3,5	2,3	2,8
Alcohol	35,5	35,3	42,5	39	35,8	33,0	34,3	27,8	25,9	28,8	28,8	33,3	28,9	31,2	40,8	39,8	42,9

\* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

\*\* El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.5.

Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España\*, 2004-2016.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Opioides	349	356	338	340	324	346	409	318	366	337	333	335	320
Cocaína	280	315	250	313	251	247	297	213	280	236	269	253	269
Hipnosedantes	227	246	217	223	191	180	302	265	302	273	342	352	337
Anfetaminas	12	12	15	17	9	13	8	19	18	27	41	23	31
Cannabis	78	95	70	68	65	88	123	100	107	94	86	121	117
MDMA	2	7	5	6	5	4	7	8	5	18	9	12	14
Alcohol	167	150	143	130	108	120	149	136	138	136	212	206	215
Nº de defunciones con información toxicológica	466	455	428	475	424	427	517	408	478	437	520	518	501
Número total de fallecidos	468	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600	613


\* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

En 2011, 45 casos de Galicia sin información.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.6.

Número de fallecidos en los que se detecta la metadona (independientemente de otras sustancias), metadona y no otro opioide y no otro opioide y metadona sola. España\*, 2005-2016.




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Metadona	162	167	177	146	161	243	203	250	209	192	168	182
Metadona y no otro opioide	69	91	108	105	90	141	145	175	131	118	85	96
Sólo metadona	3	8	18	13	12	13	8	5	9	10	3	5

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.7.

Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España\*, 1985-2016.



	1985	1987	1989	1991	1992	1993	1994	1996	1997	1999	2000	2002	
Cocaína y no opioides**	2,1	1,7	1,8	1	0,6	3,3	2,8	3,9	5,5	8,8	6,1	11,3	
Sólo cocaína***	0,7	0,9	1,3	0	0,4	1,2	0,6	2,3	2,4	4,1	2,9	2,6	
Cocaína y alcohol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cocaína y no opioides**	16,4	20,4	18,5	25,1	18,9	16,4	18,0	17,2	19,0	19,7	17,7	18,0	20,0
Sólo cocaína***	7,5	5,9	4,7	7,8	6,4	5,4	5,8	3,4	6,7	7,6	4,6	4,4	3,2
Cocaína y alcohol	-	4,1	3,5	2,9	4	4,7	2,1	4,6	3,8	3,2	3,5	5,4	3,3

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.


\*\* Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, incluye sólo cocaína).

\*\*\* Sólo cocaína (sin ninguna otra sustancia).

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Especifico de Mortalidad.

### 2.3.8.

Distribución de los fallecidos en los que se detecta cocaína en función de otras sustancias detectadas. España, 2016.




\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Especifico de Mortalidad.

### 2.3.9.

Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detectan opioides (opioides y no cocaína, sólo opioides, opioides y cocaína). España\*, 1984-2016.




	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Opioides y no cocaína**	49,6	49,7	49,2	47,0	42,4	35,2	46,6	31,3	35,4	44,0	55,8	59,8	55,1	45,4	41,7	31,5	40,3
Sólo opioides***	28,1	25,2	20,2	23,9	20,8	14,1	20,6	11,5	14,2	18,1	13,1	9,0	17,7	12,6	10,8	7,6	9,2
Opioides y cocaína***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Opioides y no cocaína**	41,7	40,5	30,8	29,7	29,7	36,8	30,7	34,3	37,8	39,8	42,9	37,9	42,8	30,0	33,8	32,1	
Sólo opioides***	8,7	7,1	5,9	6,4	4,0	4,7	7,8	7,3	8,2	6,4	4,2	2,7	4,6	3,1	1,7	2,0	
Opioides y cocaína***	-	-	-	-	48,8	40,0	40,8	40,3	41,5	39,5	35,0	39,5	34,3	34,0	30,9	32,3	

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.  
 \*\* Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye sólo opioides).  
 \*\*\* Sólo opioides (ninguna otra sustancia).  
 \*\*\*\* Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye sólo opioides y cocaína).

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.10.

Distribución de los fallecidos en los que se detectan opioides en función de otras sustancias detectadas. España\*, 2016.



\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.  
 FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

## 2.3.11.

Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide —aunque haya otras sustancias—). España\*, 1996-2016.


	Sólo metadona	Metadona	Metadona y no otro opioide	Sólo metadona y benzodiazepinas
1996	1,5	-	-	-
1997	0,9	-	-	-
1998	0,9	-	-	-
1999	0,4	-	-	-
2000	1,2	-	-	-
2001	2,7	-	-	-
2002	1,8	-	-	-
2003	0,6	-	-	-
2004	0,4	-	-	-
2005	0,6	36,5	15,1	3,0
2006	2,8	39,8	27,4	3,3
2007	4,2	37,5	24,4	4,8
2008	2,4	30,0	20,6	4,2
2009	2,6	32,4	21,9	3,2
2010	2,7	47,4	30,7	4,6
2011	2,2	49,7	34,6	5,9
2012	1,1	52,2	40,2	5,9
2013	2,1	47,8	34,8	4,6
2014	1,5	36,9	20,0	2,1
2015	0,6	32,4	16,4	1,9
2016	1,0	36,3	19,2	3,4

\* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador. Casos con información en sustancias detectadas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.12.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo. España, 1999-2016.




	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hombres	657	610	558	564	552	568	539	417	462	470	366	330	291	324	333	376	321	403
Mujeres	95	81	92	88	81	91	97	72	57	70	76	63	70	59	70	79	69	80
Total	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	393	361	383	403	455	390	483

Datos del Registro General de Mortalidad. Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

### 2.3.13.

Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según edad. España, 1999-2016.



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<35 años	505	429	391	349	310	285	262	200	192	193	141	108	101	104	93	76	80	99
≥35 años	247	262	259	303	323	374	374	289	327	347	301	285	260	279	310	379	310	384
Total	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	393	361	383	403	455	390	483

\* Códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) a partir de datos del registro General de Mortalidad. Instituto de Estadística.

### 2.3.14.

Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de hipnosedantes. España\*, 2015-2016.

Sustancia detectada	Nº de casos** 2015	Nº de casos** 2016
Sólo hipnosedantes	11	3
Hipnosedantes y cocaína (independientemente de otras sustancias)	133	152
Hipnosedantes y opioides (independientemente de otras sustancias)	249	230
Hipnosedantes y alcohol (independiente de otras sustancias)	120	137
Sólo hipnosedantes y alcohol	17	9
Sólo hipnosedantes y opioides	37	30
Sólo hipnosedantes y cocaína	7	11

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

\*\* La suma de casos puede ser superior al número total de fallecidos por hipnosedantes, porque algunas de las opciones no son excluyentes.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.15.

Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de cannabis. España\* 2015-2016.

Sustancia detectada	2015**	2016**
Sólo cannabis y opioides	5	5
Sólo cannabis y cocaína	2	4
Sólo cannabis	2	1
Cannabis y opioides (independiente de otras sustancias)	88	87
Cannabis y cocaína (independiente de otras sustancias)	55	68
Cannabis y alcohol (independiente de otras sustancias)	50	42
Cannabis e hipnosedantes (independiente de otras sustancias)	86	82


\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

\*\* La suma de casos puede ser superior al número total de fallecidos por cannabis, porque algunas de las opciones no son excluyentes.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.16.

Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2016.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Con opioides*	182	170	136	104	140	143	148	152	141	105	94	105
Sin opioides*	55	48	52	35	41	39	33	43	51	60	65	53
Casos con información	237	218	188	139	181	182	181	195	192	165	159	158
Total	237	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194

\* Independientemente de la aparición o no de otras sustancias.

Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

### 2.3.17.

Evolución de las edades de los fallecidos en 6 ciudades españolas\*. España, 2005-2016.


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19 años	3	3	1	0	2	0	2	1	1	0	0	3
20-24 años	17	7	8	9	8	4	5	7	1	0	3	5
25-29 años	31	25	24	15	12	12	11	10	17	9	6	12
30-34 años	40	42	30	22	35	21	14	21	24	23	10	14
35-39 años	66	43	32	23	26	48	40	29	32	20	35	29
40-44 años	52	44	39	23	49	39	41	45	31	28	27	40
45-49 años	19	27	23	26	35	39	34	37	42	38	24	29
50-54 años	5	13	6	15	12	13	18	30	30	32	39	29
55-59 años	1	5	0	4	2	2	6	12	14	13	17	20
60-64 años	1	1	2	2	0	3	5	3	4	7	10	13
≥65 años	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Desconocida	2	0	23	0	0	0	5	0	0	2	0	0
Total fallecidos	237	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194

\* Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.18.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales (estimación nacional). España, 1983-2016.



Número de defunciones		Número de defunciones	
1983	266	2000	1.012
1984	440	2001	923
1985	453	2002	1.079
1986	516	2003	900
1987	741	2004	796
1988	1.067	2005	1.004
1989	1.440	2006	820
1990	1.440	2007	703
1991	1.833	2008	773
1992	1.760	2009	739
1993	1.399	2010	706
1994	1.067	2011	736
1995	1.051	2012	707
1996	1.310	2013	727
1997	1.127	2014	767
1998	1.049	2015	936
1999	972	2016	866

FUENTE: Estimación del Observatorio Español de la Droga y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y datos del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

### 2.3.19.

#### Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 2000-2016.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Estimación nacional	1.012	923	1.079	900	796	1.004	820	703	773	739	706	736	707	727	767	936	866
Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)	444	496	496	493	468	455	428	475	424	438	517	408	519	489	556	600	613
Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)	284	268	229	270	212	242	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194
Registro General de Mortalidad (INE)	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	393	361	383	403	455	390	483

Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican): Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas): Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro General de Mortalidad (INE - Instituto Nacional de Estadística): Se incluyen los códigos CIE-10: F11, F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

# Información complementaria

# Páginas web de interés

## MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

<http://www.mscbs.gob.es/>

### Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

<http://www.pnsd.mscbs.gob.es/>

### Encuesta Nacional de Salud

<https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/home.htm>

## MINISTERIO DEL INTERIOR

<http://www.interior.gob.es/>

### Dirección General de Tráfico

<http://www.dgt.es/es/>

## MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

<http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx>

### Comisionado para el Mercado de Tabacos

<http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/CMTabacos/paginas/Default.aspx>

## MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

<http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/>

### Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

<http://www.isciii.es/>

## OFICINAS DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD)

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)

<https://www.unodc.org/>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)  
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

<http://www.who.int/es/>

Abuso de sustancias psicoactivas. Management of Substance Abuse

[http://www.who.int/substance\\_abuse/en/](http://www.who.int/substance_abuse/en/)

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (JIFE)  
INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD (INCB)

<https://www.incb.org/incb/en/about.html>

OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS  
EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUGS ADDICTION (EMCDDA)

<http://www.emcdda.europa.eu/>

ENCUESTA ESCOLAR EUROPEA SOBRE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (ESPAD)  
THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (ESPAD)

<http://www.espad.org/>

REDUCING ALCOHOL RELATED HARMS (RARHA)

<http://www.rarha.eu/>

CONDUCTAS DE SALUD EN NIÑOS (HBSC)  
HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC)

<http://www.hbsc.org/>

COMISIÓN EUROPEA. EUROBARÓMETRO EUROPEAN COMMISSION. EUROBAROMETER

<http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm>